

정보 마당

어린이들이 즐겨먹는 젤리형태의 과자류(일명 : 미니컵젤리)를 잘못 섭취함으로써 질식에 의한 사망사건이 발생한 바 있었다.

어린이들이 즐겨먹는 젤리형태의 과자류(일명 : 미니컵젤리)를 잘못 섭취함으로써 질식에 의한 사망사건이 발생한 바 있었다.

동 사건은 2001년 문제가 제기되어 우리청에서는 질식(choking)에 의한 위해를 방지하기 위하여 끈약이나 글루코만난을 함유한 직경 4.5cm 이하의 제품은 생산하거나 수입.유통하지 못하도록 조치를 취한 바 있었다.(2001. 10. 22)

금번의 사건발생은 관련제품의 자체적인 문제이기 보다는 특수 환경조건(장애인, 냉동 등)에서 이들 식품을 잘못 섭취하여 발생한 사건으로 판단된다.

미니컵젤리를 포함한 모든 식품(떡 등)을 우리 소비자가 잘못 섭취할 경우 질식에 의한 위해의 개연성이 항상 존재하므로 우리 소비자들께서는 개연성이 있는 식품 섭취시 잘게 나누어 섭취하는 등 섭취방법에도 유의하여야 한다.

혹시 식품 등의 섭취에 따른 질식사건 등이 발생하였을 경우 우선 다음과 같은 방법으로 응급 조치를 취하고 즉시 병원 등에 후송하여 전문적 조치가 이루어지도록 신속한 조치를 하여야 한다.

<의식이 있는 경우>

1. 환자가 앉아있거나 서 있을 때는 환자 뒤에서 한 손으로 환자의 가슴을 받치고, 다른 한 손으로 환자의 등을 빠르게 세게 여러번 친다.

2. 환자가 누워있을 때는 옆으로 눕히고 가슴부위에 처치자의 무릎이 닿게 다가앉아서 등 부위를 빠르게 세게 친다.

3. 상기 방법이 실패한 경우에는 환자를 세우고

뒤에서 갈비뼈 밑에 양팔을 두르고 두손으로 환자의 배꼽 위 부위를 잡고서 안쪽으로 세게 여러번 당긴다.

<의식이 없는 경우>

1. 환자를 단단한 바닥에 바로 눕히고 입으로 인공호흡 실시하고 입속에 손을 넣어 이물질 제거 후 환자를 옆으로 눕히고 가슴부위에 처치자의 무릎이 닿게 다가앉아서 환자의 등 부위를 빠르게 세게 여러번 친다.

2. 상기 방법이 실패한 경우 다시 환자의 입을 벌리고 손가락을 입의 측면을 따라서 조심스럽게 목구멍 깊숙이 집어넣어 목구멍 안의 이물질 제거한다.

※ 주의사항

1) 이물질을 더 깊숙이 밀어 넣지 않도록 세심한 주의가 필요하다.

2) 기구나 집계를 사용하여 이물질을 제거하지 말아야 한다.

<유아나 소아의 경우>

1. 유아를 한쪽 팔위에 엎드리게 한 다음, 손목 부위를 이용하여 유아나 어린이의 등(양쪽 견갑골 사이)을 빠르게 서너번 친다.

2. 상기 방법이 실패한 경우에는 아이를 눕히고 배 윗부분을 세게 서너번 밀어준다.

출처 : www.kfda.go.kr