

東醫寶鑑 中 麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 活用에 대한 考察

황치환, 윤용갑

원광대학교 한의과대학 방제학교실

Abstract

Study on Application of Herba Ephedrae Main Blended Prescription from Dongeuybogam

Hwang Chi hwan, Yun Young Gab

Dept. of Oriental Medicine, Graduate School of Wonkwang University

This report describes the remedial fields, symptoms, pathology, dosage, prescriptive constitution of 79 studies related to the use of *Herba Ephedrae* main blended prescriptions from Dongeubogam.

The following conclusions were reached through investigations on the prescriptions that use *Herba Ephedrae* as a key ingredient.

Herba Ephedrae blended prescriptions are utilized for 26 therapeutic purposes, for example, in symptoms of cough, cold, wind. In particular, 20.2% of the prescriptions appear in the chapter of cough.

Prescriptions that utilize *Herba Ephedrae* as the main ingredient are used in the treatment of 47 different types of diseases, for example, in the treatment of wind-cold pathogen, cold, wind, exogenous febrile disease etc.

Herba Ephedrae is most widely used in six pathogenic factors such as wind, cold, dampness, heat.

교신저자 : 윤용갑

원광대학교 한의과대학 방제학교실

Tel : 063) 850-6834 E-Mail : yunyg@wonkwang.ac.kr

접수 : 2005/ 11/ 7 채택 : 2005/ 11/ 15

The actual amount of *Herba Ephedrae* blended has ranged at a wide variety of amounts from 1 don to 2 don.

It is widely applied with base prescriptions such as Mahwang-tang, Samyo-tang, Mahwangbujasesin-tang, Mahwangkanghwal-tang.

Key Word : *Herba Ephedrae*, Donguibogam

I. 緒 論

麻黃(HERBA EPHEDRAE)은 麻黃科에 속한 多年生草本인 麻黃의 莖을 건조한 것으로 學名은 *Ephedra sinica* stapf이며, 中國의 山西省 大同附近의 產品이 양호하다고 알려져 있으며, 우리나라 백두산부근에서 자생한다.

8-10월에 녹색의 잔가지를 채취하거나 혹은 뿌리째 뽑아서 흙과 뿌리부분을 제거하여 바람이 잘 통하는 곳에서 6할쯤 말린 다음 다시 햇볕에 건조하여 사용한다^{1~5)}.

麻黃의 性味는 辛溫無毒하고, 歸經은 肺·膀胱·心·大腸에 속하며, 效能은 發汗解表·宣肺平喘·利水消腫·溫經通絡의 效能이 있어 傷寒表實·發熱·惡寒·惡風·無汗·鼻塞·頭身疼痛·麻疹不透·風疹癰庠·咳嗽·氣喘·水腫·黃疸·小便不利·風濕痺痛 등에 活用하였다. 그밖에도 中風 및 神經疾患 皮膚疾患·發汗病에 응용해 왔다^{2~8)}.

麻黃의 함유성분으로는 줄기에는 alkaloid 1-2%가 들어있는데, 그 중 40~90%는 ephedrine⁹⁾이고 그 다음은 d-N-pseudoephedrine¹⁰⁾며, tannin·flavonoid glycoside·inulin·starch 등의 당류화합물과, oxalic acid·citric acid·malic acid 등의 유기산류

가 들어있다.

藥理作用으로는 發汗·平喘·解熱·抗炎·利尿作用등이 있으며 心筋의 수축력을 증가시키고, 중추신경의 흥분작용이 있으며, 항 병원미생물작용·氣管支平滑筋에 대한 확장作用·胃腸管 平滑筋을 이완시켜 연동운동을 억제시키는 作用 등이 보고되고 있다^{9~12)}.

한편, 麻黃은 杏仁과 配伍되면 三拗湯에서와 같이 散寒止咳定喘하는 효능이 증강되어 風寒의 感受로 인한 咳嗽 喘息을 치료하고, 桂枝와 配伍되면 發散作用이 麻黃湯에서와 같이 發散作用이 強化되어 表實無汗症에 使用한다. 羌活과 配伍되면 靈仙除痛飲에서와 같이 祛風除濕止痛하고, 烏藥과 配伍되면 烏藥順氣散에서와 같이 順氣覺醒하고, 防己와 配伍되면 神秘左經湯에서와 같이 祛濕, 散寒, 利水한다^{13~15)}.

이와 같이 配伍되는 藥物에 따라 다양한 효능을 발휘하는 바 이에 著者는 麻黃의 配伍에 따른 다양한 효능을 파악하기 위하여 東醫寶鑑에 수록된 麻黃이 配伍된 方劑 79種에 대한 자료조사를 통하여 麻黃이 配伍된 方劑의 治療領域, 痘症, 主治, 病理, 麻黃의 使用量, 麻黃과 配合된 處方의 구성내용 등의 분석을 통하여 麻黃의 活用에 대한 일정한 견지를 얻었기에 보고하는 바이다.

II. 本 論

調查方法은 東醫寶鑑 中 麻黃이 主藥으로 活用된 79方劑의^{15~20)} 內容을 data base 化하여 文獻的 資料分析 및 研究內容을 정리하였으며, 處方名은 同一하나 構成內容이 다른 경우 處方에 (2)를 表記하여 區分하였다. 본 논문에서 主藥이라 함은 處方構

成에서 麻黃의 역할이나 使用量이 君臣藥으로 作用하거나 혹은 여러 가지 藥物과 等分으로 構成되어 있는 경우로 하였다.

1. 麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調查

표 (1)

病 門	處 方	빈도수	백분율
咳嗽	加味三拗湯, 麻黃散(2), 五味子湯(4), 五虎湯, 人參潤肺散, 九寶飲, 人蔘潤肺湯, 紫蘇飲子, 八味款冬花散, 華蓋散, 加減三拗湯, 款冬花散, 三拗湯, 麻黃蒼朮湯, 定喘湯, 定喘湯(2)	16	20.2
寒	麻黃杏仁飲, 小青龍湯, 消風百解散, 十神湯(2), 正陽散(2), 葱白散, 黑奴丸(2), 桂麻各半湯, 麻黃湯(2), 麻黃附子甘草湯, 麻黃附子細辛湯	11	13.9
風	麻黃散, 拏痛散, 靈仙除痛飲, 紘傳順氣散, 疏風順氣湯, 烏藥順氣散(2), 人蔘順氣散, 羌麻湯, 退風散, 禦風丹,	10	12.6
津液	牡蠣散(2), 調衛湯, 牡蠣散, 紅粉	4	5
小兒	紫草膏, 紅綿散, 加減紅綿散, 麻黃湯	4	5
諸瘡	磨風丸, 洗毒散, 疏風解毒散, 香薷湯	4	5
痰瘡	麻黃羌活湯, 麻黃白朮湯, 麻黃黃芩湯, 散邪湯	4	5
鼻	芎菊散(2), 溫肺湯	2	2.5
牙齒	當歸龍膽散, 細辛散	2	2.5
浮腫	麻黃甘草湯, 越婢湯	2	2.5
血	麻黃桂枝湯(2), 麻黃升麻湯(2)	2	2.5
前陰	加減香苓散, 椒粉散	2	2.5
頭	羌活附子湯, 神聖散,	2	2.5
胸	麻黃桂枝湯(3), 行氣香蘇散	2	2.5

病 門	處 方	빈도수	백분율
皮	葛根橘皮湯	1	1.2
脇	芎葛湯	1	1.2
濕	麻杏薏甘湯	1	1.2
黃疸	麻黃醇酒湯	1	1.2
眼	明目細辛湯	1	1.2
婦人	旋覆花湯	1	1.2
瘟疫	聖散者	1	1.2
火	洗心散	1	1.2
足	神秘左經湯	1	1.2
蟲	蓮心散	1	1.2
聲音	人參荔枝散(2)	1	1.2
救急	還魂湯	1	1.2
합 계		79	100

2. 麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治 調査

1) 咳嗽 및 喘證

표 (2-1)

病 症	處 方	主 治	비 고
風寒喘	加味三拗湯	寒喘	
	麻黃散(2)	傷風 喘急 痰壅 梯唾稠粘	
	五味子湯(4)	寒喘	
	五虎湯	傷寒 喘急	
	人參潤肺散	感風寒 咳嗽 喘急 痰壅鼻塞	
寒嗽	九寶飲	諸般咳嗽 及寒嗽 久嗽	
	人蔘潤肺湯	傷寒咳嗽	
	紫蘇飲子	脾肺虛寒 咳嗽痰盛	
	八味款冬花散	肺經寒熱不調 涎嗽不已	
	華蓋散	肺感寒邪 咳嗽上氣 鼻塞聲重	
風嗽	加減三拗湯	風喘嗽	
	款冬花散	寒壅 相交肺氣不利 咳嗽痰盛	
	三拗湯	感風寒 咳嗽 鼻塞 聲重 失音	
夜嗽	麻黃蒼朮湯	秋冬 夜嗽不絕 至曉方緩 口苦 胸痞脹痛 痰唾涎沫 不進飲食	
久喘	定喘湯	肺虛久喘 歌曰和劑須投定喘湯	
哮證	定喘湯(2)	歌曰 諸病原來有藥方 惟愁齁喘最難當	
婦人喘嗽	旋覆花湯	產後感冒風寒 咳喘痰盛	

2) 傷寒病 吳 溫疫

丘 (2-2)

病症	處 方	主 治	비 고
傷寒表證	麻黃杏仁飲	傷寒 太陽經 發熱惡寒 頭痛 無汗 脈浮緊	
	小青龍湯	傷寒表不解 因心下有水氣 乾嘔 氣逆 發熱 咳喘	
	消風百解散	感傷風寒 頭痛 身疼 鼻塞 聲重	
	十神湯(2)	兩感風寒 頭痛寒熱 無汗	
	葱白散	四時傷寒 傷風 頭痛 體熱 煩渴	
太陽病	桂麻各半湯	太陽病脉微身痒	
	麻黃湯(2)	太陽傷寒 頭痛 身疼 百節痛 無汗 惡風寒	
少陽病	麻黃附子甘草湯	少陰病 無吐利 厥逆 宜用此 微發汗也	
	麻黃附子細辛湯	少陰病 但欲寐 發熱 脉沈	
瘟疫	聖散者	疫癘流行 不問陰陽表裏 連服取差 又治風溫 濕溫等證	
傷寒陰證	正陽散(2)	陰證 傷寒	
傷寒陽毒	黑奴丸(2)	陽毒發斑 煩躁 大渴脉洪數	

3) 中風 吳 神經疾患

丘 (2-3)

病症	處 方	主 治	비 고
中風宜調	烏藥順氣散(2)	一切風疾 先服此疎通氣道 進以風藥 又治癱瘓及歷節風	
	人蔘順氣散	中風氣虛 呛斜 癲瘓 語澁 身疼	
諸風通治	秘傳順氣散	中風呛斜癱瘓 一切風疾	
	禦風丹	中風 口眼呛斜 半身不遂 神昏語澁	
破傷風	羌麻湯	破傷風 在半表半裏 無汗	
	退風散	破傷風 不省人事	
手足癱瘓	疏風順氣湯	中風 半身不遂 或全體不能舉動 因元氣虛弱 兼酒色之過 而更挾外邪也	
驚搐	加減紅綿散	驚搐	
腦風證	神聖散	腦風	
尸厥	還魂湯	尸厥	

4) 諸瘡 呵 皮膚疾患 · 發汗病 · 瘡疾病

眼耳鼻咽喉科 疾患 · 胸脇病 · 火熱病

亞 (2-4)

病 症	處 方	主 治	비 고
大風瘡	磨風丸	第三日 服日進二次	
有名無名 諸惡瘡	疎風解毒散	遍身瘡痒痛	
天疱瘡	香鱠湯	楊梅瘡毒筋骨疼痛	
洗瘡藥	洗毒散	陰蝕瘡 及諸般惡瘡	
痘疹	紫草膏	不起脹	
黑陷	麻黃湯	倒黽黑陷	
陰囊濕痒	椒粉散	陰囊濕痒	
癩疹	葛根橘皮湯	冬溫發癩	
自汗	牡蠣散(2)	諸虛不足 體常自汗 夜臥則甚	
		久不至羸瘠枯瘦 心忪驚惕	
調衛湯		濕勝自汗	
盜汗	牡蠣散	盜汗 及自汗	
止汗法	紅粉	止自汗	
六經瘡	麻黃羌活湯	太陽瘡 無汗	
	麻黃白朮湯	風瘡	
晝夜發瘡	麻黃黃芩湯	夜發瘡	
癰瘡	散邪湯	風瘡初起	
鼻塞	芎藭散(2)	鼻塞爲鼈	
	溫肺湯	鼻不聞香臭	
外障	明目細辛湯	一切風熱 眼目赤腫疼痛	
卒然無音	人蔘荊芥散(2)	感冒風寒 言語不出 咽乾鼻涕	
胃心痛	麻黃桂枝湯	外因寒冷 心痛 惡寒發熱 內攻五藏 拘急 不得轉側	
積心痛	行氣香蘇散	內傷生冷 外感風寒 又觸七情惱怒 飲食填滯 胸腹脹痛	
風寒脇痛	芎葛湯	風寒脇痛	
發熱	紅綿散	發熱三朝	
中焦熱	洗心散	中焦有熱 頭目昏重 咽喉腫痛 口舌生瘡 五心煩熱 便尿秘澁	

5) 其他病

丑 (2-5)

病 症	處 方	主 治	비 고
歷節風治法	麻黃散	歷節痛風 無汗	
	拈痛散	可熨烙痛風	
	靈仙除痛飲	肢節腫痛 痛屬火 腫屬濕 兼受風寒而發動於經絡之中 濕熱流注於肢節之間	
齒病塗擦方	當歸龍膽散	寒熱齒痛	
	細辛散	大寒犯腦頭連齒痛	
水腫	麻黃甘草湯	腰上浮腫	
	越婢湯	腰上浮腫咳喘	
衄血	麻黃桂枝湯(2)	傷寒 不得汗 作衄 又治感寒 凝吐血	
	麻黃升麻湯(2)	傷寒 表未解 热鬱作衄 俗呼謂紅汗	
風濕	麻杏薏甘湯	風濕 身疼 不能轉側 日晡加劇	
黃疸	麻黃醇酒湯	黃疸	
脚氣	神秘左經湯	風寒暑濕流注足三陽經脚膝拘攣腫痛	
治諸蟲藥	蓮心散	勞瘵	
陰卵偏墜	加減香等散	墜氣 初起壯熱 憎寒 乃發表分利藥也 一服而愈	
厥逆頭痛	羌活附子湯	寒犯腦 令人頭痛 齒亦痛名曰腦風	

3. 麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 痘因病理 調査

豆 (3)

區 分	病 理	病 症	處 方	비고
寒	傷寒	傷風 頭痛 體熱	葱白散	
		喘急	五虎湯	
		熱鬱作衄	麻黃升麻湯(2)	
		太陽經 發熱惡寒	麻黃杏仁飲	
		咳嗽	人蔘潤肺湯	
		陰證	正陽散(2)	
		表不解	小青龍湯	
		喘	加味三拗湯, 五味子湯(4)	
		嗽	九寶飲	
		衄吐血	麻黃桂枝湯(2)	
六經 傷寒	大寒犯腦	令人腦痛	羌活附子湯	
	外因寒冷	心痛 惡寒發熱	麻黃桂枝湯(3)	
	太陽傷寒	頭痛身疼百節痛無汗	麻黃湯(2)	
	太陽瘡	瘡	麻黃羌活湯	
寒熱	少陰病	無吐利 厥逆	麻黃附子甘草湯	
		但欲寐 發熱 脉沈	麻黃附子細辛湯	
風寒	感傷風寒	齒痛	當歸龍膽散	
外感 內傷	感傷風寒	咳嗽 鼻塞	三拗湯	
		咳嗽 喘急	人蔘潤肺散	
		咳喘痰盛	旋覆花湯	
		言語不出	人蔘荆芥散(2)	
		傷寒表證	消風百解散	
	兩感風寒	頭痛寒熱	十神湯(2)	
	風寒	脹痛	芍葛湯	
	外感風寒 內傷生冷 七情惱怒	飲食填滯 胸腹脹痛	行氣香蘇散	

區分	病理	病症	處方	비고
風	中風	喎斜癱瘓 一切風疾	秘傳順氣散	
		口眼喎斜	禦風丹	
		氣虛 嘎斜	人蔘順氣散	
	中風 元氣虛弱 酒色之過更挾外邪	半身不遂	疏風順氣湯	
		風	喘嗽	加減三拗湯
			瘡	麻黃白朮湯, 散邪湯
	傷風	喘急	麻黃散(2)	
風熱	一切風熱	眼目赤腫疼痛	明目細辛湯	
風濕	風濕	溫	聖散者	
		身疼	麻杏薏甘湯	
風寒 暑濕	風寒暑濕流 注足三陽經	腳膝拘攣腫痛	神秘左經湯	
濕	濕勝自汗		調衛湯	
熱	中焦有熱	頭目昏重	洗心散	
濕熱	濕熱流注於 肢節之間	歷節風	靈仙除痛飲	
陽毒	發斑		黑奴丸(2)	
臟腑, 外邪	肺感寒邪	咳嗽上氣 鼻塞聲重	華蓋散	
	肺經寒熱 不調	涎嗽不已	八味款冬花散	
	寒壅相交 肺氣不利	咳嗽痰盛	款冬花散	
肺脾虛	脾肺虛寒	咳嗽痰盛	紫蘇飲子	
	肺虛	久喘	定喘湯	
기타	諸虛不足	體常自汗	牡蠣散(2)	

4. 麻黃의 使用量에 대한 調査

豆 (4)

用 量	病 症	處 方	비 고
五 分	手足癱瘓	疏風順氣湯	
	發熱三朝	紅綿散	
	驚搐	加減紅綿散	
	瘟疫治法	聖散者	
	腳氣治法	神秘左經湯	
	治諸蟲藥	蓮心散	
	自汗	牡蠣散(2)	一兩
六 分	大風瘡	磨風丸	一兩
	諸風通治	秘傳順氣散	
七 分	破傷風	羌麻湯	
	有名無名諸惡瘡	疎風解毒散	
	六經瘡	麻黃白朮湯	
	鼻塞	芎藭散(2)	
	陰卵偏墜	加減香薷散	
七分半	諸風通治	禦風丹	一兩半
一錢	傷寒表證	麻黃杏仁飲, 消風百解散, 十神湯(2)	
	寒嗽	九寶飲, 紫蘇飲子	
	咳瘡	散邪湯, 葛根橘皮湯	
	衄血	麻黃桂枝湯(2), 麻黃升麻湯(2)	
	歷節風治法	靈仙除痛飲	
	中風宜調氣	人蔘順氣散	
	破傷風治法	退風散	
	自汗	調衛湯	
	厥逆頭痛	羌活附子湯	
	心胃痛治法	麻黃桂枝湯(3)	

用 量	病 症	處 方	則 卦
一錢	積心痛	行氣香蘇散	
	齒病塗擦方	當歸龍膽散	
	風寒脹痛	芎葛湯	
	中焦熱	洗心散	
	喘嗽	旋覆花湯	
	卒然無音	人蔘莉芥散(2)	
	傷寒陽毒	黑奴丸(2)	二兩
一錢半	寒嗽	八味款冬花散	
	風嗽	三拗湯	
	傷寒表證	小青龍湯	
	傷寒陰證	正陽散(2)	
	太陽形證用藥	桂麻各半湯	
	中風宜調氣	烏藥順氣散(2)	
	六經瘧	麻黃羌活湯	
	外障	明目細辛湯	
二錢	風寒喘	加味三拗湯, 麻黃散(2), 五味子湯(4), 人參潤肺散	
	寒嗽	人蔘潤肺湯, 華蓋散,	
	風嗽	加減三拗湯, 款冬花散	
	少陰形證用藥	麻黃附子甘草湯, 麻黃附子細辛湯	
	傷寒表證	蔥白散	
	歷節風治法	麻黃散	
	鼻塞	溫肺湯	
	陰囊濕痒	椒粉散	
	風濕	麻杏薏甘湯	
	久喘	定喘湯	四兩

用 量	病 症	處 方	비 고
二錢半	天疱瘡	香薷湯	五錢
三錢	水腫治法	麻黃甘草湯, 越婢湯	
	哮證	定喘湯(2)	
	洗瘡藥	洗毒散	
	太陽形證用藥	麻黃湯(2)	
	瘡瘍夜發宜分治	麻黃黃芩湯	
	齒病塗擦方	細辛散	
	尸厥	還魂湯	
	風寒喘	五虎湯	
四錢	夜嗽	麻黃蒼朮湯	
五錢	歷節風治法	拈痛散	外用劑
	起脹三朝	紫草膏	外用劑
	黑陷	麻黃湯	用量不明
一兩	止汗法	紅粉	外用劑
	黃疸治法	麻黃醇酒湯	麻黃單味 頓服
等 分	盜汗	牡蠣散	
	腦風證	神聖散	
합 계		79	

5. 麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容 調查

1) 咳嗽 吳 喘證

표 (5-1)

病症	處方	構成內容	비고
風寒喘	加味三拗湯	麻黃 二錢 陳皮 一錢半 杏仁 五味子 各一錢二分 桂皮 一錢 甘草 五分	麻黃湯
	麻黃散(2)	麻黃二錢 桂皮一錢二分 款冬花 詞子皮 甘草 各一錢 杏仁六分	麻黃湯
	五味子湯 (4)	麻黃 二錢 五味子 杏仁 橘紅 各一錢半 乾生薑 桂皮 甘草 各一錢	麻黃湯
	五虎湯	麻黃三錢 石膏五錢 杏仁二錢 甘草一錢 細茶一撮 桑白皮一錢半	三拗湯
	人參潤肺散	麻黃二錢 貝母 杏仁各一錢半 人參 甘草 各一錢 桔梗 阿膠各五分 橘紅二分半	三拗湯
寒嗽	九寶飲	陳皮 薄荷 麻黃 桂皮 桑白皮 紫蘇葉 杏仁 大腹皮 甘草 各一錢	麻黃湯
	人蔘潤肺湯	人蔘 乾葛 桔梗 白芷 麻黃 乾薑 白朮 甘草 各一錢	四君子湯類
	紫蘇飲子	紫蘇葉 桑白皮 青皮 杏仁 五味子 麻黃 陳皮 甘草 各一錢 人蔘 半夏 各六分	三拗湯
	八味 款冬花散	桑白皮 紫蘇葉 杏仁 麻黃 各一錢半 款冬花 紫菀草 五味子 甘草 各一錢	三拗湯
	華蓋散	麻黃二錢 赤茯苓 蘇子 陳皮 桑白皮 杏仁 各一錢 甘草灸 五分	三拗湯
風嗽	加減三拗湯	麻黃 二錢 杏仁 桑白皮 各一錢半 甘草 一錢 蘇子 前胡 各六分	三拗湯
	款冬花散	麻黃 貝母 阿膠珠 各二錢 杏仁 甘草灸 各一錢 知母 桑白皮 半夏 款冬花各五分	三拗湯
	三拗湯	麻黃不去根節 杏仁不去皮尖 甘草不灸不去皮 各一錢半	

病症	處方	構成內容	비고
夜嗽	麻黃蒼朮湯	麻黃八錢 蒼朮五錢 黃芪一錢半 草豆蔻六分 柴胡 羌活 各五分 防風 當歸梢 生甘草 各四分 炙甘草 黃芩 各三分 五味子十五粒	麻黃羌活湯, 麻黃散類
	定喘湯	阿膠 半夏 及麻黃 人參四兩 同甘草四兩 桑皮 五味 強鷺粟二錢 須蜜灸三錢	
	定喘湯(2)	麻黃三錢 杏仁一錢半 片芩 半夏 桑白皮 蘇子 款冬花 甘草 各一錢 白果(即銀杏)二十一箇	三拗湯
婦人 喘嗽	旋覆花湯	旋覆花 赤芍藥 荊芥穗 半夏麴 五味子 麻黃 赤茯苓 杏仁 前胡 甘草 各一錢	三拗湯

2) 傷寒病 吳 溫疫

丑 (5-2)

病症	處方	構成內容	비고
傷寒 表證	麻黃杏仁飲	麻黃 桔梗 前胡 黃芩 陳皮 半夏製 各一錢 杏仁 細辛 各八分 防風七分 甘草四分	三拗湯
	小青龍湯	麻黃 芍藥 五味子 半夏製 各一錢半 細辛 乾薑 桂枝 甘草灸 各一錢	麻黃湯類
	消風百解散	荊芥 蒼朮 白芷 陳皮 麻黃 各一錢 甘草 五分	
	十神湯(2)	香附子 紫蘇葉 升麻 赤芍藥 麻黃 陳皮 川芎 乾葛 白芷 甘草 各一錢	芍芷香蘇散類, 升麻葛根湯
	葱白散	麻黃 二錢 蒼朮 白朮 川芎 各一錢半 石膏 乾葛 甘草 各七分半	越婢湯
太陽 病	桂麻各半湯	麻黃 一錢半 桂枝 芍藥 杏仁 各一錢 甘草 七分	麻黃湯, 三拗湯
	麻黃湯(2)	麻黃三錢 桂枝二錢 甘草六分 杏仁十枚	麻黃湯, 三拗湯

病症	處方	構成內容	비고
少陰病	麻黃附子 甘草湯	麻黃附子細辛湯(麻黃 細辛 各二錢 附子炮一錢) 去細辛 加甘草二錢	麻黃附子細辛湯
	麻黃附子 細辛湯	麻黃 細辛 各二錢 附子炮一錢	麻黃附子細辛湯
傷寒 陰證	正陽散(2)	麻黃一錢半 陳皮 大黃 生乾薑 肉桂 芍藥 附子炮 半夏製 甘草灸 各七分 吳茱萸五分	麻黃附子甘草湯
傷寒 陽毒	黑奴丸(2)	麻黃 大黃各二兩 黃芩 釜底煤 芒硝墨 梁上塵 小麥奴各一兩	
瘟疫	聖散者	草豆蔻煨 猪苓 石菖蒲 赤茯苓 良薑 獨活 赤芍藥 附子 麻黃 厚朴 藥本 枳殼 柴胡 澤瀉 細辛 防風 白朮 藁香 半夏 吳茱萸 蒼朮 甘草 各五分	胃苓湯, 麻附細辛湯, 不換金正氣散,

3) 中風 및 神經疾患

표 (5-3)

病症	處方	構成內容	비고
中風 宣調	烏藥 順氣散(2)	麻黃 陳皮 烏藥各一錢半 川芎 白芷 白僵蠶 枳殼 桔梗各一錢 乾薑五分 甘草 三分	桔梗枳殼湯,
	人蔘順氣散	麻黃 陳皮 川芎 白芷 白朮 厚朴 桔梗 甘草 各一錢 乾葛七分半 人參 乾薑 各五分	四君子湯類, 理中湯
諸風 通治	秘傳順氣散	青皮 陳皮 枳殼 桔梗 烏藥 人參 白朮 白茯苓 半夏 川芎 白芷 細辛 麻黃 防風 乾薑 白僵蠶 甘草 各六分	烏藥順氣散, 桔梗枳殼湯, 六君子湯
	禦風丹	麻黃 防風 白芷 各一兩半 乾生薑 甘草 各七錢半 川芎 白芍藥 桔梗 細辛 白僵蠶 羌活 南星 各五錢	麻黃羌活湯

病症	處方	構成內容	비고
破傷風	羌麻湯	羌活 麻黃 甘菊 川芎 石膏 防風 前胡 黃芩 細辛 枳殼 白茯苓 蔓荊子 甘草 各七分 白芷 薄荷各五分	九味羌活湯類
	退風散	防風 天麻 白芷 麻黃 赤茯苓 當歸 各一錢 薄荷 七分 荆芥 白僵蠶 甘草 各五分	
手足癱瘓	疏風順氣湯	人參 防風 麻黃 羌活 升麻 桔梗 石膏 黃芩 荆芥穗 天麻 南星 薄荷 葛根 芍藥 杏仁 當歸 川芎 白朮 細辛 皂角 各五分	三拗湯, 越婢湯
驚搐	加減紅綿散	麻黃 荆芥穗 全蝎 天麻 薄荷 紫草茸 蟬殼 各五分	
腦風證	神聖散	麻黃 細辛 葛根半生半炒 蕁香葉 各等分	
尸厥	還魂湯	麻黃三錢 杏仁二十五粒 桂心 甘草 各一錢	麻黃湯

4) 諸瘡 및 皮膚疾患

五 (5-4)

病症	處方	構成內容	비고
大風瘡	磨風丸	當歸 羌活 獨活 川芎 天麻 細辛 防風 荆芥 威靈仙 麻黃 何首烏 蔓荊子 牛蒡子 車前子 紙面草 (即蕎麥也) 蒼耳草 各一兩	芎歸湯, 麻黃羌活湯
有名 無名 諸惡瘡	疎風解毒散	白芷 細辛 疹藜子炒 麻黃 檳榔 當歸鬚 生乾地黃 川芎 赤芍藥 獨活 白牽牛微炒 桑白皮炒 蒼朮炒 枳殼 甘草灸 各七分	四物湯類

病症	處方	構成內容	비고
天瘡瘻	香鱠湯	葛根 麻黃 烏藥 細茶 槐花炒 川椒 各五錢 魚鱠 三錢 以脂麻同炒成珠乳香 一錢	
洗瘡藥	洗毒散	蛇床子 地骨皮 大薑 麻黃 荊芥 防風 枯白礬 各三錢 葱白三莖 煎湯溫洗	
黑陷	麻黃湯	麻黃去節五錢	
陰囊 濕痒	椒粉散	麻黃根 二錢 黑狗脊(即貫衆也) 蛇床子 各一錢 川椒 當歸梢 猪苓 各六分 斑貓 四枚 輕粉 紅花 各少許	
癰瘍	葛根橘皮湯	葛根 橘皮 杏仁 知母 黃芩 麻黃 甘草 各一錢	三拗湯
起脹 三朝	紫草膏	白附子 麻黃 紫草茸 甘草各五錢 蟾酥一錢 全蝎二十箇 白僵蠶炒八箇	

5) 發汗病

症 (5-5)

病症	處方	構成內容	비고
	牡蠣散(2)	牡蠣殼 麻黃根 黃芪 知母 各一兩	
自汗	調衛湯	麻黃根 黃芪 各一錢 羌活七分 生甘草 當歸尾 生黃芩 半夏 各五分 麥門冬 生地黃 各三分 猪苓二分 蘇木 紅花 各一分 五味子七粒	當歸補血湯, 麻黃散類
盜汗	牡蠣散	牡蠣殼 黃芪 麻黃根 各等分	
止汗法	紅粉	麻黃根 牡蠣粉 各一兩 赤石脂 龍骨 各五錢	

6) 瘡疾病

표 (5-6)

病症	處方	構成內容	비고
六經瘧	麻黃羌活湯	麻黃 羌活 防風 甘草 各一錢半	
	麻黃白朮湯	麻黃 桂皮 青皮 陳皮 川芎 白芷 半夏麯 紫蘇葉 赤茯苓 白朮 桔梗 細辛 檳榔 甘草 各七分	芎芷香蘇散類, 二陳湯
晝夜發瘧	麻黃黃芩湯	麻黃三錢 黃芩二錢 甘草一錢半 桂心一錢 桃仁十五枚	
瘧瘧	散邪湯	川芎 白芷 麻黃 白芍藥 防風 荊芥 紫蘇葉 羌活 各一錢 甘草 五分	麻黃羌活湯

7) 眼·耳·鼻·咽喉科 疾患

표 (5-7)

病症	處方	構成內容	비고
鼻塞	芎藶散(2)	芎藶 檳榔 麻黃 肉桂 防己 木通 細辛 白芷 菖蒲 各七分 木香 川椒 甘草 各三分半	
	溫肺湯	麻黃二錢 黃芪 升麻 各一錢半 防風 葛根 羌活 甘草炙 各一錢 丁香二分	麻黃羌活湯
外障	明目細辛湯	羌活 麻黃根 各一錢半 防風 一錢 荆芥 七分 藥本 白茯苓 當歸梢 各五分 生地黃 蔓荊子 川芎 各三分 桃仁 五箇 川椒 四箇 細辛 紅花 各二分	麻黃羌活湯, 桃紅四物湯類
卒然無音	人參 荊芥散(2)	人參 荊芥穗 陳皮 桔梗 半夏 細辛 杏仁 通草 麻黃 甘草 各一錢	三拗湯

8) 胸脇病·火熱病

豆 (5-8)

病症	處方	構成內容	비고
胃心痛	麻黃 桂枝湯(3)	麻黃 桂枝 芍藥 細辛 乾薑 甘草 各一錢 香附子 半夏 各七分	小青龍湯類
積心痛	行氣香蘇散	紫蘇葉 陳皮 蒼朮 香附子 烏藥 川芎 羌活 枳殼 麻黃 甘草各一錢	香蘇散, 麻黃羌活湯類
風寒 脇痛	芎葛湯	川芎 乾葛 桂枝 細辛 枳殼 人參 芍藥 麻黃 防風 各一錢 甘草 五分	麻黃羌活湯類
發熱 三朝	紅綿散	全蝎 麻黃 荊芥穗 天麻 甘草 各五分	
中焦熱	洗心散	麻黃 當歸 大黃 荊芥穗 赤芍藥 甘草 各一錢 白朮五分	

9) 其他病

豆 (5-9)

病症	處方	構成內容	비고
歷節 風治法	麻黃散	麻黃二錢 羌活一錢半 黃芪 細辛 各七分半	
	拈痛散	羌活 獨活 細辛 肉桂 防風 白朮 良薑 麻黃 天麻 川烏 吳茱萸 乳香 川椒 全蝎 當歸 各五錢 白薑二錢半	
	靈仙除痛飲	麻黃 赤芍藥 各一錢 防風 荊芥 羌活 獨活 威靈仙 白芷 蒼朮 片芩酒炒 枳實 桔梗 葛根 川芎 各五分 當歸梢 升麻 甘草 各三分	芎歸湯, 升麻葛根湯, 九味羌活湯類
齒病 塗擦方	當歸龍膽散	升麻 麻黃 草龍膽 黃連 草豆蔻 各一錢 生地黃 白芷 當歸梢 羊脛骨灰 各五分	

病症	處方	構成內容	비고
齒病 塗擦方	細辛散	麻黃三錢 桂枝 羊脛骨灰 各二錢半 羌活 草豆蔻 各一錢半 當歸四分 薤本 蒼朮 各三分 防風 柴胡 升麻 白芷 各二分 細辛一分	
水腫 治法	麻黃甘草湯	麻黃三錢 甘草二錢	
	越婢湯	麻黃 三錢 蒼朮 二錢 石膏 甘草 各一錢	麻黃甘草湯
風濕	麻杏薏甘湯	麻黃 薏苡仁 各二錢 杏仁 甘草 各一錢	三拗湯
陰卵 偏墜	加減香苓散	枳殼 陳皮 香附子 蒼朮 麻黃 猪苓 澤瀉 木通 滑石 車前子 三棱 蓬朮 川棟子 玄胡索 甘草 各七分	四苓散類, 車前木通湯
衄血	麻黃 桂枝湯(2)	麻黃 白芍藥 黃芪 甘草灸 各一錢 桂枝 當歸各五分 麥門冬 人參 各三分 五味子五粒	當歸補血湯, 生脉散
	麻黃 升麻湯(2)	麻黃 升麻 赤芍藥 黃芩 石膏 赤茯苓 甘草 各一錢	
黃疸 治法	麻黃醇酒湯	麻黃一兩 好酒一升半 煮至半	
腳氣 治法	神秘左經湯	麻黃 桂心 黃芩 枳殼 柴胡 赤茯苓 半夏 羌活 防風 厚朴 白薑 小草 防己 麥門冬 乾葛 細辛 甘草 各五分	麻黃羌活湯, 二陳湯類
治諸 蟲藥	蓮心散	當歸 黃芪 甘草 鱗甲醋灸 前胡 柴胡 獨活 羌活 防風 防己 茯苓 半夏 黃芩 陳皮 阿膠珠 官桂 芍藥 麻黃 不去根節 杏仁 蓮花藥 南星 川芎 枳殼各五分 芫花醋炒黑色一撮	麻黃湯, 麻黃散類
厥逆 頭痛	羌活附子湯	麻黃 附子 防風 白芷 白僵蠶炒各一錢 黃柏 羌活 蒼朮 各七分 黃芪 升麻 甘草灸各五分	麻黃散類, 麻黃羌活湯類

III. 考 察

麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域을 조사해보면 표 (1)과 같다. 즉 麻黃은 咳嗽·寒·風·津液·小兒·諸瘡·痰瘡·鼻·牙齒·浮腫·血·前陰·頭·胸·皮·脇·濕·黃疸·眼·婦人·瘟疫·火·足·蟲·聲音·救急 등 26個門에서 活用하고 있다. 각 治療領域別 處方 빈도수를 조사해보면 咳嗽門이 20.2%, 傷寒門이 13.9%, 風門이 12.6%로 조사되어 咳嗽·傷寒·風病에 가장 많이 活用되고 있음을 알 수 있으며, 그 밖의 治療領域의 處方인용 빈도수는 표 (1)과 같다.

麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治를 조사해보면 표 (2-1) (2-2) (2-3) (2-4) (2-5)에서 보는 바와 같다. 즉 風寒喘·寒嗽·風嗽·夜嗽·久喘·哮證·婦人喘嗽 등에 使用한 加味三拗湯·旋覆花湯 및 16개 處方이 麻黃을 主藥으로 使用하고 있어, 麻黃은 咳嗽와 喘證에 主藥으로 活用하고 있음을 알 수 있다. 또한 傷寒表證·太陽病·少陽病·瘟疫·傷寒陰證·傷寒陽毒에도 麻黃을 主藥으로 使用한 方劑를 活用하고 있다.

中風·破傷風·手足癱瘓·驚搐·腦風證·尸厥 등에서도 麻黃은 主藥으로 使用한 烏藥順氣散·還魂湯의 8개 處方을 活用하고 있는 것으로 보아 麻黃이 중추신경계의 신경 순환 작용에 일정한 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

그 밖에도 大風瘡·惡瘡·天疱瘡·洗瘡藥·黑陷·陰囊濕痒·斑疹 등 皮膚나 瘡瘍疾患이나, 發汗·瘡疾·鼻塞·外障·失音·胃心痛·脇痛·發熱·歷節風·痔病塗

擦方·水腫·衄血·風濕病·黃疸·脚氣·蛇虫·厥逆頭痛·痘疹등의 痘症에 麻黃을 主藥으로 使用한 方劑로 活用하고 있다.

麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 痘因病理를 조사해보면 표 (3)과 같다. 즉 寒邪에 감촉된 경우로는 傷寒·大寒犯腦·外因寒冷 등의 痘理등이 적용되고 있으며, 風寒·寒熱에 감촉된 경우도 조사되었다. 한편, 外感風寒·內傷生冷·七情腦鬱 등 세 가지 痘理가 合해진 경우도 조사되었으며, 風의 痘理에서는 中風·傷風, 그밖에도 風熱·風濕·風寒暑濕·濕·熱·濕熱 등의 痘因病理를 使用하고 있다. 臟腑病理로는 肺感寒邪·肺經寒熱·寒壅相交·肺氣之劑·肺虛·脾肺虛寒이 使用되고 있다.

종합해보면, 麻黃은 外感邪氣 즉 寒·風·風寒·濕·風熱·風濕·風寒暑濕·濕熱傷寒에 감촉된 경우와 肺感寒邪·肺經寒熱·肺虛·脾肺虛寒 등의 臠腑의 痘理가主流를 이루는 痘因病理임을 알 수 있다.

麻黃의 使用量에 대한 조사를 해보면 표 (4)에서 보는 바와 같이 五分에서 四錢까지도 使用하고 있고, 外用劑인 경우에는 五錢에서 一兩까지 다양하게 使用하고 있음을 알 수 있다. 일반적으로 가장 많이 사용한 경우는 一錢에서 二錢까지로 전체의 58.2%를 차지하고 있다. 三錢을 使用한 경우는 水腫·哮喘·瘡疾·尸厥 등 비교적 급성 위급증일 때 많이 사용한 分量이다. 그 밖에도 牡蠣散, 神聖散에서처럼 使用量을 정확하게 명시하지 않은 경우도 있다.

麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 處方構成內容은 표 (5-1)~(5-9)와 같다. 咳嗽와 喘證에서는 표 (5-1)에서 보는 바와 같이 麻黃湯(麻黃, 桂枝, 杏仁, 甘草), 三拗湯(麻黃, 杏仁, 甘草)을 基本方으로 하고, 痘症

에 따라 관련된 藥物을 配合하고 있어 麻黃이 發汗止咳定喘 作用이 있음을 알 수 있다. 傷寒溫疫病에서는 표 (5-2)에서와 같이 太陽·陽明·少陰病에 따라 麻黃湯, 升麻葛根湯, 麻黃附子細辛湯을 配合하여 使用하고 있다.

中風 및 神經系疾患에서는 桔梗枳殼湯·烏藥順氣散·四君子湯·六君子湯을 配合하여 使用하고 있어 麻黃이 신경순환을 돋거나 신경을 觉醒시키는 作用이 있음을 알 수 있다. 또한 麻黃을 표 (5-4)에서와 같이 각종 皮膚疾患이나 瘡에 活用하고 있는 것으로 보아 麻黃이 祛風作用을 하거나 표 (5-5)에서와 같이 麻黃根을 이용하여 止汗에 作用하고 있어 汗腺의 조절작용에도 관여함을 알 수 있다.

그밖에도 표 (5-6) (5-7)에서와 같이 瘡疾이나 眼耳鼻咽喉科 疾患에 麻黃을 主藥으로 配伍한 方劑를 活用하고 있는데, 外感邪氣를 發散시키거나 解熱하거나, 利竅시키는 作用과 관련된 方劑나 藥物을 配合하여 使用하고 있음을 알 수 있다. 한편 표 (5-8) (5-9)에서와 같이 胃心痛·積心痛·脇痛·歷節風에서 麻黃을 主藥으로 活用하고 있는 것으로 보아, 鎮痛作用에도 일정한 효과가 있음을 알 수 있다. 또한 浮腫에 관련된 麻黃甘草湯·越婢湯·麻杏薏甘湯·加減香苓散에 麻黃을 主藥으로 使用하고 있는 것으로 보아 麻黃이 利水作用에도 관여하고 있음을 알 수 있다.

IV. 결론

東醫寶鑑에 수록된 麻黃이 主藥으로 配伍된 79종의 方劑에 대한 자료 調查를 분

석한 결과 다음과 같이 요약할 수 있었다.

1. 麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 따른 처방빈도는 咳嗽門이 20.2%, 傷寒門이 13.9%, 風門이 12.6%로 조사되었다.
2. 麻黃은 風寒喘, 寒嗽, 風嗽, 夜嗽, 傷寒表證 등 痘證에 가장 많이 活用되고 있었으며, 그 밖에도 47개 痘症에 使用하였다.
3. 麻黃이 主藥으로 配伍된 痘因病理는 寒·風·風寒·濕·風熱·風濕·風寒暑濕·濕熱傷寒에 감촉된 경우와 肺感寒邪·肺經寒熱·肺虛·脾肺虛寒 등의 臟腑의 痘理가主流를 이루고 있다.
4. 麻黃의 一回 使用量은 五分에서 一兩까지 다양한 용량을 사용하고 있으며, 그 중 一錢에서 二錢을 가장 많이 사용하고 있었다.
5. 麻黃이 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容을 조사해보면, 麻黃湯·三拗湯·麻黃附子細辛湯·麻黃羌活湯을 基本方으로 가장 많이 活用하고 있다.

参考文獻

1. 鄭普燮 辛民敎 共著, 圖解鄉藥大辭典(植物), 서울, 永林社, 1998, p.116
2. 申信求, 申氏本草學, 서울, 壽文社, 1988, p.211
3. 辛民敎, 臨床本草學, 서울, 永林社, 1997,

- pp.322, 658, 693, 770
4. 李時珍, 本草綱目, 서울, 一中社, 1987, p.1007
 5. 葉桔泉, 本草鉤沈, 서울, 醫聖堂, 1993, pp.377~379
 6. 李芳源, 本草精要, 서울, 一中社, 2002, pp.29~34
 7. 寇宗奭, 本草衍義, 서울, 醫聖堂, 1994, p.58
 8. 金俊錡譯, 國譯本草問答, 서울, 大星文化社, 1994, pp.66, 67, 68, 104, 128, 147, 150
 9. 김창민외, (完譯)中藥 大辭典, 서울, 鼎談, 1997, pp.1575~1585
 10. 金京玉, (實用)本草學, 서울, 鼎談, 2001, p.41~43
 11. 과학 백과사전출판사 편, 약초의 성분과 이용, 서울, 일월서각, 1999, p.124
 12. 김형균외, 한약의 약리, 서울, 고려의학, 2000, pp.262~265
 13. 梁基相, 韓藥의 配合과 應用, 서울, 傳統醫學研究所, 1993, pp.22, 26, 33, 171
 14. 康秉秀, 韓藥 臨床配合應用, 서울, 永林社, 2004, p.455~459
 15. 尹用甲, 東醫方劑와 處方解說, 서울, 醫聖堂, 1998, pp.137, 147, 150, 153, 155, 158, 570, 578, 634, 639, 645,
 16. 동의과학원, 東醫處方大典, 서울, 여강출판사, 1993, pp.83, 84, 101, 192, 205, 207, 261, 312, 314, 318, 358, 381, 384, 390, 401, 435, 449, 544, 563
 17. 李梴, 編註醫學入門(四卷), 서울, 大星文化社, 와집권일, 1990, p.160
 18. 汪訥庵, 醫方集解, 서울, 成輔社, 1983, pp.70, 74, 121, 151, 161, 254, 412, 424
 19. 康舜洙, 바른방제학, 大星文化社, 서울, 1996, pp.210, 350
 20. 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1966, pp.215, 218, 247, 261, 262, 267, 497, 502, 547, 583, 593, 626, 667, 671, 723, 729, 779, 815, 821, 964, 968, 969, 973, 981, 983, 987, 989, 1002, 1003, 1004, 1012, 1013, 1018, 1019, 1020, 1089, 1105, 1231, 1232, 1233, 1245, 1248, 1249, 1256, 1306, 1347, 1363, 1364, 1365, 1367, 1386, 1465, 1471, 1497, 1508, 1553, 1626, 1731, 1742, 1749