

# 『方藥合編』中 大黃 및 梔子를 포함하는 處方에 대한 考察

한영수·박갑규·엄희정·오민석\*

## The study of Rhei Radix et Rhizoma & Gardeniae Fructus in Bang-Yak-Hap-Pyun

Han Young-su, Park Kap-kyu, Om Hee-jung, Oh Min-seok.  
College of Oriental Medicine, Daejeon University, Daejeon, Korea.

In oriental medicine, Rhei Radix et Rhizoma & Gardeniae Fructus are frequently used materials for anti-inflammatory effect especially urinary tract disease and for neuropsychosis. Bang-Yak-Hap-Pyun(方藥合編) is widely used for clinical herbal prescription book. In Bang-Yak-Hap-Pyun(방약합편), Rhei Radix et Rhizoma is used 0.8g~16g. and Gardeniae Fructus is used 1.2g~6g. The most important fact is that the prescriptions used Rhei Radix et Rhizoma & Gardeniae Fructus at the same time are 4(Yang-Gyuk-San, Pal-Jung-San, Sa-Chung-Hwan, Suk-Gyul-Myung-San. The ratio of Rhei Radix et Rhizoma & Gardeniae Fructus are 2:1, 1:1, 1:1, 1:2 ). The number of prescription Rhei Radix et Rhizoma & Gardeniae Fructus in Bang-Yak-Hap-Pyun is total 45. 1 in sang-tong(上統), 5 in jung-tong(中統), 39 in ha-tong(下統). The group of mostly used disease is about urinary tract.

The ratio of Rhei Radix et Rhizoma in Bang-Yak-Hap-Pyun is 3.33%~57.14%. And the ratio of Gardeniae Fructus is 3.47%~98%

The mostly quoted medical literature what prescription included Rhei Radix et Rhizoma & Gardeniae Fructus in Bang-Yak-Hap-Pyun are Dong-Yi-Bo-Gam and Man-byung-hoe-chun

key words : Bang-Yak-Hap-Pyun, Rhei Radix et Rhizoma, Gardeniae Fructus

### I. 緒論

大黃은 마디풀과에 속한 多年生 草本인 掌葉大黃, 唐古特大黃 혹은 藥用大黃의 根과 根莖을 乾燥한 것으로 效能은 瀉熱通腸, 涼血解毒, 逐瘀經痛하여 實熱便秘, 瘀滯腹痛, 瀉痢不爽, 濕熱黃疸, 血熱吐衄, 目赤, 咽腫, 腸癰腹痛, 癰腫瘡腫, 瘀血經閉,

跌打損傷, (外治)水火燙傷을 치료한다<sup>1)</sup>.

梔子は 꼭두서니과에 속한 산토끼꽃과에 속한 常綠灌木 치자나무 또는 同屬植物의 成熟한 果實을 乾燥한 것으로 效能은 清熱, 瀉火, 涼血하여 熱病 虛煩不眠, 黃疸, 淋病, 消渴, 目赤, 咽痛, 吐血, 衄血, 血痢, 尿血, 熱毒瘡瘍, 扭傷腫痛을 치료한다<sup>1)</sup>.

大黃과 梔子は 둘다 寒性에 苦味를 가지고 있고 각각 上焦와 下焦의 臟腑로 歸經하여 全身의 熱證과 火證을 치료할 수 있는데, 현대인의 스트레스로 인한 각종 질환에 응용할 수 있을 것으로 생각한다.

\* 대전대학교 한의과대학 재활의학과학교실  
· 교신저자 : 오민석 · E-mail : ohmin@dju.ac.kr  
· 채택일 : 2006년 12월 1일

조선말기의 醫書로서 高宗때 醫員 黃度淵이 자신의 著書 醫方活套와 醫宗損益을 合本하여 새로운 체제로 엮은 것을 그의 아들 泌秀가 增補하여 1884년(高宗21년)에 편찬한 方藥合編은 東醫寶鑑과 더불어 임상적으로 가장 많이 활용되어지고 있다. 上統은 인체의 신진대사를 촉진하고 低下된 生理機能을 보충시키는 補劑의 處方으로 묶여져 있는데 元方123方, 附方32方, 諸傷8方, 雜方8方, 解毒2方, 雜方14方, 造方26方으로 구성되어 있고 中統은 보충시키지는 못하되 機能의 亢進과 低下를 調和시켜 均衡있는 生理機能을 유지토록하는 和劑의 處方으로 묶여져 있는데 내용은 元方181方, 附方33方으로 되어 있으며 下統은 질병의 상태가 증진되고 強實하여 性質이 표독하고 效能이 강한 약물로 질병을 攻伐하여 정상적 생리기능을 조속히 찾도록 하는 攻劑의 處方으로 묶여져 있는데 元方163方, 附方38方, 諸種禁忌5件으로 구성되어 있다<sup>2)</sup>.

이에 저자는 임상에서 널리 사용되고 있는 方藥合編<sup>3)</sup>에서 大黃 및 梔子를 포함한 處方에 대해서 조사하였는바 약간의 知見을 얻었기에 보고하는 바이다.

## II. 本 論

### 1. 조사방법

임상에서 가장 多用하고 있는 方藥合編에 나오는 處方을 중심으로 조사를 하였다.

- 1) 方藥合編의 여러 處方中 元方만을 조사하였다.
- 2) 丸劑의 量은 湯劑 20貼을 기준으로 20으로 나누어 계산하였다.
- 3) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方の 구성을 조사하였다.
- 4) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方이 차지하는 비율을 조사하였다.
- 5) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方에 들어가는 大黃 및 梔子の 量을 조사하였다.
- 6) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方에 들어가는 大黃 및 梔子の 상대량을 조사하였다.
- 7) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方の 主

治證을 조사하였다.

- 8) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方の 출전문헌을 조사하였다.
- 9) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方에서의 法製方法을 조사하였다.

### 2. 조사내용

- 1) 上統 1方

上統 098 加味歸脾湯

『婦人良方』

■ 治肝脾怒鬱 月經不通

【活套】 加便香附 尤妙

歸脾湯 (當歸 龍眼肉 酸棗仁 人參 黃芪 白朮 白茯苓 遠志 木香 甘草) 加

山梔 柴胡 各一錢

- 2) 中統 5方

中統 092 四物安神湯

『雜病源流犀燭 臟腑門』卷六方

■ 治心中無血 如魚無水 怔忡 跳動

當歸 白芍藥 生地黃 熟地黃 人參 白朮 白茯苓 酸棗仁(炒) 黃連(炒) 梔子(炒) 麥門冬 竹茹

各七分 棗二枚 米炒一撮 梅一枚 辰砂五分 調服

中統 124 清上防風湯

『東醫寶鑑』

■ 清上焦火 治頭面生瘡癩 風熱毒

防風 一錢

白芷 連翹 桔梗 各八分

片苓(酒炒) 川芎 各七分

荊芥 梔子 黃連(酒炒) 枳殼 薄荷 各五分

甘草 三分

竹瀝五匙 調服

中統 126 荊芥蓮翹湯

『雜病源流犀燭 內傷外感門』卷二十三方

■ 治兩耳腫痛 由腎經有風熱 ○ 食後服  
荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 白芍藥 柴胡 枳殼 黃  
芩 梔子 白芷 桔梗 各七分  
甘草 五分

中統 133 倉卒散

『證治準繩 類方』第六冊方

■ 治氣 自腰腹間攣急疼痛 不可屈伸 痛不可忍  
自汗如洗 手足冰冷 垂死

○ 每三錢 水一盞 酒半盞 煎至七分 入鹽少許  
加川芎 尤妙

○ 一名〔梔附湯〕

山梔(連皮燒半過) 四十九枚

大附子(炮) 一枚

中統 141 清肝解鬱湯

『證治準繩 瘍醫』卷三方

■ 治肝臟鬱火 傷血 乳房結核

當歸 白朮 各一錢

貝母 赤茯苓 白芍藥 熟地黃 山梔 各七分

人參 柴胡 牡丹皮 陳皮 川芎 甘草 各五分

3) 下統 39方

下統 001 滋潤湯

『萬病回春』

■ 治風中臟 二便閉 先服此 後以〔愈風散〕調理

【活套】 實秘 郁李仁一錢 或黑丑五分調服 虛  
人不可用

當歸 生地黃 枳殼 厚朴 檳榔 大黃 杏仁 各一錢  
羌活 七分

紅花(酒焙) 三分

下統 004 防風通聖散

『宣明論方』卷三方

■ 治諸風熱 或瘡疹黑陷 或風熱瘡疥 頭生白屑  
面鼻紫赤 肺風瘡 大風癩疾 或熱結二便不通 並

解酒毒

【活套】 去滑石 芒硝 並酒炒 名〔酒製通聖散〕

○ 癰疹瘙痒加 金銀花 玄蔘 蟬退

滑石 一錢七分

甘草 一錢二分

石膏 黃芩 桔梗 各七分

防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 麻黃 薄荷 連翹 芒  
硝 各四分半

荊芥 白朮 梔子 各三分半

下統 008 小承氣湯

『傷寒論 變陽明病脈證并治』

■ 治傷寒裏症 小熱 小實 小滿 宜緩下者

○ 大熱 大實 大滿 宜急下者 大黃四錢 厚朴 枳  
實 芒硝 各二錢先煎 枳朴煎半乃下大黃 煎至七  
分 去渣入硝 再一沸 名〔大承氣湯〕

○ 傷寒裏症 便硬 尿赤 譫潮 大黃四錢 芒硝二  
錢 甘草一錢 煎法同上 名〔調胃承氣湯〕

大黃 四錢

厚朴 枳實 各一錢半

下統 009 大柴胡湯

『傷寒論 辨太陽病脈證并治中』

■ 治少陽轉屬陽明 身熱 便堅 尿赤 譫潮

柴胡 四錢

黃芩 白芍藥 各二錢半

大黃 二錢

枳實 一錢半

半夏 一錢

下統 011 梔豉湯

『傷寒論 辨太陽病脈證并治中』

■ 治汗下後虛煩 不眠 心中懊惱 按之心下軟者  
虛煩也 ○ 先煎梔至半納豉 再煎至七分

梔子 七枚

豆豉 半合

下統 012 黃連解毒湯

『外臺秘要』卷一에 인용한 崔氏方

■ 治傷寒 大熱 虛煩 不得眠 差後飲酒 及一切熱毒 ○ 腸風 脈洪大 合〔四物湯〕

【活套】 癰疹 丹毒 內外實熱 合〔升麻葛根湯〕  
加玄蔘 荊防蟬退之類  
黃連 黃芩 黃柏 梔子 各一錢二分半

下統 013 桃仁承氣湯

『傷寒論 辨太陽病脈證并治中』

■ 治血結膀胱 小腹結急 便黑 譫語

【用法】 水煎後 入芒硝溫服  
【活套】 熱結腸胃 便秘 檳榔 郁李仁末 調服  
○ 癲狂實熱 青礞石 調服  
大黃 三錢  
桂心 芒硝 各二錢  
甘草 一錢

下統 019 當歸承氣湯

『素問病機氣宜保明集』中卷方

■ 治燥之上藥

【活套】 亦治 血結 便閉  
【用法】 煎後入硝 攪化服  
當歸 大黃 各二錢  
芒硝 七分  
甘草 五分

下統 021 涼膈散

『太平惠民和劑局方』卷六方

■ 積熱 煩燥 口舌生瘡 腸胃燥澀 便尿秘結

○ 積熱 齰腫 加知母 石膏 升麻 大黃  
【用法】 煎半入硝 再煎服

連翹 二錢  
大黃 芒硝 甘草 各一錢  
薄荷 黃芩 梔子 各五分  
蜜少許 竹葉七片

下統 032 增味二陳湯

『醫方集略』

■ 治吞酸  
半夏 陳皮 赤茯苓 梔子(炒) 黃連(炒) 香附子 各一錢  
枳實 川芎 蒼朮 各八分  
白芍藥 七分  
神麴(炒) 五分  
甘草 三分  
姜三片

下統 038 六鬱湯

『丹溪心法』卷三方

■ 開諸鬱火 ○ 氣鬱加 木香 檳榔 蘇葉  
○ 濕鬱加 白朮 羌活 防己 ○ 熱鬱加 黃連 連翹  
○ 痰鬱加 南星 瓜蒌 海粉 ○ 血鬱加 牡丹 桃仁  
韭汁 ○ 食鬱加 山楂 神麴 麥芽 ○ 一方 無神麴  
連翹 貝母 枳殼 蘇葉 加砂仁 半夏  
香附子 蒼朮 神麴 梔子 連翹 陳皮 川芎 赤茯苓  
貝母 枳殼 蘇葉 各一錢  
甘草 五分  
姜三片

下統 046 七物厚朴湯

『世醫得效方』

■ 治熱脹  
厚朴 三錢  
枳實 一錢半  
大黃 甘草 各一錢  
桂心 五分  
棗二枚 姜五片

下統 050 爭功散

『東醫寶鑑』

■ 治熱瘡 多效 ○ 未效加 過路葛藤五寸  
知母 貝母 柴胡 常山 梔子 檳榔 地骨皮 甘草 各

一錢

蟬退 二十七枚

桃枝 柳枝 各五寸

下統 053 加味二陳湯

『東醫寶鑑』

■ 治濕痰滲爲遺精

半夏(薑製) 赤茯苓(鹽水炒) 梔子(炒黑) 各一錢半

陳皮 白朮 桔梗 升麻(酒炒) 柴胡(酒炒) 甘草 各一錢

石菖蒲 七分

知母 黃柏 各三分

姜 三片

下統 056 清心滾痰丸

『雜病源流犀燭 臟腑門』卷七方

■ 治癲癩 驚狂 一切怪症 專治痰火

【用法】 左末 水丸 梧子大 朱砂爲衣 溫水下 七十九

大黃(酒蒸) 黃芩 各四兩

青礞石(同焰硝煨如金色) 犀角 皂角 朱砂 各五錢

沈香 二錢半

麝香 五分

下統 058 當歸承氣湯

『素問病機氣宜保明集』中卷方

■ 治陽狂奔走

當歸 大黃 各三錢半

芒硝 二錢半

甘草 一錢

姜 五片 棗 十枚

下統 062 加味逍遙散

『東醫寶鑑』

■ 治痰中見血 ○ 有火方用

牡丹皮 白朮 各一錢半

赤芍藥 桃仁 貝母 各一錢

山梔 黃芩 各八分

桔梗 七分

青皮 五分

甘草(有火方用) 三分

下統 063 清腸湯

『萬病回春』

■ 治尿血 ○ 空心服

當歸 生地黃 梔子(炒) 黃連 赤芍藥 黃柏 瞿麥 赤茯苓 木通 篇蓄 知母 麥門冬 各七分

甘草 五分

燈心一團 烏梅一枚

下統 069 瓜蒌枳實湯

『萬病回春 痰飲門』

■ 治痰結 胸滿 氣急

瓜蒌仁 枳實 桔梗 赤茯苓 貝母 陳皮 片苓 梔子 各一錢

當歸 六分

縮砂 木香 各五分

甘草 三分

竹瀝五匙 薑汁半匙調服

下統 073 竹瀝達痰丸

『雜病源流犀燭 六淫門』卷十四方

■ 能運痰 從大便出 不損元氣

【用法】 左末 竹瀝一椀半 薑汁三匙 拌勻晒乾 五~六度 復以竹瀝薑汁 丸如小豆 每百丸 臥時 米飲或薑湯下 ○ 痰在四肢 非竹瀝 不能開

半夏(薑製) 陳皮(去白) 白朮(微炒) 白茯苓 大黃(酒浸) 黃芩(酒炒) 青礞石(焰硝一兩 同煨如金色) 各二兩

人參 甘草 各一兩半

沈香 五錢

下統 075 滾痰丸

『景岳全書 古方八陣』卷五十에 인용된 王隱君의 方

■ 治濕熱 痰積 變生百病

【用法】 左末 滴水丸 梧子大 茶清溫水任下 四五十丸 臨睡送下 令藥氣在咽膈之間 ○ 一方以朱砂爲衣

大黃(酒蒸) 黃芩 各八兩

青礞石(一兩 同焰硝一兩 入罐內蒸定鹽泥固濟曬乾火煨如金色)

沈香 五錢

下統 079 八正散

『太平惠民和劑局方』卷六方

■ 治膀胱積熱 便癰閉

瞿麥 大黃 木通 篇蓄 滑石 梔子 車前子 甘草 燈心 各一錢

下統 081 大分清飲

『景岳全書 新方八陣』卷五十一方

■ 治積熱閉結 小水不利 黃疸 尿血 淋閉

○ 疸加 茵陳 ○ 去木通 車前子 加薏苡仁 厚朴名[小分清飲]治濕滯 不能受補

赤茯苓 澤瀉 木通 猪苓 梔子 枳殼 車前子 各一錢

下統 082 禹功散

『濟衆新篇』

■ 治小便不通 百法不能奏效 服此無不愈

○ 不拘時服 少時以鷄翎 探痰吐之 譬如滴水之器 閉其上竅則溢 拔之則水通流洩矣

陳皮 半夏(薑製) 赤茯苓 猪苓 澤瀉 白朮(炒) 木通 條芩 山梔(炒) 各一錢

升麻 三分

甘草 二分

下統 084 五淋散

『古今醫鑑』

■ 治五淋

【活套】 或加牛膝 不甚去梔

赤芍藥 山梔 各二錢

當歸 赤茯苓 各一錢

條芩 甘草 各五分

下統 085 增味導赤散

『仁齋直指方』

■ 治血淋澀痛

【活套】 或加澤瀉 或麝香調服

生乾地黃 木通 黃芩 車前子 梔子 川芎 赤芍藥 甘草 各一錢

姜三片 竹葉十片

下統 094 導滯湯

『東醫寶鑑』

■ 治下痢膿血 裏急後重 日夜無度 ○ 空心服

白芍藥 二錢

當歸 黃芩 黃連 各一錢

大黃 七分

桂心 木香 檳榔 甘草 各三分

下統 106 瀉清丸

『症因脈治』

■ 治肝實 ○ 痘毒 驚搐 心肝熱瀉 肝風自去[瀉青丸]利小便 熱不炎[導赤散](下統七十八) ○ 痘後餘毒 入眼生翳大效 每一二丸 以竹葉煎湯化 砂糖調下

【用法】 左末 蜜丸 芡實大

【活套】 少陽風瘧 三五丸 薑茶化下 神效

○ 春傷風 至夏暴瀉 三五丸 薑本煎湯化下 當歸 草龍膽 川芎 梔子 大黃 羌活 防風 各等分

下統 107 石決明散

『雜病源流犀燭 面部門』卷二十二方

■ 治肝熱 眼赤腫 生翳 或脾熱 臉內鷄冠蚬肉 蟹睛疼痛 或旋螺尖起

【用法】左末 每二錢 麥門冬 煎湯 調下  
石決明 草決明 各一兩  
羌活 梔子 木賊 青箱子 赤芍藥 各五前  
大黃 荊芥 各二錢半

下統 108 洗肝明目湯

『增補萬病回春』卷五方

■ 治一切風熱眼目 赤腫 疼痛

【活套】果有肝臟風熱 脈數實 然後用之 虛者 不可概用

當歸尾 川芎 赤芍藥 生地黃 黃連 黃芩 梔子 石膏 連翹 防風 荊芥 薄荷 羌活 蔓荊子 甘菊 白蒺藜 草決明 桔梗 甘草 各五分

下統 114 黃芩湯

『萬病回春』

■ 治肺火盛 鼻孔乾燥 生瘡腫痛

【用法】食後服  
片芩(酒炒) 梔子(酒炒) 桔梗 赤芍藥 桑白皮 麥門冬 荊芥 薄荷 連翹 各一錢  
甘草 三分

下統 116 回春涼膈散

『萬病回春』

■ 治三焦火盛 口舌生瘡

【活套】肺胃熱結發癰合[升麻葛根湯](中統二十二)

連翹 一錢二分  
黃芩 梔子 桔梗 黃連 薄荷 當歸 生地黃 枳殼 赤芍藥 甘草 各七分

下統 117 黃連湯

『雜病源流犀燭 內傷外感門』卷二十三方

■ 治心火舌上生瘡 燥熱 或尖出血 或舌硬

【活套】熱甚[九味清心元](下統二十)二丸調服

黃連(酒炒) 梔子(炒) 生地黃(酒洗) 麥門冬 當歸(酒洗) 赤芍藥 各一錢  
犀角 薄荷 甘草 各五分

下統 121 瀉胃湯

『萬病回春』

■ 治牙痛 如神

當歸 川芎 赤芍藥 生地黃 黃連 梔子 牡丹皮 荊芥 薄荷 防風 甘草 各一錢

下統 137 龍膽瀉肝湯

『東醫寶鑑』

■ 治肝臟濕氣 男子陰挺 女人陰痒瘡 ○ 空心服  
草龍膽 柴胡 澤瀉 各一錢

木通 車前子 赤茯苓 生地黃 當歸 山梔 黃芩 甘草 各五分

下統 141 秦艽蒼朮湯

『東醫寶鑑』

■ 治熱濕風痰合 而為痔 其腸頭成塊者濕與熱也 大痛者風也 便秘者燥也

【用法】左 除檳榔 桃仁 皂角仁 餘藥水煎 去滓 入三味 再煎 空心熱服 以美饌壓之

秦艽 皂角仁(燒存性) 桃仁(泥) 各一錢

蒼朮 防風 各七分

黃柏(酒洗) 五分

當歸稍(酒洗) 澤瀉 檳榔(末) 各三分

大黃 二分

下統 148 梔子清肝湯

『醫學入門』卷七 外科藥方

■ 治肝膽火盛 耳後 頸項 胸乳等處 結核  
柴胡 二錢

梔子(酒炒) 牡丹皮 各一錢三分  
 赤茯苓 川芎 赤芍藥 當歸 牛蒡子 各一錢  
 青皮 甘草(炙) 各五分

下統 151 備急丸

『金匱要略 雜療方』

■ 治諸卒暴死 暴疾百病 及中惡 客忤 鬼擊 口  
 噤 奄忽氣絕

【用法】 ○ 左末 蜜丸小豆大 酒化灌下 或溫  
 水亦好

大黃 乾薑 巴豆霜 各一兩

下統 154 通經湯

『東醫寶鑑』

■ 治月閉

當歸 川芎 白芍藥 生乾地黃 大黃 官桂 厚朴 枳  
 殼 枳實 黃芩 蘇木 紅花 各七分

姜三片 棗二枚 梅一枚

### III. 總括 및 考察

#### 1. 方藥合編이란

方藥合編은 東醫寶鑑과 더불어 임상적으로 가장 많이 활용되어지고 있는 조선말기의 醫書로서 高宗때 醫員 黃度淵이 자신의 著書 醫方活套와 醫宗損益을 合本하여 새로운 체제로 엮은 것을 그의 아들 泌秀가 增補하여 1884년(高宗21년)에 편찬하였다. 本書의 구성은 藥性歌, 上統, 中統, 下統으로 분류하여 上統에는 補劑를, 中統에는 和劑를, 下統에는 下劑를, 藥性歌에서는 각 약물의 氣味, 主治 및 適應症을 수록하고 있으며 末尾에는 諸傷門, 解毒門, 雜方門, 製造門, 諸禁忌, 增補方 및 保有方 등을 수록하여 우리나라에서 최초로 시도한 독창적 방제 분류방법으로 볼 수 있다<sup>2)</sup>.

#### 2. 大黃 및 梔子の 약성<sup>4)</sup>

##### 1) 大黃

本品은 性味が 苦寒沈降하고 力猛善行하여 下焦에 直達하므로 腸胃 積滯를 蕩滌하고 血分の 實熱을 清泄하는 作用을 돕고 活血逐瘀의 效能이 있어 攻積, 瀉火, 逐瘀의 要藥이 되어 推陳致新 한다. 이에 대해 李士材는 “古人이 大黃을 使用하여 虛勞, 吐衄을 治한 것은 뜻이 매우 深奧하다. 濁陰이 내려가지 못하면 淸陽이 생겨날 수 없고 血瘀가 除去되지 못하면 新血이 生할 수 없게 된다.”라고 하였다.

本品은 修治에 따라 藥效가 달라지는데 生用하면 瀉下作用이 強해지고 熟用하면 瀉下效能이 緩해지며, 酒製하면 散瘀의 效能을 兼하여 熱毒에 傷한 것을 治하므로 目赤, 牙痛, 頭痛에 應用하고 또한 酒洗하면 深入血分하므로 大承氣湯에 使用할 때는 酒洗하고 小承氣湯에 쓸 때는 酒洗하지 않는다. 炒炭하면 化瘀止血의 效能이 있어 血熱로 인한 瘀血性 出血症을 治한다.

本品은 熱性 便秘를 治하는 要藥이 되며 瀉下作用이 迅速히 나타나며 應用範圍가 넓어 瀉下 뿐 아니라 抗菌, 利膽, 止血, 抗腫瘍 등의 效能이 있다. 또한 本品은 外科의 常用藥이기도 하여 瘡癤, 疔毒 등에 使用된다. 本品은 止血作用도 兼하고 있어 咯血, 鼻血, 排便時의 出血 등에 止血藥과 함께 應用한다.

##### 2) 梔子

本品은 輕淸上行하여 心肺와 胸膈의 熱을 瀉하고 邪熱을 淸解하므로 瀉火淸熱의 作用으로 心胸의 煩熱로 인해 躁擾不寧한 것을 治한다. 또한 性味が 苦寒淸降하여 淸熱利濕하므로 三焦의 火를 瀉하고 小便을 利한다. 本品은 주로 肺, 胃經에 入하는데 黃蓮 등과 同用하여 淸熱燥濕의 效能을 높인다.

本品은 心, 肺經에 入하여 涼血止血的 作用이 있어 一切의 熱病으로 熱이 胸膈에 蘊結하여 된 心煩懊憹와 熱이 血分에 鬱滯된 吐衄下血 및 濕熱이 蘊結한 黃疸, 淋閉, 小便不利 등의 證에 要藥이 된다.

本草求真에서는 “오직 그 氣가 浮하여 仲景先生은 이를 利用하여 上焦의 痰火를 吐하게 하였다. 또한 오직 그 味가 苦하여 能히 降할 수 있으므로 丹溪는 이를 利用하여 內鬱의 邪를 降하게 하였을

따름이다. 다만 上을 治할 때는 마땅히 生用하고 下를 治할 때는 마땅히 炒黑하여야 한다. 비록 本品이 上, 下로 모두 入하지만 研究해 보면 肺로부터 아래로 達하여 能히 周邊으로 미쳐 모두 治하는 것이다.”라고 하였다.

本品은 外傷腫痛에도 優秀한 效果가 있는데, 밀가루와 餅을 만들어 塗布한다.

本品을 生用하면 淸熱瀉火의 作用이 強하고 炒用하면 止血效果가 強해진다.

### 3. 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方의 분석

#### 1) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方의 전체비율

方藥合編은 上統에 123개 處方, 中統에 181개 處方, 下統 163개 處方이 있으며 합쳐서 467개 處方으로 구성되어 있다. 大黃 및 梔子를 포함하고 있는 處方の 수는 上中下統 합쳐서 45方이며 이는 전체處方の 약 9.64%를 차지하고 있다. 上統에는 加味歸脾湯 1가지 處方이 나와 있으며 이는 上統處方の 약 0.81%에 해당한다. 中統에는 四物安神湯, 淸上防風湯, 荊芥蓮翹湯, 倉卒散, 淸肝解鬱湯의 5가지 處方이 나와 있으며 이는 中統處方の 약 2.76%에 해당한다. 下統處方에는 滋潤湯, 防風通聖散, 小承氣湯, 大柴胡湯, 梔歧湯, 黃連解毒湯, 桃仁承氣湯, 當歸承氣湯, 涼膈散, 增味二陳湯, 六鬱湯, 七物厚朴湯, 爭功散, 加味二陳湯, 淸心滾痰丸, 當歸承氣湯, 加味逍遙散, 淸腸湯, 瓜蒌枳實湯, 竹瀝達痰丸, 滾痰丸, 八正散, 大分清飲, 禹功散, 五淋散, 增味導赤散, 導滯湯, 瀉清丸, 石決明散, 洗肝明目湯, 黃芩湯, 回春涼膈散, 黃連湯, 瀉胃湯, 龍膽瀉肝湯, 秦艽蒼朮湯, 梔子淸肝湯, 備急丸, 通經湯의 39가지 處方이 나와 있으며 이는 下統處方の 약 23.93%에 해당한다. 大黃 및 梔子를 포함하고 있는 處方은 下統에서 가장 많으며 上統이 가장 적었다.

분류	處方명	處方個數	處方比率
上統	加味歸脾湯	1	1/123 (0.81%)
中統	四物安神湯	5	5/181 (2.76%)
	淸上防風湯		
	荊芥蓮翹湯		
	倉卒散		
	淸肝解鬱湯		
下統	滋潤湯	39	39/163 (23.93%)
	防風通聖散		
	小承氣湯		
	大柴胡湯		
	梔歧湯		
	黃連解毒湯		
	桃仁承氣湯		
	當歸承氣湯		
	涼膈散		
	增味二陳湯		
	六鬱湯		
	七物厚朴湯		
	爭功散		
	加味二陳湯		
	淸心滾痰丸		
	當歸承氣湯		
	加味逍遙散		
	淸腸湯		
	瓜蒌枳實湯		
	竹瀝達痰丸		
	滾痰丸		
	八正散		
	大分清飲		
	禹功散		
	五淋散		
	增味導赤散		
	導滯湯		
	瀉清丸		
	石決明散		
	洗肝明目湯		
	黃芩湯		
	回春涼膈散		
	黃連湯		
	瀉胃湯		
	龍膽瀉肝湯		
	秦艽蒼朮湯		
	梔子淸肝湯		
	備急丸		
	通經湯		

#### 2) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方에 들어가는 大黃 및 梔子の 量

大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方에서 쓰이

는 大黃 및 梔子의 量은 大黃은 0.2~4錢, 梔子是 0.3~1.5錢이 쓰였다. 大黃 1錢 미만을 사용한 處方에는 導滯湯(0.7), 秦艽蒼朮湯(0.2), 備急丸(0.5), 通經湯(0.7)이 있고, 梔子 1錢 미만을 사용한 處方에는 四物安神湯(0.7), 清上防風湯(0.5), 荊芥蓮翹湯(0.7), 清肝解鬱湯(0.7), 防風通聖散(0.35), 涼膈散(0.5), 加味逍遙散(0.8), 清腸湯(0.7), 洗肝明目湯(0.5), 回春涼膈散(0.7), 龍膽瀉肝湯(0.5) 등이 모두 1錢 미만으로 사용되었다. 大黃은 滋潤湯, 涼膈散, 七物厚朴湯, 竹瀝達痰丸, 八正散에서 1錢이 쓰였고 大柴胡湯, 當歸承氣湯, 清心滾痰丸에서 2錢이 쓰였고, 石決明散에서 2.5錢, 滾痰丸에서 4錢, 나머지 承氣湯類에서 3~4錢이 쓰였다. 梔子是 加味歸脾湯, 增味二陳湯, 六鬱湯, 爭功散, 瓜蒌枳實湯, 八正散, 大分清飲, 禹功散, 增味導赤散, 黃芩湯, 黃連湯, 瀉胃湯 등이 1錢이 쓰였고 黃連解毒湯에서 1.25錢, 梔子清肝湯이 1.3錢, 加味二陳湯에서 1.5錢, 五淋散에서 2錢, 石決明散에서 5錢이 쓰였다. 大黃과 梔子が 같이 쓰인 處方은 涼膈散(大黃:梔子=2:1), 八正散(1:1), 瀉清丸(1:1), 石決明散(1:2) 등이다. 湯劑에 大黃 및 梔子 사용시 최고 重量이 大黃 4錢, 梔子 1.5錢으로 이는 약 6~16g정도 되며 임상에서 참고해야 하겠다.

분류	處方명	大黃量 (단위 錢)	梔子량(단위 錢)
上統	加味歸脾湯		1
中統	四物安神湯		0.7
	清上防風湯		0.5
	荊芥蓮翹湯		0.7
	倉卒散		49枚
	清肝解鬱湯		0.7
下統	滋潤湯	1	
	防風通聖散		0.35
	小承氣湯	4	
	大柴胡湯	2	
	梔子湯		7枚
	黃連解毒湯		1.25
	桃仁承氣湯	3	
	當歸承氣湯	2	
涼膈散	1	0.5	

增味二陳湯		1
六鬱湯		1
七物厚朴湯	1	
爭功散		1
加味二陳湯		1.5
清心滾痰丸	2	
當歸承氣湯	3.5	
加味逍遙散		0.8
清腸湯		0.7
瓜蒌枳實湯		1
竹瀝達痰丸	1	
滾痰丸	4	
八正散	1	1
大分清飲		1
禹功散		1
五淋散		2
增味導赤散		1
導滯湯	0.7	
瀉清丸	各等分	各等分
石決明散	2.5	5
洗肝明目湯		0.5
黃芩湯		1
回春涼膈散		0.7
黃連湯		1
瀉胃湯		1
龍膽瀉肝湯		0.5
秦艽蒼朮湯	0.2	
梔子清肝湯		1.3
備急丸	0.5	
通經湯	0.7	

3) 大黃 및 梔子を 포함하는 方藥合編處方에서 大黃 및 梔子の 相對量

大黃 및 梔子の 量이 많을수록 處方에서 차지하는 比率이 높아지겠지만 絶對量과 相對量의 차이가 있기 때문에 주의해 보아야 할 부분이다. 상기 표에서 全體處方量의 大黃比率이 10%이하 차지하는 處方은 下統에 石決明散(5%), 秦艽蒼朮湯(3.33%), 通經湯(8.33%)이 있고 나머지 處方은 모두 10%이상이었다. 大黃의 比率이 가장 높은 것은 小承氣湯으로 全體의 57.14%가 大黃으로 구성되어 있다. 상기표에서 全體處方量의 梔子比率이 10%이상 차

지하는 處方은 中統에는 倉卒散(98%)이 있고 下統에는 黃連解毒湯(25%), 增味二陳湯(10.10%), 爭功散(12.5%), 加味二陳湯(12.71%), 瓜蒌枳實湯(10.10%), 八正散(11.11%), 大分清飲(14.29%), 禹功散(10.53%), 五淋散(28.58%), 增味導赤散(12.5%), 瀉清丸(14.29%), 石決明散(10%), 黃芩湯(10.75%), 黃連湯(13.33%), 梔子清肝湯(12.26%) 등이 있다. 大黃과 梔子が 같이 들어간 處方은 涼膈散, 八正散, 瀉清丸, 石決明散으로, 全體處方量 중 大黃과 梔子の 比率은 각각 23.08%, 22.22%, 28.57%, 15% 이다.

분류	處方명	大黃量 (단위 錢)	處方全體 量 (단위 錢)	處方の 大黃比率
下統	滋潤湯	1	8	12.5%
	小承氣湯	4	7	57.14%
	大柴胡湯	2	13.5	14.81%
	桃仁承氣湯	3	8	37.5%
	當歸承氣湯	2	5.2	38.46%
	涼膈散	1	6.5	15.38%
	七物厚朴湯	1	7	14.29%
	清心滾痰丸	2	5.1	38.83%
	當歸承氣湯	3.5	10.5	33.33%
	竹瀝達痰丸	1	8.7	11.43%
	滾痰丸	4	8.7	45.71%
	八正散	1	9	11.11%
	導滯湯	0.7	6.9	10.14%
	瀉清丸	各等分	7가지	14.29%
	石決明散	2.5	50	5%
	秦芫蒼朮湯	0.2	6	3.33%
	備急丸	0.5	1.5	33.33%
通經湯	0.7	8.4	8.33%	

분류	處方名	梔子量 (단위 錢)	處方全體 量 (단위 錢)	處方的 梔子比 率
上統	加味歸脾湯	1	10.8	9.26%
中統	四物安神湯	0.7	8.4	8.33%
	清上防風湯	0.5	7.6	6.58%
	荊芥蓮翹湯	0.7	8.9	7.87%
	倉卒散	49枚	50枚	98%
清肝解鬱湯	0.7	8.5	8.24%	

下統	防風通聖散	0.35	10.1	3.47%
	梔枝湯	7枚	7枚+ 半 合	
	黃連解毒湯	1.25	5	25%
	涼膈散	0.5	6.5	7.69%
	增味二陳湯	1	9.9	10.10%
	六鬱湯	1	11.5	8.69%
	爭功散	1	8	12.5%
	加味二陳湯	1.5	11.8	12.71%
	加味逍遙散	0.8	9.1	8.79%
	清腸湯	0.7	8.9	7.86%
	瓜蒌枳實湯	1	9.9	10.10%
	八正散	1	9	11.11%
	大分清飲	1	7	14.29%
	禹功散	1	9.5	10.53%
	五淋散	2	7	28.58%
	增味導赤散	1	8	12.5%
	瀉清丸	各等分	7가지	14.29%
石決明散	5	50	10%	
洗肝明目湯	0.5	9.5	5.26%	
黃芩湯	1	9.3	10.75%	
回春涼膈散	0.7	8.2	8.54%	
黃連湯	1	7.5	13.33%	
瀉胃湯	1	11	9.09%	
龍膽瀉肝湯	0.5	7	7.14%	
梔子清肝湯	1.3	10.6	12.26%	

#### 4) 大黃 및 梔子 포함하는 處方の 主治症

方藥合編에서 大黃과 梔子是 대부분 熱症에 쓰였으며 上統에는 加味歸脾湯 처방이 虛熱症에 사용되고 있고, 中統에는 四物安神湯, 清上防風湯, 荊芥蓮翹湯, 倉卒散, 清肝解鬱湯의 5처방이 虛證 혹은 實證의 熱證에 사용되고 있으며 下統에는 滋潤湯, 防風通聖散, 小承氣湯, 大柴胡湯, 梔枝湯, 黃連解毒湯, 桃仁承氣湯, 當歸承氣湯, 涼膈散, 增味二陳湯, 六鬱湯, 七物厚朴湯, 爭功散, 加味二陳湯, 清心滾痰丸, 當歸承氣湯, 加味逍遙散, 清腸湯, 瓜蒌枳實湯, 竹瀝達痰丸, 滾痰丸, 八正散, 大分清飲, 禹功散, 五淋散, 增味導赤散, 導滯湯, 瀉清丸, 石決明散, 洗肝明目湯, 黃芩湯, 回春涼膈散, 黃連湯, 瀉胃湯, 龍膽瀉肝湯, 秦芫蒼朮湯, 梔子清肝湯, 備急丸, 通經湯의 39가지 處方이 實熱證에 쓰인다. 下焦濕熱로 인한 泌尿器질환에 쓰이는 처방은 八正散, 大分清飲, 禹

功散, 五淋散, 增味導赤散, 清腸湯, 龍膽瀉肝湯, 秦芫蒼朮湯의 8가지이며, 肝氣鬱結에 쓰이는 처방은 加味歸脾湯, 清肝解鬱湯, 梔子清肝湯, 加味逍遙散, 六鬱湯, 瀉清丸의 6가지이며, 實證便秘에 쓰는 처방은 小承氣湯, 大柴胡湯, 桃仁承氣湯, 當歸承氣湯, 滋潤湯의 5가지이며, 痰積으로 인한 諸證에 쓰이는 처방은 增味二陳湯, 加味二陳湯, 竹瀝達痰丸, 滾痰丸, 瓜蒌枳實湯의 5가지이며, 風熱이나 積熱으로 인한 熱毒證에 쓰이는 처방은 清上防風湯, 荊芥蓮翹湯, 防風通聖散, 黃連解毒湯, 涼膈散의 5가지이며, 驚悸, 怔忡, 不眠, 驚狂 등의 神經精神科 질환에 쓰이는 처방은 四物安神湯, 梔子湯, 清心滾痰丸, 當歸承氣湯의 4가지이며, 上焦火로 인한 生瘡에 쓰이는 처방은 黃芩湯, 回春涼膈散, 黃連湯의 3가지이며, 眼疾患에 쓰이는 처방은 石決明散, 洗肝明目湯의 2가지이며, 痛症疾患에 쓰이는 처방은 倉卒散, 瀉胃湯의 2가지이며, 熱脹에 쓰이는 처방은 七物厚朴湯, 熱瘡에 쓰이는 처방은 爭功散, 下痢膿血에 쓰이는 처방은 導滯湯, 月經不調에 쓰이는 처방은 通經湯, 危證에 쓰이는 처방은 備急丸로 각각 1가지씩이다.

따라서 大黃과 梔子가 가장 많이 쓰이는 질환은 下焦濕熱로 인한 泌尿器疾患이며 肝氣鬱結로 인한 鬱火證, 實證便秘, 熱毒證, 痰積疾患, 神經精神科疾患, 上焦火 등 대부분이 熱證과 火證에 쓰인 것을 알 수 있다.

분류	處方명	處方別 主治症
上統	加味歸脾湯	治肝脾怒鬱 月經不通
中統	四物安神湯	治心中無血 如魚無水 怔忡 跳動
	清上防風湯	清上焦火 治頭面生瘡癩 風熱毒
	荊芥蓮翹湯	治兩耳腫痛 由腎經有風熱
	倉卒散	治氣 自腰腹間擊急疼痛 不可屈伸 痛不可忍 自汗如洗 手足冰冷 垂死
清肝解鬱湯	治肝臟鬱火 傷血 乳房結核	
下統	滋潤湯	治風中臟 二便閉 先服此 後以[愈風散]調理
	防風通聖散	治諸風熱 或瘡疹黑陷 或風熱瘡疥 頭生白屑 面鼻紫赤 肺風瘡 大風癩疾 或熱結二便不通 並解酒
	小承氣湯	治傷寒裏症 小熱 小實 小滿 宜緩下者

大柴胡湯	治少陽轉屬陽明 身熱 便堅 尿赤 譫 潮
梔子湯	治汗下後虛煩 不眠 心中懊憹 按之心下軟者 虛煩也
黃連解毒湯	治傷寒 大熱 虛煩 不得眠 差後飲酒 及一切熱毒
桃仁承氣湯	治血結膀胱 小腹結急 便黑 譫語
當歸承氣湯	治燥之上藥
涼膈散	積熱 煩燥 口舌生瘡 腸胃燥澀 便秘結
增味二陳湯	治吞酸
六鬱湯	開諸鬱火
七物厚朴湯	治熱脹
爭功散	治熱瘡 多效
加味二陳湯	治濕痰滲爲遺精
清心滾痰丸	治癲癇 驚狂 一切怪症 專治痰火
當歸承氣湯	治陽狂奔走
加味逍遙散	治痰中見血
清腸湯	治尿血
瓜蒌枳實湯	治痰結 胸滿 氣急
竹瀝達痰丸	能運痰 從大便出 不損元氣
滾痰丸	治濕熱 痰積 變生百病
八正散	治膀胱積熱 使癃閉
大分清飲	治積熱閉結 小水不利 黃疸 尿血 淋閉
禹功散	治小便不通 百法不能奏效 服此無不愈
五淋散	治五淋
增味導赤散	治血淋澀痛
導滯湯	治下痢膿血 裏急後重 日夜無度
瀉清丸	治肝實
石決明散	治肝熱 眼赤腫 生翳 或脾熱 臉內鷄冠蜆肉 蟹睛疼痛 或旋螺尖起
洗肝明目湯	治一切風熱眼目 赤腫 疼痛
黃芩湯	治肺火盛 鼻孔乾燥 生瘡腫痛
回春涼膈散	治三焦火盛 口舌生瘡
黃連湯	治心火舌上生瘡 燥熱 或尖出血 或舌硬
瀉胃湯	治牙痛 如神
龍膽瀉肝湯	治肝臟濕氣 男子陰挺 女人陰痒瘡
秦芫蒼朮湯	治熱濕風痰合 而爲痔 其腸頭成塊者濕與熱也 大痛者風也 便秘者燥也
梔子清肝湯	治肝膽火盛 耳後 頸項 胸乳等處 結核
備急丸	治諸卒暴死 暴疾百病 及中惡 客忤

		鬼擊 口噤 奄忽氣絕
	通經湯	治月閉

5) 大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編處方의 出典  
 方藥合編은 인용한 古典이 총 68가지이며 大黃 및 梔子를 포함한 處方이 나온 文獻은 21가지였다.

婦人良方, 雜病源流犀燭, 東醫寶鑑, 證治準繩, 萬病回春, 宣明論方, 傷寒論, 外臺秘要, 素問病機氣宜保明集, 太平惠民和劑局方, 醫方集略, 丹溪心法, 世醫得效方, 景岳全書, 濟衆新篇, 古今醫鑑, 仁齋直指方, 症因脈治, 增補萬病回春, 醫學入門, 金匱要略 21가지가 大黃 및 梔子를 포함한 方藥合編處方의 出典이다.

분류	處方명	出典文獻
上統	加味歸脾湯	『婦人良方』
中統	四物安神湯	『雜病源流犀燭 臟腑門』卷六方
	清上防風湯	『東醫寶鑑』
	荊芥蓮翹湯	『雜病源流犀燭 內傷外感門』卷二十三方
	倉卒散	『證治準繩 類方』第六冊方
	清肝解鬱湯	『證治準繩 瘍醫』卷三方
下統	滋潤湯	『萬病回春』
	防風通聖散	『宣明論方』卷三方
	小承氣湯	『傷寒論 變陽明病脈證并治』
	大柴胡湯	『傷寒論 辨太陽病脈證并治中』
	梔豉湯	『傷寒論 辨太陽病脈證并治中』
	黃連解毒湯	『外臺秘要』卷一에 인용한 崔氏方
	桃仁承氣湯	『傷寒論 辨太陽病脈證并治中』
	當歸承氣湯	『素問病機氣宜保明集』中卷方
	涼膈散	『太平惠民和劑局方』卷六方
	加味二陳湯	『醫方集略』
	六鬱湯	『丹溪心法』卷三方
	七物厚朴湯	『世醫得效方』

爭功散	『東醫寶鑑』
加味二陳湯	『東醫寶鑑』
清心滾痰丸	『雜病源流犀燭 臟腑門』卷七方
當歸承氣湯	『素問病機氣宜保明集』中卷方
加味逍遙散	『東醫寶鑑』
清腸湯	『萬病回春』
瓜蒌枳實湯	『萬病回春 痰飲門』
竹瀝達痰丸	『雜病源流犀燭 六淫門』卷十四方
滾痰丸	『景岳全書 古方八陣』卷五十에 인용된 王隱君의 方
八正散	『太平惠民和劑局方』卷六方
大分清飲	『景岳全書 新方八陣』卷五十一方
禹功散	『濟衆新篇』
五淋散	『古今醫鑑』
增味導赤散	『仁齋直指方』
導滯湯	『東醫寶鑑』
瀉清丸	『症因脈治』
石決明散	『雜病源流犀燭 面部門』卷二十二方
洗肝明目湯	『增補萬病回春』卷五方
黃芩湯	『萬病回春』
回春涼膈散	『萬病回春』
黃連湯	『雜病源流犀燭 內傷外感門』卷二十三方
瀉胃湯	『萬病回春』
龍膽瀉肝湯	『東醫寶鑑』
秦芫蒼朮湯	『東醫寶鑑』
梔子清肝湯	『醫學入門』卷七 外科藥方
備急丸	『金匱要略 雜療方』
通經湯	『東醫寶鑑』

婦人良方에서 나온 處方에는 加味歸脾湯이 있다. 雜病源流犀燭에서 나온 處方에는 四物安神湯, 竹瀝達痰丸, 石決明散, 黃連湯이 있다. 東醫寶鑑에서 나온 處方에는 清上防風湯, 爭功散, 加味二陳湯, 導滯

湯, 加味逍遙散, 龍膽瀉肝湯, 秦芫蒼朮湯, 通經湯이 있다. 證治準繩에서 나온 處方에는 倉卒散, 淸肝解鬱湯이 있다. 萬病回春에서 나온 處方에는 滋潤湯, 淸腸湯, 瓜蒌枳實湯, 黃芩湯, 回春涼膈散, 瀉胃湯이 있다. 宣明論方에서 나온 處方에는 防風通聖散이 있다. 傷寒論에서 나온 處方에는 小承氣湯, 大柴胡湯, 梔豉湯, 桃仁承氣湯이 있다. 外臺秘要에서 나온 處方에는 黃連解毒湯이 있다. 素問病機氣宜保明集에서 나온 處方에는 當歸承氣湯이 있다. 太平惠民和劑局方에서 나온 處方에는 八正散이 있다. 醫方集略에서 나온 處方에는 增味二陳湯이 있다. 丹溪心法에서 나온 處方에는 六鬱湯이 있다. 世醫得效方에서 나온 處方에는 七物厚朴湯이 있다. 景岳全書에서 나온 處方에는 滾痰丸, 大分清飲이 있다. 濟衆新篇에서 나온 處方에는 禹功散이 있다. 古今醫鑑에서 나온 處方에는 五淋散이 있다. 仁齋直指方에서 나온 處方에는 增味導赤散이 있다. 症因脈治에서 나온 處方에는 瀉清丸이 있다. 增補萬病回春에서 나온 處方에는 洗肝明目湯이 있다. 醫學入門에서 나온 處方에는 梔子淸肝湯이 있다. 金匱要略에서 나온 處方에는 備急丸이 있다.

6) 大黃 및 梔子を 포함하는 方藥合編處方에서의 法製方法<sup>1)</sup>

大黃을 포함하고 있는 方藥合編處方에서의 大黃의 사용은 일반적으로 수처된 것 이외에 酒蒸, 酒浸를 이용하였다. 일반적으로 生大黃은 雜質을 除去하고 薄片 또는 小塊로 切斷用하고, 酒大黃은 生大黃에 黃酒를 고루 뿌려서 약한 불에다 볶아서 通風이 잘 되는 곳에서 乾燥하며, 熟大黃은 小塊로 切斷한 生大黃에 黃酒를 고루 混合하여 시루에 넣고 쪄서 乾燥한다.

梔子を 포함하고 있는 方藥合編處方에서의 梔子の 사용은 일반적으로 수처된 것 이외에 炒, 炒黑, 酒炒를 이용한다. 일반적으로 雜質을 除去하고 藥材를 잘 씻어서 切斷한 후에 그대로 쓰거나 均일한 火力로 볶아 쓴다.

蒸法은 藥物을 깨끗이 한 후 輔料를 加하거나, 加하지 않고 容器에 넣고 쪄서 均일한 정도로 만드는 方法이다. 이는 藥物의 性能을 變化시켜 用藥

의 範圍를 넓히거나 副作用을 減少시키기 위해서, 또는 藥效를 保存하고 貯藏에 편리하게 하기 위해서이다. 液體輔料를 넣어서 쪄는 약물은 輔料가 완전히 吸收된 후에 다시 쪄야 하고 쪄는 동안에는 일반적으로 먼저 센불을 사용하여 완전히 익은 후에 약한 불로 容器內에서 蒸氣가 충분히 吸收되도록 기다려야 한다. 또한 쪄 때에는 불의 세기와 시간에 주의하여야 한다.

炒法은 藥材를 잘 씻어서 細切한 후에 容器에 넣고 均일한 火力로 연속적으로 加熱하면서 계속 저어주거나 섞어서 均일한 정도로 均일하게 볶는 方法을 말한다. 이는 治療效果를 높이고 藥物의 性能을 緩和 또는 改變하며, 毒性和 刺戟性 減少 등을 목적으로 한다. 炒할 때에는 炒하는 정도에 따라 火力와 加熱時間을 달리해야 한다. 또한 熱을 均等하게 받게 하고 色과 潤澤을 均일하게 維持하기 위해 저어주거나 섞어주는데 이때에도 炒法의 종류와 藥物의 性質, 輔料의 차이에 의하여 정도를 달리 해주어야 한다.

술은 甘辛하고 大熱하여 능히 血脈을 통하고 藥의 기운을 잘 行하게 하며 散寒하고 矯味矯臭의 효능이 있다. 동시에 좋은 有機溶媒도 되므로 藥物의 여러 가지 成分, 예를 들어 알칼로이드 및 鹽類, 탄닌, 苦味質, 揮發油, 樹脂, 糖類 및 色素類(엽록소, 葉黃素) 등이 모두 酒중에 용해되기 쉬므로 酒製한 후에는 有效成分의 溶出이 쉽게 되어 治療效果가 높아진다. 酒浸에는 대개 白酒를 많이 사용하고, 酒炙에는 대개 黃酒를 많이 사용한다.

분류	處方名	法製方法
中統	四物安神湯	梔子(炒)
	倉卒散	山梔(連皮燒半過)
下統	增味二陳湯	梔子(炒)
	加味二陳湯	梔子(炒黑)
	淸心滾痰丸	大黃(酒蒸)
	淸腸湯	梔子(炒)
	竹瀝達痰丸	大黃(酒浸)
	滾痰丸	大黃(酒蒸)
	禹功散	山梔(炒)
	黃芩湯	梔子(酒炒)
	黃連湯	梔子(炒)
	梔子淸肝湯	梔子(酒炒)

## IV. 結 論

大黃 및 梔子를 포함하는 方藥合編 467處方을 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 大黃 및 梔子를 포함하는 處方은 上統에 1方, 中統에 5方, 下統에 39方으로 전 처방의 9.64%를 차지하였다.
2. 大黃이 들어간 처방이 18개, 梔子が 들어간 처방은 31개였고, 大黃 및 梔子が 같이 쓰인 處方은 涼膈散, 八正散, 瀉清丸, 石決明散으로 大黃과 梔子の 比率은 각각 2:1, 1:1, 1:1, 1:2 였다. 方藥合編에서 總 467方 중 4方만이 大黃과 梔子를 같이 사용하였다.
3. 사용된 大黃 및 梔子の 量은 大黃은 0.2~4錢, 梔子是 0.3~1.5錢이 쓰였다.
4. 大黃의 比率은 3.33%~57.14%까지 사용되었으며, 梔子の 比率은 3.47%~98%까지 사용되었다.
5. 主治에는 下焦濕熱로 인한 泌尿器疾患, 肝氣鬱結로 인한 鬱火證, 實證便秘, 熱毒證, 痰積疾患, 神經精神科疾患등 주로 熱證疾患이고 大黃 및 梔子が 가장 많이 쓰이는 질환은 濕熱로 인한 泌尿器系疾患으로 8方이 있다.
6. 出典文獻은 婦人良方, 雜病源流犀燭, 東醫寶鑑, 證治準繩, 萬病回春, 宣明論方, 傷寒論, 外臺秘要, 素問病機氣宜保明集, 太平惠民和劑局方, 醫方集略, 丹溪心法, 世醫得效方, 景岳全書, 濟衆新篇, 古今醫鑑, 仁齋直指方, 症因脈治, 增補萬病回春, 醫學入門, 金匱要略 21가지이다. 이 중 東醫寶鑑이 8方, 萬病回春이 6방, 傷寒論과 雜病源流犀燭이 각각 4方으로 많았다.
7. 大黃은 일반적으로 雜質을 제거하고 洗淨하여

사용한 것 이외에, 酒蒸, 酒浸를 하였고, 梔子는 주로 炒하여 사용하였다.

## V. 參考文獻

1. 全國韓醫科大學 本草學教室 : 本草學, 서울, 영림사, 2000 pp. 100-101, p. 113, pp. 167-168, pp. 242-243.
2. 金亨泰 : 方藥合編에 대한 연구, 대전원전 의사학회지, 제 5권, 1983. pp. 171-172.
3. 黃度淵 : 證脈方藥合編, 서울, 남산당, 2000. pp. 1-373.
4. 金舜應 발행 : 本草集成, 서울, 木과士, 2000, pp. 89-90, 211-212.