

# ●●● consultation

Q

## 12주 이후에 항체가 얼마나 만들어지나요?

●●● 어느 사이트에서유기 독감에 걸리려면 독감바이러스가 있어야 하듯 에이즈바이러스에 감염이 된 후 몇년이 지나야 HIV가 바뀐다고 했는데, 이것도 다른 사이트에서는 12주 검사에서 음성판정이 나온다면 12주 이후에 항체가 더 형성된다고, 몇 년이 지나서 한번 더 검사를 받아야 한다고 하는데요. 전 12주 검사에서 음성 나왔는데 보건소에서 몇 년 후에 검사를 다시 받아야 한다고 해서요. 12주 확인검사에서 음성판정이 나오기도 보건소에서 손을 굽니다. 12주 후보다 훨씬 늦게 항체가 형성되지 않을까요?

A

## 12주 검사에서 음성판정이 나왔다면 걱정하지 않으셔도 됩니다.

●●● 일관되지 않은 정보로 머무르고생각많으시네요. 상담 내용이 도움이 되기를 바랍니다. 일반적으로, 우리 몸은 새끼나 바이러스(대개는 항원이라고 합니다)가 체내에 들어오면 그에 맞는 항체를 형성하게 되어 있습니다. 그렇기에 HIV가 체내에 들어오면 우리 몸은 그에 대항하는 항체를 형성하게 됩니다. 일반적으로 행해지는 에이즈반응검사는 이 항체의 형성 유무를 가지고 감염여부를 판단하는 검사법입니다. 혈액검사에서 항체가 검출되면 몸 안에 HIV가 존재한다는 것이므로 감염이 된 것이고, 항체가 형성되지 않았다는 것은 바이러스가 존재하지 않는다는 것이지요.

그러나 HIV가 체내에 들어온다고 하더라도 항체가 바로 형성되는 것이 아닙니다. 빠른 사람들은 3주에도 형성이 되지만, 늦게 형성되는 사람들도 있습니다. 하지만, 늦어도 12주 안에는 형성이 되기에 선생님도 검사결과가 음성이나 왔다면 걱정하지 않아도 됩니다. 요즘은 시약의 발달로 검사의 정확도와 검증시기가 점점 더 정확해지고 빨라지고 있기에 12주면 충분합니다.

다른 궁금하신 사항 있으시면 상담실 남기기시거나 1588-5448로 전화주세요.

Q

## 구강성행위를 했는데 걱정이 됩니다.

●●● 얼마 전에 술에 취해 직장상사랑 안마·시술소에서 직업여성과 성관계를 가졌습니다. 성행위 할 때는 콘돔을 끝까지 사용하였는데 콘돔 사용 전에 구강성행위를 했는데, 나액으로도 감염위험이 있나요? 짹짹 하네요. 그리고 그 여성의 가슴도 예뻐했는데 유두에서도 티아나스가 나올 수도 있나요?

A

## 타액으로는 에이즈에 감염되지 않습니다.

●●● 에이즈는 HIV감염인의 혈액, 정액, 질분비액 등에 의해 전파되며, 침, 땀, 소변 등에 의해서는 전파되지 않습니다. 그러므로 타액을 통한 감염은 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그리고 HIV감염인 산모가 모유를 지속적으로 수유할 때 아기가 에이즈에 감염될 우려가 있으나, 모유는 산모에게만 존재하며 일반적인 여성에게는 모유가 존재하지 않습니다.

Q

### 어렸을 때 성폭행을 당했습니다.

●●● 어렸을 때 우제이지는 확실히 기억이 나지 않습니다. 거의 13~15년 정도 되지 않았을까 싶습니다. 초등학교 다닌 때였으니까요. 심에 가는 길에 성폭행을 당했습니다. 10년이 지나도 증상이 없을 수 있다는 걸 알고 이렇게 답답한 마음에 적습니다. 정말 아무렇지도 않을 수 있는 겁니까? 요즘 복용하지 않아도 시금까지 이렇게 별썽이 실이 있을 수 있는 겁니까? 제가 고등학교 때 헌혈을 한 적이 있는데 헌혈이민 나 검사 하지 않습니까? 그러면 혹시 제가 에이즈 양성반응이 있다면 저에게 따로 연락을 해주시는 겁니까? 오래 전 일이나 기억이 잘 나지 않습니다만 연락을 받은 일도 길가에 양성이 라고 쓰여 있지 않은 것 같습니다만 확실치 않습니다. 그걸 혹시 양성반응이 나왔다면 다른 병원을 갔을 때 그 병원에서 주민등록을 검색해보면 나오지는 않습니까? 자세히 알려주세요.

A

### 지금까지 아무런 증상이 없다면 에이즈와 무관합니다.

●●● 성폭행 경험으로 극복하기 어려울 텐데, 에이즈까지 염려하시니 마음이 아깝습니다. 13~15년 전 에이즈에 감염되었다면, 아무런 약된 치료를 하지 않은 상태인 지금쯤은 건강상태가 매우 좋지 않은 것 입니다. 헌혈 검사결과 HIV 감염 여부를 통보하지는 않지만 특별한 다른 조치가 없었던 것으로 보아 에이즈와는 무관하다고 판단됩니다. 병·의원에서는 에이즈 감염인의 기록을 확인할 수 없습니다. 조금도 염려하지 마시고 건강한 생활을 바랍니다.

Q

### 항문성교를 했는데 불안합니다.

●●● 최근에 2명의 남자와 성관계를 가졌는데 처음 남자한테는 제가 먼저 항문에 넣어보라고 해서 넣었는데 너무 아파서 그냥 뱉어요. 다음날도 고름이 있었고 노 대변을 르는데 피가 살짝 보이더라고요. 그리고 더 최근에 다른 남자도 몇 번 구겨했는데 그 남자 항문삽입을 여러 번 했어요. 물론 콘돔은 사용하지 않았고 언제 사정도 하지 않았다고 합니다. 이것으로 에이즈에 걸릴 수도 있는지 불안해서... 항문성교가 가능성이 제일 높니까 해서 너무나 불안하고 후회스럽습니다.

A

### 상대방이 비감염인이란 걱정하지 않으셔도 됩니다.

●●● 에이즈를 유발하는 원인균인 에이즈바이러스(HIV)는 에이즈 감염인의 체액(혈액, 정액, 질분비물, 모유) 속에만 존재합니다. 그러므로 상대방이 비감염인이란 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그러나 만약 상대방이 감염인이 있다면, 선생님께서 알고 계신대로 항문성교는 질성교보다 감염 가능성이 높습니다. 그 이유는 항문의 벽은 질과 달리 벽이 없어서 상처 나기가 쉬어 출혈이 잘 되어 상처된 부위로 바이러스의 침입이 용이하기 때문입니다. 만일 상대방의 감염 사실을 모르신다면, 의심되는 마지막 관계가 있을 지 12주가 지나서 검사를 받으면 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. 보건소에서는 무료, 익명으로 검사를 해드리고 있고요, 우리 협회에서도 무료, 익명검사를 해드리고 있습니다. 영등포에서는 매주 화요일, 금요일, 대곡와 장원에서는 매주 금요일 오전 9시부터 오후 5시까지 해드리고 있고요, 더욱 더 친절한 검사 및 상담과 익명성을 보장하기 위해 예약제로 운영되고 있으니 1588-5448로 전화 하셔서 문의하시기 바랍니다.