

東醫寶鑑 中 白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 活用に 대한 考察

이성준*, 장선일¹, 윤용갑*

¹전주대학교 대체의학대학 대체건강관리학부, *원광대학교 한의과대학 방제학교실

ABSTRACT

A study on Applications of prescriptions including Radix Angelicae Dahuricae as a main component in Donguibogam

Sung-Jun Lee*, Seon-Il Jang¹, Young-Gab Yun*

¹School of Alternative Medicine & Health Science, College of Alternative Medicine
jeonju University, jeonju 560-759, Korea

*Dept. of Oriental Medical Prescription, Wonkwang University

This report describes 94 prescriptions related to the use of Radix Angelicae Dahuricae main blended from Donguibogam. The following conclusions were reached through investigations on the prescriptions that use Radix Angelicae Dahuricae as a key component.

11.7% of wind, 10.6% of carbuncle and deep-rooted carbuncle, recorded the largest number of clinical frequency of the prescriptions in therapeutic use when Radix Angelicae Dahuricae was taken as a monarch drug in prescriptions. Prescriptions that utilize Radix Angelicae Dahuricae as the main component are used in the treatment of apoplexy and carbuncle and deep-rooted carbuncle, headache, wound and they are also used for treating 26 different types of diseases.

-
- 교신저자 : 윤용갑
 - 전북 익산시 신용동 344-2 원광대학교 한의과대학 방제학교실
 - Tel : 063-850-6834 E-mail : yunyg@wonkwang.ac.kr
 - 접수 : 2007/ 12/ 06 수정 : 2007/ 12/ 18 채택 : 2007/ 12/ 20

The prescriptions are compounded with Radix Angelicae Dahuricae as a monarch drug can apply to apoplexy, exogenous febrile disease, invasion by wind, wind-cold pathogen, wind-heat pathogen, epidemic disease, pestilence, bruise, bites, deficiency of liver and kidney, deficiency, phlegm-ire, phlegm-heat. The dosage of Radix Angelicae Dahuricae is 0.37g to 7.5g, however 3.75g has been taken the most for clinical application.

The function of Radix Angelicae Dahuricae is to expelling Wind and relieving pain, to expelling wound and forming muscle, to astrict and neutralizing poison, to expelling wind and to getting through body hole, to emit and relieving pain from the combination of drugs and prescriptions.

Key word : Radix Angelicae Dahuricae

1. 緒 論

白芷(RADIX ANGELICAE DAHURICAE)는 미나리과에 속한 多年生 草本인 구릿대 및 개구릿대의 根을 말하며, 학명은 *Angelica dahurica* (Fisch.) BENTH. et HOOKER와 *A. anomala* LALLEM.이다. 夏·秋의 양계절에 채취하여 殘莖·鬚根 및 泥土를 제거하고, 햇볕에 말리거나 微火烘乾하여 사용한다¹⁾. 白芷의 性味는 辛溫 無毒하고 肺脾胃로 歸經하며, 祛風解表, 消腫止痛, 通鼻止帶의 효능이 있어 風寒感冒로 인한 頭痛, 眉稜骨痛, 牙痛, 頭風 등의 症과, 瘡瘍腫痛, 鼻淵, 鼻塞, 白帶下 등의 치료에 사용한다^{2,4)}.

白芷에는 byak-angelicin, byak-angelicol, oxypeucedanin, imperatorin, torin, isoimperatorin, phellopterin 등 일종의 angelic acid와 비슷한 것이 함유되어 있으며, 대장균, Sonne균, Typhus균, Paratyphus균, Cholera균 등에 대한 抗菌作用과 혈관운동중추, 호흡중추, 미주신경 및 척수에 대한 興奮作用이 있는 것으로 보고되었다^{3,5,6)}.

한편, 白芷는 單味로도 효과가 있어서 感冒 및 頭風·頭痛의 症이나 蛇毒을 解毒하는데 都梁丸을 사용하기도 하였으며, 또한 蒼耳子 薄荷 辛荑 등의 藥物과 配伍하여 蒼耳散에서와 같이 鼻淵多濁涕가 있으면서 頭痛이 있을 때 사용하고, 荊芥 連翹 升麻 石膏 등의 藥物과 配伍하여 清陽散火湯에서와 같이 牙齒腫痛에 사용하며, 大黃과 配伍되면 宣毒散에서와 같이 一切腫毒을 치료하고, 海螵蛸, 胎盤 등의 藥物과 配伍되어 白芷散에서와 같이 赤白帶下의 滑脫不禁證을 다스린다^{3,4,5)}.

이와 같이 白芷는 配伍되는 藥物에 따라 다양한 效能을 발휘하고 있는 바, 이에 저자는 東醫寶鑑 中 白芷가 主藥으로 配伍된 方劑 94處方에 대한 治療領域, 病症 및 主治, 病因·病理, 使用量, 處方構成 등의 문헌적 자료 분석을 통하여 白芷의 活用에 대한 方劑學的 知見를 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 本 論

1. 白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域

에 대한 調查

調查方法은 東醫寶鑑 中 白芷가 主藥으로 活用된 94方劑의 內容을 data base化하여 文獻的 資料分析 및 研究內容을 정리하였으며, 處方名은 同一하나 構成內容이 다른 경우 處方에 (2)를 表記하

여 區分하였다. 本 논문에서 主藥이라 함은 處方 構成에서 白芷의 역할이나 使用量이 君臣藥으로 作用하거나 혹은 여러 가지 藥物과 等分으로 構成되어 있는 경우로 하였다.

Table 1

病門	處方	빈도수	백분율
風	龍虎丹, 定痛散(2), 疎風活血湯, 秘傳順氣散, 禦風丹, 二烏丸, 退風散, 疎風湯, 奪命散(5), 人參順氣散, 擗鼻通天散	11	11.7
癰疽	加味十奇散, 十宣散, 芎歸托裏散, 二仙散(2), 盪洗方, 二活散, 牡丹散, 蘇方散, 涼血飲, 十六味流氣飲	10	10.6
頭	加減芎辛湯, 天香散, 菊花茶調散, 一字輕金散, 防風散, 羌活附子湯, 三陽湯	7	7.3
牙齒	開笑散, 蜂窩散, 玉池散, 當歸蓮翹飲, 溫風散, 定痛散, 白芷湯	7	7.3
諸瘡	內塞散, 洗漏瘡方, 溫解散, 消風散(2), 疎風解毒散, 洗下疳瘡方	6	6.4
面	白附子散(2), 連翹散, 硫黃膏, 紅玉散, 升麻附子湯	5	5.2
諸傷	蔓荊散, 草烏散, 乳香散(5), 乳香定痛散, 活血散(2)	5	5.2
鼻	蒼耳散, 荊芥連翹湯, 芎藭散(2), 白龍丸	4	4.3
痰瘧	散邪湯, 正氣湯(2), 草果飲, 麻黃白朮湯	4	4.3
婦人	勝金丹, 催生散, 玉露散	3	3.2
瘟疫	芩連消毒飲, 清涼救苦散, 腎水太乙散	3	3.2
眼	臘茶飲, 退雲散, 石膏羌活散	3	3.2
耳	桂香散(2), 玄蔘貝母湯, 荊芥連翹湯(2)	3	3.2
寒	消風百解散, 十神湯(2), 葛根解肌湯(2)	3	3.2
口舌	芎芷膏, 瀉黃飲子	2	2.1
小兒	銅青散, 化蠱丸	2	2.1
腹	芎朮散, 開鬱導氣湯	2	2.1
毛髮	生禿烏雲油	1	1.1
聲音	芎辛散	1	1.1
乳	芷貝散	1	1.1
皮	藍葉散	1	1.1
前陰	活血驅風散	1	1.1
胞	補宮丸	1	1.1
腰	乳香疹痛散	1	1.1
血	鬱金散	1	1.1
足	羌活續斷湯	1	1.1
胸	神效散(3)	1	1.1
津液	溫粉	1	1.1
大便	皂角元	1	1.1
肉	前胡散	1	1.1
氣	八味順氣散	1	1.1
합계		94	100

2. 白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治 調査

白芷가 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分 하고, 이에 대한 病症과 主治를 調査하였다.

Table 2-1. 癰疽 및 諸瘡

區分	病症	處方	主治證狀
癰疽	癰疽	加味十奇散	癰疽已成 未成服之內消 或年衰氣弱者尤宜
		十宣散	一切癰疽 瘡癤 已成者速潰 未成者速散 敗膿自出 惡肉自去 止痛 排膿 生肌 其效如神
		芎歸托裏散	托裏 排膿 生肌
	癰疽雜病	二仙散(2)	癰疽 疼痛不可忍
	癰疽五發證	盪洗方	癰疽破穴後 誤入諸毒水 以致痛
	疔疽	二活散	疔 瘡
	腸癰腹癰	牡丹散	腸癰冷證 腹軟而痛 時下膿血
	便癰	蘇方散	便癰
	心癰	涼血飲	心癰 退潮 止渴 解熱 能內消
	腎癰	十六味流氣飲	癰疽 無名惡腫等 疾乃表裏氣血藥也
乳房結核	芷貝散	結核久成姦巖	
諸瘡	疔瘻	內塞散	疔瘻瘡 久不差
		洗漏瘡方	凡漏瘡孔中 多有穢惡 常須避風洗淨
		溫解散	漏瘡 散風冷
	大風瘡	消風散(2)	第一日服
	有名無名諸惡瘡	疎風解毒散	遍身瘡痒痛

Table 2-2. 眼·耳·鼻·咽喉科 疾患

區分	病症	處方	主治證狀
眼	外障	臘茶飲	赤脈翳 從上而下 此屬太陽 宜溫散之
	翳膜	退雲散	外障翳膜覆瞳子
	眼病	石膏羌活散	遠近內外翳障 風熱昏暗 爛弦赤眼 倒睫拳毛 一切目疾
耳	耳聾	桂香散(2)	風虛耳聾
	耳痒	玄蔘貝母湯	耳熱出汁作痒 乃痰火也
	耳痛成膿耳	荊芥連翹湯(2)	兩耳腫痛 由腎經有風熱
鼻	鼻淵	蒼耳散	鼻淵
		荊芥連翹湯	鼻淵
	鼻塞	芎藭散(2)	鼻塞爲鼽
鼻鼈	白龍丸	酒鼈 滿面紫黑	
咽喉	口臭	芎芷膏	口氣熱臭
	唇燥	瀉黃飲子	風熱蘊於脾經 唇燥皸裂無色
	雜病失音	芎辛散	熱痰壅盛失音 聲不出 是燥熱所致 用此即效

Table 2-3. 中風 疾患

區分	病症	處方	主治證狀
風	歷節風	龍虎丹	痛風走注 或麻木 半身痛
		定痛散(2)	風毒攻注皮膚 骨髓之間 痛無常處 晝靜夜劇 筋脉拘攣 不得屈伸
		疎風活血湯	四肢百節流注刺痛 皆是風 濕 痰 死血所致 其痛處或腫或紅
	諸風	秘傳順氣散	中風喎斜癱瘓 一切風疾
		禦風丹	中風口眼喎斜 半身不遂 神昏語澁
		人參順氣散	中風氣虛 喎斜癱瘓 語澁身疼
	破傷風	二烏丸	破傷風 角弓反張 牙關緊急
		退風散	破傷風 不省人事
	風有中血脉 中腑中臟	疎風湯	風中府 手足不仁 先宜解表 後用愈風湯調理
	卒中風	奪命散(5)	卒中風 涎潮氣塞 口噤目瞪 破傷風 搐搦 小兒驚風 危急之疾
取嚏法	搐鼻通天散	卒中不省 吹鼻即甦	

Table 2-4. 外感 疾患

區分	病症	處方	主治證狀
痲瘧	痲瘧	散邪湯	風瘧初起
		正氣湯(2)	風瘧初起
		草果飲	寒瘧
	六經瘧	麻黃白朮湯	風瘧
瘟疫	大頭瘟	芩連消毒飲	天行大頭病 咽喉腫痛
		清涼救苦散	大頭瘟 面鼻耳目腫痛
	瘟疫	腎水太乙散	瘟疫流行 不問陰陽兩感 頭痛 寒熱
寒	傷寒表證	消風百解散	感傷風寒 頭痛 身疼 鼻塞 聲重
		十神湯(2)	兩感風寒 頭痛 寒熱 無汗
	陽明形證用藥	葛根解肌湯(2)	陽明經病 目疼 鼻乾 不得臥 宜解肌

Table 2-5. 頭部 疾患

區分	病症	處方	主治證狀
頭	頭風證	加減芎辛湯	頭風或攻目
		天香散	久近頭風 發則頑痺 麻痒 不勝爬搔 或生癩 停痰嘔吐 飲食不入 兩服可斷根
		菊花茶調散	頭風鼻塞 或偏正頭痛
	正頭痛	一字輕金散	偏正頭痛 夾腦風 眉稜骨痛 牽引兩眼抽掣疼痛迸出 或生翳膜 視物不明
	頭目不清利	防風散	頭目不清 去風明目
	厥逆頭痛	羌活附子湯	大寒犯腦 令人腦痛 齒亦痛 名曰腦風
	頭痛當分六經	三陽湯	三陽合病爲頭痛

Table 2-6. 皮膚·顔面 疾患

區分	病症	處方	主治證狀
面	面上雜病	白附子散(2)	面上熱瘡 或斑點
		連翹散	面生穀嘴瘡 俗名粉刺
		硫黃膏	面上生瘡 或鼻臉赤紫 及風刺 粉刺 諸藥不效
		紅玉散	面上一切酒刺 風刺 黑黯斑子
	面寒	升麻附子湯	面寒
毛髮	鬚髮黃落	生禿烏雲油	能生鬚髮
皮	丹毒	藍葉散	丹毒

Table 2-7. 齒牙 疾患

區分	病症	處方	主治證狀
牙 齒	齒病含漱	開笑散	風冷齒痛
		蜂窩散	風牙 虫牙 痛不可忍
		玉池散	風虫牙痛 動搖潰爛 或變成骨槽風 出膿血 骨露
	蟲蝕痛	當歸蓮翹飲	齒痛 呷風痛甚 開口臭穢
		溫風散	風冷齒痛
		定痛散	虫牙痛甚
	齒 衄	鬱金散	齒齦出血

Table 2-8. 其他 疾患

區分	病症	處方	主治證狀
諸 傷	骨折筋斷傷	蔓荊散	打落 筋骨折傷 瘀血結痛
		草烏散	卽麻藥也 凡骨節出臼 用此麻之 然後用手整頓
	擗撲墮落壓倒傷	乳香散(5)	打撲傷損 痛不可忍
		乳香定痛散	諸傷損疼痛
	金刃傷	活血散(2)	刀鎗傷 腹裂腸出者
婦 人	求 嗣	勝金丹	月水愆期 久無嗣息 及血癖 氣痛 百般諸疾
	交骨不開難產	催生散	產 難
	瘟疫治法	玉露散	涼膈 壓乳 下乳汁
	帶 下	補宮丸	白帶及白淫
小 兒	諸 疳	銅青散	走馬牙疳
		化蟲丸	肺疳 鼻流臭汁 汁流處隨卽成瘡 名曰疳蠱 宜用此
腹	痰飲腹痛	芎朮散	痰積腹痛
	腹 痛	開鬱導氣湯	諸般腹痛 一服立止
前 陰	陰囊濕痒	活血驅風散	腎藏風 囊下濕痒 腳生瘡癬
腰	挫閃腰痛	乳香趁痛散	挫閃打墮腰痛
足	脚 氣	羌活續斷湯	脚氣 肝腎虛弱 筋攣骨痛
胸	冷心痛	神效散(3)	一切心脾疼 遇冷便作 引入背膂痛 不可忍 服之絕根
津 液	止汗法	溫 粉	止自汗
大 便	大便秘結	皂角元	專治風人 大便秘澁
肉	肉苛證	前胡散	肉苛證 苛者重也
氣	中 氣	八味順氣散	中氣最佳

3. 白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 病因·病 理 調查 白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理를 分類하여 區分하였다.

Table 3

區分	病因病理	病症	處方	비고	
外因	痛風走注	或麻木 半身痛	龍虎丹		
	風毒攻注皮膚骨髓之間	痛無常處 晝靜夜劇 筋脉拘攣 不得屈伸	定痛散(2)		
	風濕痰死血所致	四肢百節流注刺痛 其痛處或腫或紅	疎風活血湯		
	頭風	頭風或攻目		加減芎辛湯	
		發則頭痺 麻痒 不勝爬搔 或生疱 停痰嘔吐 飲食不入		天香散	
		鼻塞 或偏正頭痛		菊花茶調散	
		偏正頭風痛 夾腦風 眉稜骨痛 牽引兩眼抽掣疼痛迸出 或生翳膜 視物不明		一字輕金散	
	寒瘧		草果飲		
	傷風	頭目不清	防風散		
	傷寒	腦痛 齒亦痛	羌活附子湯		
	太陽病	赤脈腎 從上而下	臘茶飲		
	三陽合病	頭痛	三陽湯		
	陽明經病	目疼 鼻乾 不得臥	葛根解肌湯(2)		
	風冷	齒痛		開笑散	
				溫風散	
		漏瘡		溫解散	
	風虛	耳聾	桂香散(2)		
風瘡	初起		麻黃白朮湯		
			散邪湯		
			正氣湯(2)		
風寒	頭痛 身疼 鼻塞 聲重		消風百解散		
	頭痛 寒熱 無汗		十神湯(2)		
外因	天行大頭病	咽喉腫痛	芩連消毒飲		
	大頭瘟	面鼻耳目腫痛	清涼救苦散		
	瘟疫流行	頭痛 寒熱	神授太乙散		
	風熱	遠近內外翳障 爛弦赤眼 倒睫拳毛		石膏羌活散	
		兩耳腫痛		荊芥連翹湯(2)	
	唇燥濡裂無色		瀉黃飲子		

內 因	冷	心脾疼 遇冷便作 引入背脊痛 不可忍 服之絶根	神效散(3)	
	中 風	喎斜癱瘓 一切風疾	秘傳順氣散	
		口眼喎斜 半身不遂 神昏語澁	禦風丹	
	破傷風	角弓反張 牙關緊急	二烏丸	
		不省人事	退風散	
	風中府	手足不仁	疎風湯	
	卒中風 涎潮氣塞 破傷風	口噤目瞪 搖溺 小兒驚風	奪命散(5)	
	中風氣虛	喎斜癱瘓 語澁身疼	人參順氣散	
卒 中	不 省	搖鼻通天散		
中 氣		八味順氣散		
不內 外因	癰疽破穴後 誤入諸毒水	以致痛	盪洗方	
	虫 牙	痛 甚	定痛散	
	打落 筋骨折傷	瘀血結痛	蔓荊散	
	打撲傷損	痛不可忍	乳香散	
	外 傷	骨節出臼	草烏散	
		諸傷損疼痛	乳香定痛散	
	刀鎗傷	腹裂腸出	活血散(2)	
	挫閃打墮	腰 痛	乳香趁痛散	
	風虫牙	牙痛 動搖潰爛 或變成骨槽風 出膿血 骨露	玉池散	
	風 牙	痛不可忍	蜂窩散	
	心 癰	潮熱 渴 發熱	涼血飲	
	肺 疔	鼻流臭汁 汁流處隨即成瘡	化癰丸	
腎藏風	囊下濕痒 脚生瘡癬	活血驅風散		
五藏 六府	肝腎虛弱	脚氣 筋攣骨痛	羌活續斷湯	
기타	氣 虛	癰疽已成 未成服之內消	加味十奇散	
		一切癰疽 瘡癤	十宣散	
	痰 火	耳熱出汗作痒	玄參貝母湯	
	痰 積	腹 痛	芎朮散	
	熱痰壅盛	失音 聲不出	芎辛散	

4. 白芷의 使用量에 대한 調査

白芷가 主藥으로 配伍된 方劑에서 白芷의 一回 使用量을 調査하여 分量別로 病症과 處方을 定理 하였다. 丸劑로 되어있는 경우에는 20첩 分量으로

나누어 환산하였으며 1회 사용량의 근거가 계산되지 않은 2종과 외용제로 사용하는 5종의 처방은 제외하였다.

Table 4

用 量	病 症	處 方	비 고	빈도수
一 分	歷節風治法	定痛散(2)	七錢半 換算	
二 分	挫閃腰痛	乳香趁痛散	三錢 換算	7.4%
	疔 瘻	內塞散	五錢 換算	
	骨折筋斷傷	草烏散	一兩二錢半 換算	
	頭目不清利	防風散	一兩 換算	
	頭風證	菊花茶調散	一兩 換算	
	疔 疽	二活散	二錢 換算	
五 分	頭風證	加減芎辛湯		4.3%
	面上雜病	硫黃膏		
	鼻 淵	荊芥連翹湯		
	脚氣治法	羌活續斷湯		
六 分	諸風通治	秘傳順氣散		3.1%
	腎 癱	十六味流氣飲		
	陰囊濕痒	活血驅風散		
七 分	蟲蝕痛	當歸連翹飲		13.8%
	有名無名諸惡瘡	疎風解毒散		
	面上雜病	連翹散		
	面 寒	升麻附子湯		
	鼻 塞	芎藭散(2)		
	六經瘡	麻黃白朮湯		
	大頭瘟治法	芩連消毒飲		
	瘟疫治法	腎水太乙散		
	耳痛成膿耳	荊芥連翹湯(2)		
	冷心痛	神效散(2)		
	中 氣	八味順氣散		
	大風瘡	消風散(2)	一兩 換算	
	求 嗣	勝金丹	一兩 換算	
八 分	風有中血脉中膈中臟之異	疎風湯		3.1%
	便 癱	蘇方散		
	心 癱	涼血飲		
九 分	骨折筋斷傷	蔓荊散	一兩 換算	
一 錢	歷節風治法	疎風活血湯		29.7%
	破傷風治法	退風散		
	中風宜調氣	人參順氣散		
	腸癰腹癰	牡丹散		
	頭風證	天香散		
	厥逆頭痛	羌活附子湯		
	頭痛當分六經	三陽湯		

	齒病含漱方	蜂窩散		
		玉池散		
	蟲蝕痛	溫風散		
		定痛散		
	齒病惡寒惡熱	白芷湯		
	疔 癩	溫解散		
		散邪湯		
	疔 瘡	正氣湯(2)		
		草果飲		
	外 障	臘茶飲		
	腎 膜	退雲散		
	耳 聾	桂香散		
	耳 痒	玄蔘貝母湯		
		消風百解散		
	傷寒表證	十神湯(2)		
	陽明形證用藥	葛根解肌湯(2)		
	唇 燥	瀉黃飲子		
	腹痛通治	開鬱導氣湯		
	因雜病失音	芎辛散		
	丹 毒	藍葉散		
	鼻 淵	蒼耳散	一兩 換算	
一錢二分	癰疽排膿生肌法	芎歸托裏散		
一錢六分	諸風通治	禦風丹		
	歷節風治法	龍虎丹		
二 錢	下乳汁	玉露散		
各等分	卒中風救急	奪命散(5)		22.3%
	取嚏法	搐鼻通天散		
	癰疽內托法	加味十奇散		
		十宣散		
	齒病含漱方	開笑散		
	面上雜病	白附子散(2)		
	癱撲墮落壓倒傷	乳香散(5)		
		乳香定痛散		
	金刃傷	活血散(2)		
	鼻 鼾	白龍丸		
	交骨不開難產	催生散		
	大頭瘟治法	清涼救苦散		
	通治眼病藥	石膏羌活散		
	口 臭	芎芷膏		
諸 疔	化蠱丸			

	痰飲腹痛	芎朮散	
	結核久成妳巖	芷貝散	
	帶下治法	補宮丸	
	齒 衄	鬱金散	
	止汗法	溫 粉	
	大便秘結	皂角元	

5. 白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容 調査

白芷가 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分하고, 이에 대한 處方構成 內容을 分析하였다.

Table 5-1. 癰疽 및 諸瘡

病 症	處 方	構成內容	構成基本方
癰 疽	加味十宣散	當歸 肉桂 人參 黃芪 川芎 白芷 防風 桔梗 厚朴 甘草 乳香 沒藥 各等分	十宣散, 乳香散
	十宣散	人參 黃芪鹽水浸蒸焙 當歸酒洗 厚朴薑製 桔梗 肉桂 川芎 防風 白芷 甘草 各等分	保元湯, 芎歸湯
	芎歸托裏散	川芎 當歸 白芍藥酒炒 白茯苓 木香 白芷 各一錢二分 人參 辣桂 丁香 甘草生 各七分	理血湯, 四君子湯類
	二仙散(2)	白芷(未潰用一兩已潰用五錢) 貝母(未潰用五錢已潰用一兩)	芷貝散
	盪洗方	露蜂房 白芷 苦參 川椒	
	二活散	羌活 獨活 當歸 烏藥 赤芍藥 金銀花 天花粉 連翹 白芷 甘草節各二錢 紅花 蘇木 荊芥 蟬蛻 乾葛各一錢半 檀香一錢	金銀花散
	牡丹散	牡丹皮 人參 天麻 白茯苓 黃芪 薏苡仁 桃仁 白芷 當歸 川芎 各一錢 官桂 甘草 各五分 木香 三分	桂枝茯苓丸類 保元湯, 芎歸湯
	蘇方散	木鱉子 當歸尾 赤芍藥 白芷 川芎 射干 大黃 金銀花 穿山甲 沒藥 蘇木 甘草 各八分	金銀花散, 四順清涼飲 芎歸湯
癰 疽	涼血飲	木通 瞿麥 荊芥 薄荷 白芷 天花粉 赤芍藥 麥門冬 生乾地黃 梔子 車前子 連翹 甘草 各八分	通心飲類
	十六味流氣飲	人參 當歸 黃芪 桔梗 防風 木香 枳殼 川芎 肉桂 白芍藥 檳榔 白芷 厚朴 紫蘇葉 烏藥 甘草 各六分	保元湯, 理血湯 桔梗枳殼湯, 四磨散類
	芷貝散	白芷 貝母 等分	
諸 瘡	內塞散	人參 黃芪 當歸 白茯苓 防風 白芷 桔梗 川芎 遠志 厚朴 官桂 赤小豆 甘草灸 各五錢 附子炮 一箇	保元湯, 芎歸湯
	洗漏瘡方	白芷 露蜂房 或大腹皮 苦參	
	溫解散	蒼朮 厚朴 陳皮 藿香 半夏麴 川芎 白芷 細辛 各一錢 官桂 白薑 甘草灸 各七分	平胃散, 不換金正氣散

	消風散(2)	白芷 全蝎 人參 各一兩	
	疎風解毒散	白芷 細辛 蒺藜子炒 麻黃 檳榔 當歸鬚 生乾地黃 川芎 赤芍藥 獨活 白牽牛微炒 桑白皮炒 蒼朮炒 枳殼 甘草 灸 各七分	九味羌活湯類 四物湯類
	洗下疳瘡方	黃栢 黃連 當歸 白芷 獨活 防風 朴硝 荊芥 各三錢 入銅錢 五十文 烏梅五箇 鹽一匙	

Table 5-2. 眼·耳·鼻·咽喉科 疾患

病症	處方	構成內容	構成基本方
眼	臘茶飲	芽茶 附子 白芷 各一錢 細辛 川芎 防風 羌活 荊芥 各半錢	防風湯
	退雲散	當歸 生乾地黃 穀精草 白菊 木賊 羌活 石決明煨 大黃酒炒 蔓荊子 白芷 黃栢 連翹 草龍膽 各一錢 蟬退 七箇	
	石膏羌活散	石膏(清腎墜疹) 羌活(腦熱頭風) 黃芩(洗心退熱) 藁本(頭風頭疼) 密蒙花(羞明怕日) 木賊(退翳障) 白芷(清利頭目) 蘿菥子(起倒睫) 細辛(疎風) 麻仁(起拳毛) 川芎(治頭風) 蒼朮(開鬱行氣) 甘菊(明目去風) 荊芥(目中生瘡) 甘草(解毒)各等分	菊花散類 蒼朮散類
耳	桂香散(2)	南星炮 白芷 各一錢 辣桂 川芎 當歸 細辛 菖蒲 木香 木通 白蒺藜 麻黃 甘草 各七分	星香散類 麻黃附子細辛湯 芎歸湯
	玄蔘貝母湯	防風 貝母 天花粉 黃栢鹽水炒 白茯苓 玄參 白芷 蔓荊子 天麻 半夏製 各一錢 甘草五分	二陳湯類
	荊芥連翹湯(2)	荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 白芍藥 柴胡 枳殼 黃芩 梔子 白芷 桔梗各七分 甘草 五分	回春涼膈散類
鼻	蒼耳散	白芷一兩 辛夷五錢 蒼耳子炒 二錢半 薄荷 一錢	
	荊芥連翹湯	荊芥 柴胡 川芎 當歸 生地黃 赤芍藥 白芷 防風 薄荷 梔子 黃芩 桔梗 連翹 各五分 甘草 三分	回春涼膈散類 生料四物湯
	芎藭散(2)	芎藭 檳榔 麻黃 肉桂 防己 木通 細辛 白芷 菖蒲 各七分 木香 川椒 甘草 各三分半	麻黃附子細辛湯
	白龍丸	川芎 藁本 細辛 白芷 甘草各等分	
咽喉	芎芷膏	川芎 白芷等分	
	瀉黃飲子	升麻 白芷 枳殼 黃芩 防風 半夏 石斛 各一錢 甘草 五分	
	芎辛散	川芎 細辛 防風 桔梗 白芷 羌活 桑白皮各一錢 甘草五分	防風散 瀉白散類

Table 5-3. 中風 疾患

病 症	處 方	構 成 內 容	構 成 基 本 方
風	龍虎丹	草烏 蒼朮 白芷 各一兩 當歸 牛膝 各五錢 用童便薑·葱汁拌 燻熱 入乳香 沒藥 各三錢	乳香散
	定痛散(2)	蒼耳子 骨碎補 自然銅 血竭 白附子 赤芍藥 當歸 肉桂 白芷 沒藥 防風 牛膝 各七錢半 虎脛骨 龜板 各五錢 天麻 檳榔 羌活 五加皮 各二錢半	乳香趁痛散
	疎風活血湯	當歸 川芎 威靈仙 白芷 防己 黃栢 南星 蒼朮 羌活 桂枝各一錢 紅花三分	芎歸湯, 二妙散
	秘傳順氣散	青皮 陳皮 枳殼 桔梗 烏藥 人參 白朮 白茯苓 半夏 川芎 白芷 細辛 麻黃 防風 乾薑 白僵蠶 甘草 各六分	四君子湯, 二陳湯, 桔梗枳殼湯, 烏藥順氣散
	禦風丹	麻黃 防風 白芷各一兩半 乾生薑 甘草 各七錢半 川芎 白芍藥 桔梗 細辛 白僵蠶 羌活 南星 各五錢	九味羌活湯類 烏藥順氣散, 防風湯
	二烏丸	生川烏 白芷 天麻各二錢 生草烏 雄黃 各一錢	
	退風散	防風 天麻 白芷 麻黃 赤茯苓 當歸 各一錢 薄荷 七分 荊芥 白僵蠶 甘草 各五分	紅綿散類 (薄荷 防風)
	疎風湯	羌活 防風 當歸 川芎 赤茯苓 陳皮 半夏 烏藥 白芷 香附子 各八分 桂枝 細辛 甘草 各三分	二陳湯, 莎芎散, 芎歸湯, 防風湯
	奪命散(5)	天南星 葶藶子 白芷 半夏 巴豆去殼不去油 各等分	
	人參順氣散	麻黃 陳皮 川芎 白芷 白朮 厚朴 桔梗 甘草 各一錢 乾葛 七分半 人參 乾薑 各五分	烏藥順氣散, 四君子湯類
	擗鼻通天散	川芎 細辛 藜蘆 白芷 防風 薄荷 皂角 各等分	

Table 5-4. 外感 疾患

病 症	處 方	構 成 內 容	構 成 基 本 方
疫 瘧	散邪湯	川芎 白芷 麻黃 白芍藥 防風 荊芥 紫蘇葉 羌活 各一錢 甘草 五分	防風湯類, 芎芷膏
	正氣湯(2)	柴胡 前胡 川芎 白芷 半夏 麥門冬 檳榔 草果 青皮 赤茯苓 各一錢 桂枝 甘草 各五分	二陳湯類
	草果飲	草果 白芷 良薑 青皮 川芎 紫蘇葉 甘草 各一錢	
	麻黃白朮湯	麻黃 桂皮 青皮 陳皮 川芎 白芷 半夏麴 紫蘇葉 赤茯苓 白朮 桔梗 細辛 檳榔 甘草 各七分	麻黃湯類, 二陳湯, 芎芷香蘇散類
瘟 疫	苓連消毒飲	黃連 黃芩 柴胡 桔梗 川芎 荊芥 防風 羌活 枳殼 連翹 射干 白芷 甘草各七分	荊防敗毒散類, 加味消毒飲
	清涼救苦散	芙蓉葉 桑葉 白芨 白斂 車前葉 大黃 黃連 黃栢 白芷 雄黃 赤小豆 芒硝 各等分	白斂散
	腎水太乙散	赤芍藥 羌活 藿香 細辛 青皮 川芎 白芷 桔梗 枳殼 柴胡 陳皮 香附子 蒼朮 防風 藁本 甘草 各七分 乾葛 升麻 紫蘇葉 各三分	十神湯, 回生散, 桔梗枳殼湯, 九味羌活湯類
寒	消風百解散	荊芥 蒼朮 白芷 陳皮 麻黃 各一錢 甘草 五分	
	十神湯(2)	香附子 紫蘇葉 升麻 赤芍藥 麻黃 陳皮 川芎 乾葛 白芷 甘草 各一錢	芎芷香蘇散類, 升麻葛根湯
	葛根解肌湯(2)	葛根 柴胡 黃芩 芍藥 羌活 石膏 升麻 白芷 桔梗 各一錢 甘草五分	葛根湯, 升麻葛根湯

Table 5-5. 頭部 疾患

病 症	處 方	構成內容	構成基本方
頭	加減芎辛湯	川芎 細辛 白芷 石膏 藁本 皂角 羌活 防風 荊芥 桔梗 蔓荊子 甘菊 薄荷 甘草 各五分	川芎茶調散類, 防風散
	天香散	南星 半夏並湯洗七次 川烏 生白芷 各一錢	三仙丸
	菊花茶調散	甘菊 川芎 荊芥 羌活 白芷 甘草 各一兩 防風 七錢半 細辛 五錢 蟬殼 白僵蠶 薄荷 各二錢半	川芎茶調散類, 防風散
	一字輕金散	川芎 白芷 藿香 荊芥 旋覆花 石膏 防風 各五錢 南星 川烏生 各 二錢半 草烏 一錢半	天香散
	防風散	防風 川芎 白芷 甘菊 甘草各一兩	
	羌活附子湯	麻黃 附子 防風 白芷 白僵蠶炒各一錢 黃柏 羌活 蒼朮 各七分 黃芪 升麻 甘草灸各五分	防風湯, 二妙散
	三陽湯	羌活 防風 石膏 白芷 柴胡 川芎各一錢 荊芥 升麻 葛根 芍藥 細 辛各五分	防風湯, 升麻葛根湯類

Table 5-6. 皮膚·顔面 疾患

病 症	處 方	構成內容	構成基本方
面	白附子散(2)	白附子 密佉僧 白茯苓 白芷 官粉各等分	
	連翹散	連翹 川芎 白芷 片苓 黃連 沙參 荊芥 桑白皮 梔子 貝母 甘草 各七分	黃連解毒湯類, 敗毒散
	硫黃膏	生硫黃 白芷 瓜蒌根 膩粉 各半錢 全蝎 三箇 蟬殼五枚 莞青七 枚去翅足	
	紅玉散	白芷 藿香 牙皂各二錢 天花粉 白茯苓 各一錢半 甘松 三乃子 木澤 白丁香 細辛 杏仁 密佉僧各一錢 樟腦五分 白芨三分	
	升麻附子湯	升麻 附子炮 葛根 白芷 黃芪蜜炒 各七分 人參 草豆蔻 甘草灸 各五分 益智仁三分	升麻葛根湯類
毛 髮	生禿烏雲油	川椒 白芷 川芎各一兩 蔓荊子 零陵香 附子各五錢	
皮	藍葉散	藍葉 乾葛 升麻 生地黃 赤芍藥 川芎 杏仁 知母 柴胡 白芷 甘 草生 各一錢 石膏 梔子 各五分	升麻葛根湯, 白虎湯類, 四物湯類

Table 5-7. 齒牙 疾患

病 症	處 方	構成內容	構成基本方
牙 齒	開笑散	白芷 細辛 良薑 華撥 川椒 香附子 露蜂房 各等分	
	蜂窩散	露蜂房 白茯苓 川椒 艾葉 葱根 荊芥 細辛 白芷各一錢	
	玉池散	地骨皮 白芷 細辛 防風 升麻 川芎 當歸 槐花 藁本 甘草 各一錢	白龍丸, 芎歸湯
	當歸蓮翹 飲	當歸 生地黃 川芎 連翹 防風 荊芥 白芷 羌活 黃芩 梔子 枳殼 甘草 各七分 細辛 三分	四物湯類, 九味羌活湯類
	溫風散	當歸 川芎 細辛 白芷 華撥 藁本 露蜂房 各一錢	芎歸湯
	定痛散	當歸 生地黃 細辛 乾薑 白芷 連翹 苦參 黃連 川椒 桔梗 烏梅 甘草 各一錢	
	白芷湯	防風 荊芥 連翹 白芷 薄荷 赤芍藥 石膏各一錢	
	鬱金散	鬱金 白芷 細辛 各等分	

Table 5-8. 其他 疾患

病 症	處 方	構 成 內 容	構 成 基 本 方
諸 傷	蔓荊散	頑荊葉(無則荊芥代之) 蔓荊子 白芷 細辛 防風 川芎 桂皮 丁香皮 羌活 各一兩	防風湯
	草烏散	皂角 木鱉子 紫金皮 白芷 半夏 烏藥 當歸 川芎 川烏 各一兩 二錢半 草烏 茴香 坐拏草 各二錢半 木香 一錢 並無煨製	芎歸湯
	乳香散(5)	白朮炒 當歸炒 白芷 桂皮 乳香 沒藥 甘草 各等分	乳香散(3)
	乳香定痛散	白芷 當歸 生苻 牡丹皮 赤芍藥 川芎 乳香 沒藥 白朮 甘草 各等分	四物湯類, 乳香散(3)
	活血散(2)	黃芪 當歸 川芎 白芷 續斷 赤芍藥 鹿茸 黃芩 細辛 乾薑 附子 暑各等分	四物湯類, 茸附湯, 芎歸湯
婦 人	勝金丹	牡丹皮 藁本 人參 當歸 白茯苓 赤石脂 白芷 肉桂 白薇 川芎 玄胡索 白芍藥 白朮 各一兩 沈香 甘草各五錢	桂枝茯苓丸類, 四君子湯, 芎歸湯
	催生散	白芷炒黑 百草霜 滑石 各等分	芎歸湯
	玉露散	桔梗 川芎 白芷 各二錢 赤芍藥一錢半 人參 赤茯苓 甘草 各一錢 當歸五分	理血湯
	補宮丸	鹿角霜 白茯苓 白芷 白朮 烏賊魚骨 白薇 白芍藥 牡蠣粉 山藥 各等分	白龍丸類, 三白湯
小 兒	銅青散	白芷 五錢 銅綠 二錢半 馬牙硝 一錢 麝香 一字	
	化蟲丸	宜用此 蕪荑蘆 青黛 川芎 白芷 胡黃連 黃連蝦灰各等分	
腹	芎朮散	川芎 蒼朮 香附 白芷各等分	
	開鬱導氣湯	蒼朮 香附便炒 白芷 川芎 赤茯苓 滑石 梔子炒 神麴炒 各一錢 乾薑炮 陳皮 各五分 甘草灸三分	越菊丸, 交感丹
前 陰	活血驅風散	白藜炒 當歸 川芎 白芷 細辛 桃仁 半夏槐潤 白芍藥 五靈脂 甘草生各六分 蒼朮 杜冲 桂皮 薏苡仁 天麻 橘紅 檳榔 厚朴 枳殼各三分	芎歸湯, 理血湯, 平胃散
腰	乳香趁痛散	骨碎補炒 蒼耳子炒 自然銅火煨醋淬 白芷 桂皮 防風 當歸 赤芍藥 血竭 沒藥白附子 各三錢 虎脛骨酒灸 龜板酒灸 各二錢 牛膝 天麻 檳榔 五加皮 羌活 各一錢 加全蝎 一錢	防風湯
足	羌活續斷湯	羌活 防風 白芷 細辛 杜冲 牛膝 秦艽 續斷 熟地黃 當歸 人參 白芍藥 赤茯苓 桂心 川芎各五分	八珍湯, 防風湯, 杜續丸
胸	神效散(3)	木香 青皮 陳皮 麥芽 枳殼 三稜 蓬朮 神麴 白芍藥 白芷 肉桂 玄胡索 破故紙 甘草 各七分 華澄茄 丁香 各三分	六味三稜丸, 芍藥甘草湯
津液	溫粉	白朮 藁本 川芎 白芷各等分	
大便	皂角元	羌活 防風 豬牙 皂角 枳殼 桑白皮 檳榔 杏仁 麻仁 白芷 陳皮 各等分	防風湯
肉	前胡散	前胡 白芷 細辛 官桂 白朮 川芎 各三兩 吳茱萸 附子炮 當歸 各二兩 川椒三錢	芎歸湯
氣	八味順氣散	人參 白朮 白茯苓 青皮 白芷 陳皮 烏藥 各七分 甘草三分	四君子湯, 異功散

Ⅲ. 考 察

白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療영역에 대하여 조사한 결과 (Table 1)에서와 같이 風, 癰疽, 頭, 牙齒, 諸瘡, 面, 諸傷, 鼻, 疥癩, 婦人, 瘟疫, 眼, 耳, 寒, 口舌, 小兒, 腹, 毛髮, 聲音, 乳, 皮, 前陰, 胞, 腰, 血, 足, 胸, 津液, 大便, 肉, 氣 등 31개 영역에서 活用하고 있음을 알 수 있다.

이 중 風에 使用한 처방 빈도수가 11.7%로 가장 많았고, 癰疽에 使用한 빈도수는 10.6%, 頭와 牙齒에 使用한 빈도수는 각각 7.3% 등으로 조사되어 白芷는 主로 風으로 인한 外感疾患과 癰疽, 頭, 牙齒 등의 外科疾患 등에 가장 많이 活用되고 있음을 알 수 있으며, 그 밖의 治療영역의 처방 인용 빈도수는 (Table 1)과 같다.

癰疽와 諸瘡 疾患에서는 癰疽, 疔疽, 腸癰, 便癰, 心癰, 腎癰, 乳房結核 등 각종 癰疽에 白芷를 主藥으로 使用하였고, 疔瘻, 大風瘡, 惡瘡 등에도 使用하고 있다(Table 2-1).

五官科疾患 中 眼疾患 病症은 外障, 翳膜, 일반 眼病, 耳疾患에서는 耳聾, 耳痒, 膿耳, 鼻疾患에서는 鼻淵, 鼻塞, 鼻鼈, 咽喉病에서는 口臭, 唇燥, 失音 등에 白芷를 主藥을 使用하였다(Table 2-2).

中風에서는 歷節風, 臍風, 破傷風, 卒中風에, 外感疾患에서는 疥癩, 瘟疫, 傷寒에, 頭部疾患에서는 頭風證, 正頭痛, 頭目不清利, 厥逆頭痛에 白芷를 主藥으로 使用하였다(Table 2-3, 2-4, 2-5).

皮膚疾患에서는 面上雜病, 面寒, 鬚髮黃落, 丹毒에, 齒牙疾患에서는 蟲蝕痛, 齒衄, 齒病含漱 등과 骨折傷, 打撲傷, 金刀傷, 求嗣, 帶下, 諸疔, 腹痛, 陰囊濕痒, 挫閃腰痛, 脚氣, 冷心痛, 大便秘結 등의 病症에 白芷를 主藥으로 使用하고 있음을 알 수 있다(Table 2-6, 2-7, 2-8).

白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理를 조사한 결과는 (Table 3)에서 보는 바와 같다. 즉, 外感에 관련된 病因·病理로는 傷寒, 傷風, 風寒, 風熱, 風冷, 風癩, 天行, 瘟疫 등이 조사되어 白芷

는 風寒邪에 관련된 病理에 주로 活用되고 있음을 알 수 있다. 또한 內傷에 관련된 病因·病理로서 卒中, 中風, 中氣 등이 조사되어 白芷는 中風 질환에도 活用될 수 있음을 알 수 있다.

각종 外傷에 관련된 病因·病理로서 打撲損傷이나 挫閃, 咬傷, 刀創傷 등에 活用되고 있어, 外科 領域에 活用도가 높은 것을 알 수 있다.

그 밖에도 肝腎虛弱이나 氣虛로 인한 癰疽에도 白芷를 使用하고 있고, 痰火나 痰熱을 제거하는 작용도 있음을 알 수 있다.

白芷가 主藥으로 配伍된 方劑에서 使用량을 조사한 결과는 (Table 4)에서 보는 바와 같다. 즉, 一回 使用量으로 볼 때 一分, 二分, 五分, 六分, 七分, 八分, 九分 一錢, 一錢二分, 一錢六分, 二錢, 各等分인 경우 등이 조사되었다. 94종의 처방중 1회 사용분량이 확실치 않은 처방이 3종이 있었고 三錢이상 쓴 경우는 대부분 外用劑로 三兩까지 사용한 경우도 있음을 알 수 있었다. 이 중 가장 많이 使用된 경우가 一錢으로 전체의 30%를 차지하였으며, 그 다음이 一分~八分 사이의 用量이 使用되었다.

그 밖에도 使用량이 일정하지 않은 等分으로 活用된 경우도 많이 있어 使用量범위 內에서 적당량을 使用하면 큰 무리가 없을 것으로 보인다.

白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容을 조사해보면 (Table 5-1)에서 (Table 5-8)에서 보는 바와 같다.

癰疽 및 諸瘡病에서는 白芷와 더불어 金銀花散, 保元湯, 芎歸湯, 十宣散, 芷貝散 등을 基本方으로 配合하고 있어 白芷가 活血祛瘀, 托瘡生肌, 消炎作用이 있음을 알 수 있다(Table 5-1).

眼·耳·鼻·咽喉疾患에서는 細辛, 薄荷, 蒼耳子, 川椒, 川芎, 羌活, 防風, 藁本을 많이 使用하고 있어 白芷가 祛風止痛, 通竅에 活用하고 있음을 알 수 있다(Table 5-2).

中風疾患에서는 乳香散, 乳香趁痛散, 二烏丸 등을 白芷와 함께 使用하고 있어 鎮痛作用이 유도

되도록 하였으며, 防風湯, 烏藥順氣散, 桔梗枳殼湯과 配合한 경우도 있어 白芷가 祛風·順氣·覺醒作用에도 도움을 주고 있음을 알 수 있다(Table 5-3).

外感疾患에서는 敗毒散, 九味羌活湯, 升麻葛根湯, 芎芷香蘇散 등을 基本方으로 配合하고 있어 太陽·陽明型證의 傷寒病에 白芷를 使用하고 있음을 알 수 있다(Table 5-4).

頭部疾患에서는 白芷와 더불어 川芎茶調散을 基本方으로 가장 많이 使用하고 있는 것으로 보아 白芷가 鎮靜, 鎮痛, 祛風作用이 있음을 알 수 있다(Table 5-5).

皮膚疾患에서는 白芷와 더불어 外用劑로 活用하는 密陀僧, 硫黃, 官粉 등을 配伍하거나 香辛料인 丁香, 樟腦, 零陵香 등을 使用하고 있어서 白芷가 美白이나 香粧效能에 일정한 역할을 하는 것으로 생각된다(Table 5-6).

齒牙疾患에서는 白芷와 더불어 細辛, 川椒, 川芎을 共通的으로 配伍하고 있어 鎮痛을 목적으로 使用하고 있음을 알 수 있다(Table 5-7).

위에서 보는 바와 같이 白芷는 配伍되는 處方이나 藥物類에 따라서 祛風止痛, 托瘡生肌, 收斂解毒, 祛風通竅, 發散止痛 등의 다양한 效能을 발휘하고 있음을 알 수 있다. 이는 白芷가 配合된 方劑를 분석하고 構成藥物의 作用을 이해할 뿐만 아니라, 方劑構成에 대한 이론적 근거를 제시하는데 많은 기여를 할 수 있을 것으로 생각된다.

IV. 結 論

東醫寶鑑 中 白芷가 主藥으로 配伍된 94개 處方에 대한 治療領域, 病症, 病因·病理, 使用量, 方劑構成 등의 文獻的 자료조사를 통하여 다음과 같이 要約할 수 있었다.

1. 白芷가 主藥으로 구성된 方劑의 治療領域은 風

이 11.7%, 癰疽가 10.6%로 가장 많은 빈도수를 차지하였다.

2. 白芷는 諸風通治 및 中風, 癰疽, 頭痛, 諸傷 등에 가장 많이 活用되고 있으며, 그밖에도 26개 病症에 사용되었다.
3. 白芷가 主藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理는 傷寒, 傷風, 風寒, 風熱, 風冷, 天行, 瘟疫, 中風, 中氣, 卒中, 打撲損傷, 咬傷, 刀創傷 肝腎虛弱, 氣虛, 痰火, 痰熱 등으로 조사되었다.
4. 白芷의 1回 使用量은 一分~二錢까지이며, 그중 一錢을 가장 많이 使用하고 있었다.
5. 白芷는 配伍되는 處方이나 藥物類에 따라서 祛風止痛, 托瘡生肌, 收斂解毒, 祛風通竅, 發散止痛 등의 다양한 效能을 발휘하고 있음을 알 수 있다.

參考文獻

1. 辛民教, 臨床本草學, 서울, 南山堂, 1986, pp.506~507
2. 金俊錡譯, 國譯本草問答, 서울, 大星文化社, 1994, p.66, 72, 128
3. 申佶求, 申氏本草學, 서울, 壽文社, 1988, pp.271~275
4. 李時珍, 本草綱目, 서울, 一申社, 1987, pp.845~849
5. 鄭普燮, 辛民教 共著, 圖解鄉藥大事典(植物), 서울, 永林社, 1990, pp.409~410
6. 李載熙, 本草講座, 원주, 醫方出版社, 2003, pp.315~318
7. 李梴, 醫學入門, 卷下, 서울, 大星文化社, 1994, p.92, 343, 434, 450, 456, 458, 459, 470, 598, 614, 617, 618, 632, 635, 655, 700
8. 龔信, 古今醫鑑, 北京, 中國中醫藥出版社, 1997, p.46, 65, 115, 231, 237, 244, 266, 286, 419, 453
9. 龔信, 萬病回春, 北京, 人民衛生出版社, 1998, p.54.

- 90, 268, 270, 276, 285
10. 太平惠民和劑局編, 太平惠民和劑局方, 北京, 中國中醫藥出版社, 1996, p.67
 11. 朱震亨原著, 方廣編註, 丹溪心法附餘 上, 서울, 大星文化社, 1982, p.467, 495, 715
 12. 危亦林, 世醫得效方, 上海, 上海科學技術出版社, 1991, p.333, 335, 520, 615, 617
 13. 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 法人文化社, 1999, p.459, 476, 701, 696, 696, 705, 706, 682, 1115, 694, 980, 986, 985, 1002, 994, 996, 615, 522, 392, 396, 395, 397, 400, 481, 956, 964, 950, 452, 535, 1047, 1049, 1040, 398, 410, 1026, 476, 868, 433, 1162, 453, 527., 589, 549, 378, 555,
 14. 虞搏, 醫學正傳(中華醫書集成 第25冊), 北京, 中醫古籍出版社, 1999 p.321, 366, 368
 15. 樓英, 醫學綱目(中華醫書集成 第24冊), 北京, 中醫古籍出版社, 1999, p.275
 16. 劉河間, 黃帝素問宣明方論(河間醫集), 北京, 人民衛生出版社, 1998 p.222
 17. 李東垣, 醫學發明(東垣醫集), 北京, 人民衛生出版社, 1993, p.181, 193
 18. 陳自明, 外科精要(中華醫書集成 第13冊), 北京, 中醫古籍出版社, 1999, p.31
 19. 陳言, 三因極一病證方論(中華醫書集成 第22冊), 北京, 中醫古籍出版社, p.226
 20. 齊德之, 外科精義 券下(中國醫學大系 第14冊), 北京, 人民衛生出版社, 1990, pp.746~833
 21. 宋·楊士瀛, 仁齋直指(中國醫學大系12卷), 서울, 驪江出版社, 1995, pp.744-428, 744-413, 744-405, 744-418, 744-269
 22. 嚴用和 濟生方, 校定四庫全書子部五醫家類 권 11편 pp.743-500
 23. 陳自明 婦人良方大全, 集文書局, 23권 p.16