

## 小便不通에 사용되는 처방의 약물구성에 관한 연구

성현제  
서울 한라 한방병원

### ABSTRACT

## A Study on Prescription of Herbal Composition on Dysuria

Hyun-Jea Sung  
The Oriental Hospital of Seoul Halla

**Objectives :** The aim of this study is to analyze the prescription used for dysuria in herbal medication.

**Methods :** Investigating the Oriental Medicine textbooks, I found the prescription used for dysuria. So I analyzed the herbal medication for frequency or composition and classified it.

**Results :**

1. The most used prescription on dysuria is Paljung-san.
2. The order of frequency of herb for treating dysuria is Moktong, Hwalseok, Gamcho.
3. The group of Yisusamseopyak is used for main prescription about 42%.

---

**Key word :** dysuria, herb, prescription

---

- 
- 교신저자 : 성현제
  - 서울특별시 성동구 성수 2가 3동 279-42
  - Tel : 02-466-5300 H.P : 011-787-2368 e-mail : sunghjok@hanmail.net
  - 접수 : 2007/ 5/ 16 수정 : 2007/ 6/ 4 채택 : 2007/ 6/ 7

## I. 緒 論

정상적인 배뇨라 함은 광의적으로 보아 저류가 충분히 이루어지고 고통이나 노력을 요함이 없이 자유의사로 소변이 배출되어지고 한번의 배뇨 후에 방광에 잔류하는 뇨가 없는 것이다. 배뇨이상은 이러한 정상적인 배뇨에 어딘가 장애가 있어서 나타나는 결과로서 頻尿(배뇨頻數), 排尿困難, 遲尿, 排尿促迫, 裏急後重, 排尿時 灼熱感, 尿閉, 尿失禁, 遺尿症, 排尿疼痛症 등이 있다<sup>1)</sup>.

이러한 證의 치료는 여러 가지 원인과 증상에 따라 제각기 다른데 특히 小便不通에 관련된 임상 증상을 치료하는데 각기 치료자마다 처방을 달리 하여 치료하고 있는 실정인데 이에 저자는 좀더 객관성이 있는 처방을 탐구하고자 일단 초기단계로 문헌자료의 통계가 필요하다고 보아 일반적으로 임상가에서 많이 활용하고 있는 한국과 중국 문헌을 38종을 선정하여 한의학 문헌을 통해 小便不通의 치료에 응용되는 처방을 찾아 각기 그 처방 내용의 약물을 분석 연구한 결과를 보고함과 아울러 본 연구를 바탕으로 좀더 나아가 대표적인 처방과 각개별 약물의 약리적 작용과 기전의 심도 있는 연구와 실험적 연구를 하는 기본자료를 삼고자 보고하는 바이다.

## II. 文獻資料 및 調査內容

### 1. 文獻資料

- 1) 扁鵲心書<sup>2)</sup>
- 2) 外臺秘要<sup>3)</sup>
- 3) 太平聖惠方<sup>4)</sup>
- 4) 仁齋直指方<sup>5)</sup>
- 5) 衛生寶鑑<sup>6)</sup>
- 6) 太平惠民和劑局方<sup>7)</sup>
- 7) 三朝名醫方論<sup>8)</sup>
- 8) 普濟方<sup>9)</sup>

- 9) 東垣十書(蘭室秘錄)<sup>10)</sup>
- 10) 丹溪心法<sup>11)</sup>
- 11) 醫學綱目<sup>12)</sup>
- 12) 醫學正傳<sup>13)</sup>
- 13) 醫學入門<sup>14)</sup>
- 14) 萬病回春<sup>15)</sup>
- 15) 六科準繩(雜病科)<sup>16)</sup>
- 16) 東醫寶鑑<sup>17)</sup>
- 17) 醫宗金鑑<sup>18)</sup>
- 18) 辨證奇聞<sup>19)</sup>
- 19) 丁茶山 小兒科秘方<sup>20)</sup>
- 20) 濟衆新編<sup>21)</sup>
- 21) 醫宗損益<sup>22)</sup>
- 22) 明醫指掌<sup>23)</sup>
- 23) 醫學心悟<sup>24)</sup>
- 24) 幼幼集成<sup>25)</sup>
- 25) 青囊譯<sup>26)</sup>
- 26) 百病辨症錄<sup>27)</sup>
- 27) 醫宗必讀<sup>28)</sup>
- 28) 類證治裁<sup>29)</sup>
- 29) 醫方新鑑<sup>30)</sup>
- 30) 東醫方劑學<sup>31)</sup>
- 31) 韓方婦人科學<sup>32)</sup>
- 32) 診療要鑑<sup>33)</sup>
- 33) 腎系內科學<sup>1)</sup>
- 34) 楠樞醫學<sup>34)</sup>
- 35) 中醫實用臨床手冊<sup>35)</sup>
- 36) 中醫內科學<sup>36)</sup>
- 37) 惠庵醫方<sup>37)</sup>
- 38) 韓方臨床 40年<sup>38)</sup>

### 2. 調査內容

각 문헌에 수록된 小便不通 처방을 조사하여, 그 처방에 따른 사용 빈도수를 계수하였고, 각 처방에 따라 사용된 本草와 君藥의 빈도수를 계수하였다. 本草와 君藥은 각각 그 종류별로 그 비율을 측정하였다.

### Ⅲ. 本 論

각 文獻에 제시된 小便不通 치료에 사용된 처방은 다음과 같다. (Table 1)

Table 1. Prescription on Dysuria through Oriental Medicine Textbook

| 文 獻                       | 處 方   |
|---------------------------|---|
| 扁鵲心書 <sup>2)</sup>        | 金液丹   |
| 外臺秘要 <sup>3)</sup>        | 鷄蘇飲子  |
| 太平聖惠方 <sup>4)</sup>       | 透水散 海蛤散 大黃圓 海合圓 鷄蘇散   |
| 仁齊直指方 <sup>5)</sup>       | ● 牽牛子 澤瀉<br>● 木通 滑石<br>● 葶藶子 華皮<br>● 赤茯苓 麥門冬 灯心 車前子         |
| 衛生寶鑑 <sup>6)</sup>        | 八正散 石葦散 白花散 黃芩清肺湯 紅花散<br>立效散 海金沙散                           |
| 太平惠民和劑局方 <sup>7)</sup>    | 八正散 五苓散 導赤散 牛膝湯   |
| 三朝名醫方論 <sup>8)</sup>      | 導赤散 葵子散   |
| 普濟方 <sup>9)</sup>         | 赤茯苓散 貝菌散 犀角散 柴胡散  |
| 東垣十書(蘭室秘錄) <sup>10)</sup> | 通關丸 清肺飲子 導氣除燥湯  |
| 丹溪心法 <sup>11)</sup>       | 四物湯 海金沙散 芎歸湯 鬱金黃蓮丸 二陳湯 宣氣散<br>硝糖湯 木通散 蒲黃湯 草蜜湯 葵子散 琥珀散 葵子湯   |
| 醫學綱目 <sup>12)</sup>       | 清肺散 白花散 導氣除燥湯 髮灰散 桃仁煎                                       |
| 醫學正傳 <sup>13)</sup>       | 四物湯 清肺飲子 通關丸 導氣除燥湯 八正散 葵子散<br>茯苓湯 鐵服丸 倒換散                   |
| 醫學入門 <sup>14)</sup>       | 鹿角相丸 生附散 沈香散  |
| 萬病回春 <sup>15)</sup>       | 豬苓湯 參歸升麻湯 通關丸 二陳湯 清肺飲子<br>滋陰降火湯 加味五苓散 導赤湯                   |
| 六科準繩(雜病科) <sup>16)</sup>  | 清肺飲 桃仁煎 紅林散 抵當丸 滋腎丸 白花散<br>黃蓮丸 木通湯 通氣除燥湯 八味丸 琥珀散 八正散<br>利氣散 |
| 東醫寶鑑 <sup>17)</sup>       | 八正散 宣氣散 清肺散 通關丸 滋腎丸 豬苓湯<br>導氣除燥湯 加味五苓散 導赤元 透泉散 地膚子湯         |
| 醫宗金鑑 <sup>18)</sup>       | 通關丸 加味八正散 八正散 補中益氣湯合五苓散<br>小薊飲子 清心蓮子飲                       |
| 辨證奇聞 <sup>19)</sup>       | 涼心利水湯 純陰化陽湯 導水散 生肺散 八味地黃湯<br>補中益氣湯                          |
| 丁茶山 小兒科秘方 <sup>20)</sup>  | 加味導赤散 木通散   |
| 濟衆新編 <sup>21)</sup>       | 八正散 滋腎丸 清肺散   |
| 醫宗損益 <sup>22)</sup>       | 八正散 小分清飲 清肺散 大分清飲 滋腎丸 化陰煎                                   |
| 明醫指掌 <sup>23)</sup>       | 四君子湯 蒲黃湯 四物湯 八正散 二陳湯 導赤散                                    |
| 醫學心悟 <sup>24)</sup>       | 四苓散 茯苓升麻湯 滋腎丸 補中益氣湯 金匱腎氣丸                                   |
| 幼幼集成 <sup>25)</sup>       | 五苓散 人蔘散   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 青囊譯 <sup>26)</sup>      | 萬全木通湯 滋腎丸 八正散 禹功散 清肺散<br>加味五苓散 生地黃湯 滑石散 六味地黃丸 葵梔散<br>麥朮飲 麥朮歸芍湯         |
| 百病辨症錄 <sup>27)</sup>    | 涼心利水湯 純陰化陽湯 導水散 生脈散 八味地黃湯  |
| 醫宗必讀 <sup>28)</sup>     | 八正散 金匱腎氣丸 五苓散 琥珀散 通心散 利氣散<br>牛膝湯 清肺飲                                   |
| 類證治裁 <sup>29)</sup>     | 生脈散 滋腎丸 補中益氣湯 腎氣湯 導赤散 牛膝湯<br>五苓散 導痰湯 四苓散 七正散 化陰煎 獨蔘湯<br>十劑六味湯          |
| 醫方新鑑 <sup>30)</sup>     | 八正散 豬苓散 清肺散 加味五苓散 滋腎丸 透天散<br>導氣除燥湯 麥朮飲 導赤丸                             |
| 東醫方劑學 <sup>31)</sup>    | 八正散 補中益氣湯 禹功散 滋腎丸 大分清飲 八物湯   |
| 韓方婦人科學 <sup>32)</sup>   | 四物湯加味 五苓散 通淋湯  |
| 診療要鑑 <sup>33)</sup>     | 清肺散 八正散 滋腎丸 大分清飲 桃仁承氣湯<br>導氣除濕湯 小分清飲 五苓散 地膚子湯 加味五苓散<br>豬苓湯 二石散 透天散 麥朮散 |
| 腎系內科學 <sup>1)</sup>     | 八正散 加味五苓散 清肺散 利氣散 滋腎丸 導赤元<br>桃仁承氣湯 通關丸 地膚子湯 豬苓湯 導氣除濕湯<br>透天散 大分清飲      |
| 楠挺醫學 <sup>34)</sup>     | 導氣除濕湯 去邪如歸湯  |
| 中醫實用臨床手冊 <sup>35)</sup> | 八正散 補中益氣湯 金匱腎氣丸  |
| 中醫內科學 <sup>36)</sup>    | 通關丸 沈香散 濟生腎氣丸 代抵當丸   |
| 惠庵醫方 <sup>37)</sup>     | 八正散 麥朮飲 清肺散 通關散 導氣除燥湯  |
| 韓方臨床 40年 <sup>38)</sup> | 八正散 純陰化陽湯 心精湯 加味禹功散  |

### Ⅲ. 總括 및 考察

가장 많이 사용되었으며, 그 뒤로는 五苓散이 13회, 清肺散이 12회, 滋腎丸, 導氣除燥湯이 각각 10회 사용되었다.

#### 1. 처방의 빈도수 (Table 2).

이번 조사에 포함된 처방 중 八正散이 21회로

Table 2. Frequency of Prescription on Dysuria

| Frequency | Prescription |
|-----------|--------------|
| 21        | 八正散          |
| 13        | 五苓散          |
| 12        | 清肺散          |
| 10        | 滋腎丸 導氣除燥湯    |
| 9         | 導赤散          |
| 8         | 通關丸          |
| 6         | 補中益氣湯 四物湯    |
| 5         | 腎氣丸 豬苓湯      |

|   |   |
|---|---|
| 4 | 蓼朮飲 大分清飲 地膚子湯<br>葵子湯 透天散  |
| 3 | 木通散 禹功散 琥珀散<br>二陳湯 牛膝湯 承氣湯<br>純陰化陽湯 生脈散   |
| 2 | 白花散 六味地黃湯<br>小分清飲 導水散<br>桃仁承氣湯 大抵當丸<br>桃仁煎 清心蓮子飲<br>八物湯 蒲黃湯 八味地黃湯<br>海金沙散 滑石散 化陰煎<br>紅花散 海蛤散  |
| 1 | 髮灰散 茯苓湯 茯苓升麻湯<br>萬金木通散 涼水利水散 鬱金黃蓮丸<br>人參散 利氣散 涼水利水湯 五淋散<br>二石散 石葦散 生附散 犀角散<br>柴胡散 生地黃湯 蓼朮歸芍湯<br>四君子湯 小薊飲子 立效散 導痰湯<br>大黃圓 當歸天麻湯 獨蓼湯<br>滋陰降火湯 赤茯苓散 硝糖湯<br>鹿角相丸 七正散 栝藹瞿麥丸<br>去邪如歸湯 葵梔散 金液丹<br>廣濟薊小飲子 貝菌散 黃金清肺飲<br>黃蓮丸 通氣除燥湯 透水散 通心散<br>通淋散 倒換散 |

2. 처방에 포함된 本草의 종류와 빈도수 (Table 3).

이번 조사에서 포함된 처방에 사용된 本草는

木 통과 滑石이 각각 86회로 가장 많이 처방되었고, 그 뒤로 甘草가 80회, 茯苓 75회, 澤瀉 73회 순으로 처방되었다.

Table 3. Frequency of Herb on Dysuria

| Frequency | Herb  |
|-----------|-------|
| 86        | 木通 滑石 |
| 80        | 甘草    |
| 75        | 茯苓    |
| 73        | 澤瀉    |
| 68        | 車前子   |
| 53        | 豬苓 燈心 |
| 43        | 篇蓄 黃柏 |
| 40        | 梔子    |
| 38        | 知母    |

|    |   |
|----|---|
| 37 | 肉桂 當歸   |
| 33 | 大黃  |
| 31 | 白朮  |
| 25 | 熟地黃 桂枝 人蔘   |
| 24 | 芍藥 通草   |
| 20 | 琥珀 黃芩   |
| 19 | 枳殼 麥門冬  |
| 18 | 陳皮 牛膝   |
| 15 | 升麻  |
| 14 | 生地黃   |
| 12 | 山茶萸 半夏  |
| 10 | 川芎 黃芪   |
| 8  | 生薑 桃仁   |
| 7  | 芒硝  |
| 6  | 牽牛子 覆盆子 柴胡 葶藶子 王不留行 蒲黃 石葦   |
| 5  | 牡丹皮 枳實 杏仁   |
| 4  | 鷄蘇 荊芥 地膚子 五味子 海藻  |
| 3  | 桂枝 橘皮 朴硝 桑白皮 地骨皮 竹葉 蓮翹 龍膽草 沈香 黃蓮 玄蔘   |
| 2  | 木香 菲子 茯神 蔥白 海金沙 檳榔 白礬 蓮子肉 白鮮皮 石葦 薏苡仁 香附子 厚朴   |
| 1  | 瓜藨仁 柏子仁 薄荷 樗根白皮 麻黃 穿山甲 蛤粉 貝母 鹿角 桑螵蛸 南星 華皮 柳枝 小麥 大麻 鬱金 桃枝 冬瓜 蘇葉 犀角 天花粉 前胡 別山甲 秦艽 免絲子 |

### 3. 각 本草의 종류별 분류 및 비율 (Table 4, Fig. 1).

이번 조사에서 포함된 본초를 종류별로 나누고, 각 개수, 사용 회수 총합 및 그 비율을 나타내 보면, 利水滲濕藥이 19종이 총 600회 사용되었으며 약 42%를 차지하였다. 그 뒤로 補益藥이 21종이 총 415회 사용되었으며 약 30%를 차지하였다. 清熱藥은 16종이 총 124회 사용되었고 약 9%를 차지하였다.

Table 4. Number of Herb and Total Frequency and Rate

| Group   | Number(Herb /Total Frequency) | Rate (%) |
|---------|-------------------------------|----------|
| 利水滲濕藥   | 19/600                        | 42       |
| 補益藥     | 21/415                        | 30       |
| 清熱藥     | 16/124                        | 9        |
| 化痰止咳平喘藥 | 8/66                          | 5        |
| 瀉下藥     | 6/57                          | 4        |
| 解表藥     | 10/42                         | 3        |
| 活血祛瘀藥   | 4/28                          | 2        |
| 安神藥     | 1/20                          | 1.5      |
| 利氣藥     | 3/8                           | 0.6      |
| 止血藥     | 1/6                           | 0.4      |
| 收澀藥     | 4/5                           | 0.4      |
| 芳香化濕藥   | 1/2                           | 0.1      |
| 驅蟲藥     | 1/2                           | 0.1      |




Fig. 1. Rate of Herb

4. 각 처방의 君藥의 종류와 빈도수 (Table 5)

이번 조사에 포함된 처방 중 君藥으로 사용된 本草는 豬苓이 28회로 가장 많았으며, 黃柏이 21회, 茯苓이 20회, 地黃과 大黃이 17회 사용되었다.

Table 5. Frequency of Herb Used for Main Prescription

| Frequency | Herb   |
|-----------|--|
| 28        | 豬苓   |
| 21        | 黃柏   |
| 20        | 茯苓 (白茯苓7, 赤茯苓 13)                                  |
| 17        | 地黃 (生地黃3, 熟地黃 14) 大黃                               |
| 15        | 木通   |
| 13        | 滑石 人蔘  |
| 10        | 當歸 瞿麥  |
| 6         | 篇蓄   |
| 5         | 黃芪 知母 半夏 澤瀉  |
| 4         | 地膚子 陳皮 車前子 桃仁                                      |
| 3         | 葵子 麥門冬 朴硝 牛膝<br>王不留行 燈心 甘草 鷄蘇                      |
| 2         | 蓮子肉 寒水石 海金沙 琥珀<br>黃蓮 海蛤 通草 沈香                      |
| 1         | 鬱金 犀角 柴胡 白朮 白礬 菲子<br>川芎 芍藥 黃芩 玄蔘 蓮翹 菲子<br>枳實 梔子 鹿角 |

5. 君藥의 종류별 분류 및 비율 (Table 6, Fig. 2)

각 君藥을 종류별로 분류해보면, 利水滲濕藥은 16종이 122회 사용되었으며, 47%를 차지하였고, 補益藥은 13종이 59회 사용되었으며, 23%를 차지하였다. 清熱藥은 8종이 35회 사용되었으며, 13%를 차지하였다.

Table. 6. Number of Herb Used for Main Prescription and Total Frequency and Rate

| Group   | Number(Herb /Total Frequency) | Rate(%) |
|---------|-------------------------------|---------|
| 利水滲濕藥   | 16/122                        | 47      |
| 補益藥     | 13/59                         | 23      |
| 清熱藥     | 8/35                          | 13      |
| 瀉下藥     | 3/21                          | 8       |
| 化痰止咳平喘藥 | 3/11                          | 4       |
| 活血祛瘀藥   | 3/7                           | 3       |
| 利氣藥     | 2/3                           | 1       |
| 解表藥     | 1/1                           | 0.4     |
| 收澀藥     | 1/1                           | 0.4     |




Fig. 2. Rate of Herb Used for Main Prescription

## IV. 結 論

각 文獻을 통하여 小便不通 치료에 사용되는 처방을 전반적으로 분석 검토한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 小便不通 치료 처방으로 제시되어 있는 처방 중 가장 많이 제시되어 있는 순서는 八正散, 五苓散, 淸肺散, 滋腎丸, 導氣除燥湯 등의 순서로 볼 수 있었다.
2. 小便不通 치료 처방으로 제시되어 있는 처방 중 사용된 약물의 빈도는 많이 나타나는 순서로 보면 木通, 滑石, 甘草, 茯苓, 澤瀉, 車前子, 豬苓, 燈心 등의 순이었다. 그 분석 결과 전체 총 약물이 나타나는 것의 42% 정도가 利水滲濕藥으로 처방구성이 되어 있으며, 補益藥이 30% 정도 그리고 淸熱藥이 9% 정도였으며, 化痰止咳平喘藥, 瀉下藥이 각 5%, 4% 정도였고, 解表藥이 3%, 活血祛瘀藥이 2%, 安神藥이 1.5% 사용되었으며, 기타 利氣藥, 止血藥, 收澀藥, 芳香化濕藥, 驅蟲藥 등의 약물이 소량 사용되었다<sup>39)</sup>.
3. 각기의 처방에서 君藥을 분석해본 결과 利水滲濕藥이 47%, 補益藥이 23%, 淸熱藥이 13%, 瀉下藥이 8% 정도 사용되었으며, 化痰止咳平喘藥, 活血祛瘀藥, 利氣藥, 解表藥, 收澀藥 등은 4% 이하 사용된 것으로 나타났다<sup>39)</sup>.
4. 상기 1,2,3의 결과는 살펴보면 實熱로 오는 小便不通을 치료하기 위하여 사용하는 涼寒藥性으로 이루어지는 利水滲濕藥이 42%와 淸熱藥 9%가 51% 정도로 반수 이상을 차지하고 있으며, 虛症으로 오는 小便不通을 치료하기 위하여 사용하는 溫熱藥性으로 이루어진 補益藥은 30%를 차지한 것으로 보아 치료 대요에 부합됨을 알 수 있었다<sup>39)</sup>.

상기 결론의 1,2,3,4항의 결론을 기본자료로 하여 小便不通 환자들에게 임상에서 사용할 처방으로 八正散, 五苓散, 淸肺散, 滋腎丸, 導氣除燥湯 등 다빈도로 제시된 처방의 응용과 통계적으로 대표되는 약물 木通, 滑石, 甘草, 茯苓, 澤瀉, 車前子 등의 약물에 대한 약리적 실험 등 다양한 연구방법의 기초자료 활용으로 인하여 좀더 발전된 한방 신약을 개발할 수 있다고 본다.

## 參考文獻

1. 朴憲在, 杜鎬京. 東醫腎系內科學. 서울:成輔社. 1979: 95-9
2. 扁鵲. 扁鵲心書. 서울:杏林書院. 1972:57
3. 王燾. 外臺秘要. 서울:成輔社. 1975:711
4. 太宗命 撰. 太平聖惠方. 卷三. 서울:翰成社. 1979:1801-3
5. 楊士瀛. 仁齊直指方. 서울:東醫社. 1978:52
6. 羅夫益. 衛生寶鑑. 卷十七. 商務印書館:281-7
7. 陳師文 等. 太平惠民和劑局方. 卷六. 中華民國.
8. 柯韻伯. 三朝名醫方論: 40.165
9. 周定王, 朱櫛撰. 普濟方. 서울:翰成社: 1370,1568
10. 李東垣. 東垣十書. 卷七. 서울:慶熙大學醫科大學. 1973:3
11. 朱丹溪. 丹溪心法. 卷十一. 中華民國:紹墨潤堂
12. 樓英. 醫學綱目. 卷十四. 台南:北一出版社. 1973:40-6
13. 虞天民. 醫學正傳. 서울:醫藥社. 1973:527-9
14. 李梴. 醫學入門. 서울:成輔社. 1972:506-7
15. 龔廷賢. 萬病回春. 서울:杏林書院. 1972:246-8
16. 王肯堂. 六科準繩(雜病科). 서울:東明社. 1975:512-4
17. 許浚. 東醫寶鑑. 서울:남산당. 1976:170-9
18. 華陀 撰. 醫宗金鑑. 上海:大中國圖書公司:144-6
19. 淸錢松. 辨證奇聞. 서울:杏林書院:217-9
20. 丁茶山. 丁茶山小兒科秘方. 서울:杏林書院. 1976: 8,70



21. 康命吉. 濟衆新編. 서울:杏林書院. 1978:95-9
22. 黃道淵. 醫宗損益. 서울:醫藥社. 1976:144-5
23. 朱尙龍. 編輯明醫指掌. 卷八. 서울:癸丑文化社. 1974:21
24. 程鍾齡. 醫學心悟. 台北中華民國:旋風出版社. 1979:196
25. 陳負正輯訂. 幼幼集成. 上海:上海科學技術出版社. 1978:179-80
26. 韓奎相. 青囊譯. 上卷. 漢城圖書株式會社. 1974:44-5
27. 徐雲胎. 百病辨症錄. 中華民國:千頃堂書局. 1974:371-4
28. 李中梓. 醫宗必讀. 서울:書堂. 1976:319-22
29. 林珮琴. 類證治裁. 台北中華民國:旋風出版社: 475-89
30. 韓秉璉. 醫方新鑑. 서울:杏林書院:63-4
31. 尹吉榮. 東醫方劑學. 서울:高文社. 1971:37,162
32. 宋炳基. 韓方婦人科學. 서울:杏林書院. 1978:464
33. 金定濟. 診療要鑑. 서울:東洋醫學研究院. 1978:上265, 下220-1
34. 朴鎬豐. 楠挺醫學. 楠挺醫學大全. 서울:相一文化社. 1974:394-5
35. 天津中醫學院 編. 中醫實用臨床手冊. 商務印書館. 1975:127
36. 上海中醫學院 編. 中醫內科學. 商務印書館. 1977:117-20
37. 吳得泳. 惠庵醫方. 서울:醫學士. 1978:281-4
38. 朴炳昆. 韓方臨床 40年. 서울:杏林書院. 1975:251
39. 李尙仁. 本草學. 서울:醫藥社. 1975