

“

”

()

4 「 」

1 (400~600m)
가

1 , 3
5 7 10

가 가

(桃太郎)

	(g)			
- 8	210~220			V, F1, F2, N, LS, Tm-2a
T-93	210			V, F1, N, LS, Tm-2a
	220~230		"	V, F1, F2, FR, N, LS, CL, Tm-2a
	240	"	"	V, F1, F2, FR, N, LS, CL, Tm-2a
	220~240	"	"	V, F1, N
	220~230	"	"	V, F1, F2, FR, N, LS, CL, Tm-2a
	230		"	V, F1, F2, N, LS, Tm-2a
	230		"	V, F1, F2, N, LS, CL, Tm-2a
	230	"		V, F1, F2, N, LS, Tm-2a

< 1-2>

- 8, T-93,

(輪作)

50% 가
가

가 가
가 가
가 1
가

가

(300~600m)

6Bx

50~60

가

가 30~40%

가

가



201, 1.3 mg/100g
 93.8%

가 16

1614

『 』 ‘ ’
 17 .²⁾

2

가 1986 3

1995

:
 : *Lycopersicon esculentum*
 : Tomato
 : 가(蕃茄)

1991 가 ()³⁾

1,400

10~20%

3,000m

2,000 ~

()

가

가

가

가

‘ ’ 2003

2006 4

700

가

5,000

2006

35,000

5,000

가

60

『

』 가

.¹⁾

2005 10

1) : . (), , / 049 , , / 119,

2) (南蠻柿) : “ (草柿) . 가 , .

3)

『2006 . 展』
15

2006 7 29

350
, 30.7%가



200

2005

가
가 10kg, 16,730
가 12,416

2006 7 10

	16,158 ⁴⁾	14,863 ⁵⁾	15,020

< 2-1> 2005 10kg 가
(: , 7~9)

(11-14-1-6⁶⁾
(11-14-2-24)
(11-14-3-51)
(11-14-4-16)

()
2005 2005
, 2006 8 20
24,670

, 2006. 08. 30

2005

2006. 08. 01
GTB [], 2006. 07. 28

4) : 가 , (/)
5)
6) <http://www.enviagro.go.kr/main.jsp>

가

가 98%

7

가

가

99%

.⁹⁾

ph 5.5~6.0

Kg 10~30g

200 ~300mg/ Kg

600mg/ Kg

가

5~10

22

(21.2)

(21.8)

가

3.0cmol/Kg

23~25

가

1.0cmol/kg

6~9

1 가

2

가

2,000~3,000m

가

50,000x

가

5~9

1,046mm

가

가

가 23~28 30 . 가 1995 . 가 1991 . 가 7 103 가 . 가 2 1

2005 가 6.3ph, 34.8g/kg, 969mg/kg, 2.1cmol/kg, 7.2cmol/kg, 4.3cmol/kg, 3.2 dS/m .¹⁰⁾

	6.0~6.5	20~30	400~500	0.7~0.8	5.0~6.0	1.5~2.0	2.0
	6.3	34.8	969	2.1	7.2	4.3	3.2

< 3-1>

2006 22 560 , 1 70 .

(EC)

3

10) 「 , 2005

3

5.38%,

0.91%

1


3

37°59 ~ 38°14

127°27 ~ 127°50

, 38

900m



2

18.38

12

가

560mm,

865

가

2004 - 208

2

가

(www.ripc.org)

• 2007. 10

909.05km²