

한우 공란우 이식가능 수정란수와 혈액내 요소태질소, 포도당 및 총콜레스테롤 수준과의 관계

손준규^{1,†} · 최창용¹ · 조상래² · 임현주¹ · 박성재¹ · 백광수¹ · 김상범¹ · 권웅기¹ · 정연섭¹ · 복난희³ · 손동수⁴

¹농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과, ²농촌진흥청 국립축산과학원 난지축산시험장,
³농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원시험장, ⁴농촌진흥청 국립축산과학원 기술지원과

Relationship between Transferable Embryos and Blood Urea Nitrogen, Glucose and Total Cholesterol Concentration in Hanwoo Donors

Jun-Kyu Son^{1,†}, Chang-Yong Choe¹, Sang-Rae Cho², Hyun-Joo Lim¹, Seong-Jai Park¹, Kwang-Soo Baek¹, Sang-Bum Kim¹, Eung-Gi Kwon¹, Yeon-Sub Jung¹, Nan-Hee Bok³ and Dong-Soo Son⁴

¹Dairy Science Division, National Institute of Animal Science, RDA, CheonAn 331-801, Korea.

²Subtropical Animal Experiment Station, National Institute of Animal Science, RDA, JeJu 690-150, Korea.

³Animal Genetic Resources Station, National Institute of Animal Science, RDA, NamWon 590-832, Korea.

⁴Technology Services Division, National Institute of Animal Science, RDA, SuWon 441-706, Korea.

ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the relationship between concentration of urea nitrogen, glucose, cholesterol and number of transferable embryos for the purpose of improving reproductive performance in blood of Hanwoo donors. Fifty five, at random stages of the estrous cycle, received a CIDR. Four days later, the animals were superovulated with a total of 28AU FSH (Antorin, 2AU=1 ml) administered twice daily in constant doses over 4 days. On the 3th administration of FSH, CIDR was withdrawn and 25 mg PGF₂α was administered. Cows were artificially inseminated twice after estrous detection at 12 hr intervals. The cows received 100 μg GnRH at the time of 1nd insemination. Embryos were recovered 7 or 8 days after the 1st insemination. Cows with BUN <10, 11~18 and ≥19 mg/dl had number of transferable embryos of 4.3±1.3, 5.8±1.8 and 4.7±2.1 respectively. The mean numbers of total ova from < 10 and 10≤ of corpora lutea(CL) was 8.9 and 14.3, respectively. The number of transferable embryos differed between < 10 and 10≤ CL was 4.8 and 5.6, respectively.

(Key words : Hanwoo donors, Transferable embryo, BUN, Glucose, Cholesterol)

서 론

기후변화와 동반하여 국내 한우 사육에 있어 생리적, 환경적 변화로 무발정과 미약발정 현상이 찾아지고 있으며, 번식효율은 매년 저하되고 있는 실정이다(Roche 등, 2000; Lucy, 2001). 또한, 발정발현이 줄어들고 있으며, 배란지연 수태율 저하 등 번식에 있어서 여러 가지 문제점들이 대두되고 있다(Pankowski 등, 1995; Austin 등, 1999). 능력 개량과 번식 효율의 증대는 생산성 향상과 경쟁력 있는 사육 기반 조성을 위하여 해결해야 할 중요한 과제이다. 한우의 경우 최근 이용되고 있는 소의 수정란 이식 기술은 우리나라 축산 여건상 우수종축의 기반 구축과 증식의 소요 기간을 단기화 할 수 있는 동시에 우수한 종축의 유전 능력을 신속히 확대 보급할 수 있기 때문에 이

러한 목표에 접근하는데 매우 적절한 방법으로 인식되고 있다. 수정란 이식은 우수 유전형질을 보유하고 있는 암 가축으로부터 다수의 수정란을 회수하여 다른 개체에 이식 후 자축을 생산함으로써 우수한 유전 형질을 가진 개체를 효과적으로 증식시킬 수 있고, 형질이 동일한 다수의 자축을 단시간 내에 생산이 가능하므로 가축의 능력 개량에 매우 유용하게 이용할 수 있다(Smith, 1984; Christensen, 1991). 소의 수정란 이식에 있어 우수한 소의 생산을 통한 가축의 개량에 활용하고자 과배란 및 수정란이식(multiple ovulation and embryo transfer: MOTE) 기법이 이용되고 있다(Seidel, 1981; Smith, 1988; 손 등, 2000). 1980년대 초 국내에 수정란이식 기술이 도입된 이래 수정란 이식기술의 효율이 크게 향상되었으나, 산업적으로 이용함에 있어서는 아직 해결해야 할 문제점이 많이 남아 있다. 과배란 및 수정란 이식 기법의 성공적인

[†] Corresponding author : Phone: +82-41-580-3391, E-mail: junkyuson@korea.kr

수행을 위해서는 우수한 공란우를 선정하여 과배란 처리에 의해 양질의 수정란을 많이 회수하는 것이 무엇보다 중요하다. 수정란이식 기술의 중요한 요인은 우선 유전적으로 능력이 우수한 공란우로부터 이식 가능한 정상 수정란을 많이 생산하는 것인데, 과배란 처리에 대한 난소 반응은 개체에 따라 투여 호르몬에 대한 차이가 크며, 수정란 생산에 영향을 미치는 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용하기 때문에 정상 수정란 생산의 안정적인 체계는 거의 개선되지 못하고 있는 실정이다(Armstrong, 1993).

과배란 처리 및 이식가능 수정란에 영향을 미치는 요인은 공란우 개체에 따른 난소반응의 차이(Shea 등, 1984), 성선자극 호르몬의 종류(Elsden 등, 1978; Gouding 등, 1991; Staigmiller 등, 1992), 호르몬 투여량(Donaldson, 1984; Pawlyshyn 등, 1986), 과배란 처리 방법(Takedomi 등, 1992; Yamamoto 등, 1994; 임 등, 1998), 공란우의 연령(Hasler 등, 1981; Donaldson, 1984), 번식경력(Iso-gai 등, 1993), 반복 과배란 처리(Donoidson과 Perry, 1983; Warfeld 등, 1986; Almeida, 1987), 계절(Shea 등, 1984; Bastidas와 Randel, 1987) 등이 관계된다고 하였다. 국내에서도 소에서 과배란 처리 및 이식가능 수정란 수에 대한 연구(양, 1994; 손 등, 1997; 김 등, 1997; 임 등, 1998; 손 등, 2006; 손 등, 2010)가 많이 보고되고 있다.

Glucose는 에너지 섭취 상황을 반영하고 에너지 부족 시 낮은 값을 나타내며, 농후사료 과다 및 스트레스 시에 높은 값을 나타내기도 한다. 현저히 낮은 값을 나타내는 것은 심한 에너지 부족을 의미하고 케토시스나 번식장애 등의 질병에 영향을 주며(Ferguson 등, 1993), 콜레스테롤은 종합적인 영양 상태와 간 기능을 나타내며 간 기능이 저하되거나 영양소의 섭취 부족시 낮아지고 지방질 섭취량 과다 시 높아진다. 또한, 혈장내 요소태질소(BUN)는 간장에서 암모니아의 비독화 과정에서 생성되는 산물로서, 혈장내의 요소태질소의 수준은 섭취한 단백질의 양과 분해성, 단백질과 에너지의 균형성을 반영해 주며(Ferguson 등, 1993), 번식 상황과 소의 사양관리 등에 의해 다소간 차이는 있다(Carroll 등, 1988). 번식효율을 높이기 위해서는 발정발견율 향상, 효율적인 분만 후 첫 수정일수의 유지와 높은 수태율이 전제되어야 한다(Pelssier, 1976). 하지만 사양관리 조건에 따른 소의 번식과 BUN, glucose 및 total cholesterol 수준과의 관계 구명에 관한 연구는 미흡한 상황이다. 이식 가능 수정란을 안정적으로 다수 생산하는 것은 수정란 이식 기술의 실용화를 위한 가장 기초적이며, 매우 중요한 과제라 할 수 있다. 따라서 본 연구는 국립축산과학원에서 실시한 성적자료를 분석하여 한우의 효율적인 수정란 생산 체계를 정립하고자 영양 관리에 따른 BUN, glucose 및 total cholesterol 수준과 이식가능 수정란 수와의 관계를 구명하기 위해 수행하였다.

재료 및 방법

공시우

본 연구의 자료는 국립축산과학원 가축유전자원시험장에서 보유하고 있는 형질이 우수한 엘리트 암소로 선발

된 한우 경산우 55두를 공시하였다.

공란우 과배란 처리 및 인공수정

시험군은 공란우의 발정 주기와 관계없이 progesterone releasing intravaginal device (CIDR-plus, InterAg, New Zealand)를 질내 삽입하고, 4일째부터 FSH(Antorin, 2AU=1 ml, Kawasaki Mitaka, Japan)를 4일에 걸쳐 28AU 근육주사하였으며, CIDR 삽입 후 7일째 PGF₂α(Lutalyse™, Phamacia Co., Belgium)를 오전 25 mg, 오후 15 mg을 12시간 간격으로 근육 주사하였으며, CIDR를 제거하였다. 인공수정은 PGF₂α 주사 후 48시간 전후 발정을 확인하고, 12시간 간격으로 정액 2스트로우씩 2회 실시하였으며, 1차 인공수정 후 100 μg Gonadotropin (GnRH, Fertagyl®, Intervet, Holland)를 근육주사 하였다.

수정란 회수, 평가 및 초음파 검사

인공 수정 후 7일째에 수정란을 회수하였으며, 회수를 위한 관류액은 Embryo Collection Medium(Agtech, Biolife™, USA)를 이용하여 비외과적인 방법으로 회수하였다. 회수된 수정란은 Manual of the International Embryo Transfer Society(Stringfellow와 Seidel, 1998)의 기준에 따라 code 1(excellent or good)과 code 2(fair)로 평가된 수정란은 이식가능 수정란, code 3(poor)과 code 4(dead or degenerating)로 평가된 수정란은 이식 불가능 수정란으로 구분하였으며, 과배란 처리한 공란우의 황체수를 파악하기 위한 난소 초음파(Sonoace 600 with a 5.0 MHz linear array transducer; Medison Co., Led., Seoul, Korea)검사를 실시하였다.

채혈 및 생화학분석

생화학 분석을 위해 한우 공란우 55두를 공시하여 CIDR 삽입 한 달 전부터 일주일에 2회, 수정 시일까지 채혈하여 분석하였다. 채혈 방법은 오전 10~11시 사이 heparin 처리된 15 ml vacutainer를 사용하여 경정맥에서 약 10 ml를 채혈하여 곧바로 실험실로 운반하였고, 3시간 이내에 3,000 rpm에서 15분간 원심분리 후 혈청을 분리하여 분석시까지 냉동보존(-20°C)하였다. BUN, glucose 및 total cholesterol 수준의 분석은 자동 생화학 분석기 [7180, Kawasaki Mitaka(주), Japan]를 이용하여 분석하였다.

통계 분석

한우 공란우 과배란 처리 후 이식가능 수정란 수와 BUN, glucose 및 total cholesterol 수준의 유의성 분석은 SAS program의 Chi-square를 이용하였고, $p<0.05$ 이하의 경우 유의한 것으로 판단하였다.

결과 및 고찰

한우 공란우 55두 중 황체수가 10 이하와 10 이상인 공란우의 과배란 처리하여 수정란을 회수한 결과는 Table 1과 같다. 10 이하와 10 이상인 공란우의 총 회수된 난자 수는 각각 8.9개와 14.3개였으며, 이식가능 수정란수는

Table 1. Effect of number of corpora lutea (CL) on embryo production

No. CL	Cows (n)	Embryo yield	
		No. total ova	No. transferable embryos
< 10	26	8.9±1.7	4.8±1.3
≥ 10	29	14.3±2.3	5.6±2.5

체수가 10 이하인 경우 4.8개, 10 이상인 경우 5.6개로 나타났다. Greve 등(1983)은 다배란 처리시 황체수가 9개, 총 회수란수가 7개, 이식가능 수정란수가 4개 정도라고 보고하였고, 양(1994)은 한우에 있어서 황체수가 10개, 총 회수란수는 7개, 이식 가능 수정란 수는 4개라고 보고한 것보다는 본 연구에서 다소 많은 이식 가능 수정란 수를 나타냈다. 이는 과배란 처리 방법에 의한 차이이지만 전체적으로는 유사한 결과를 보였다.

분만 후 혈장 내 요소태질소 수준은 몇 주까지 상승하다가 적정수준을 유지하는 것이 일반적이다(Carroll 등, 1988; Canfield 등, 1990; Park 등, 1997). 혈장 내 요소태질소의 수준은 사양관리의 적정성을 판단하기 위한 지표로 사용되고 있다. 혈장 내 요소태질소의 수준을 <10, 11~18와 ≥19 mg/dl로 나누어 혈장 내 요소태질소의 수준이 이식가능 수정란 수에 미치는 영향에 대해 조사한 내용은 Table 2와 같다. 혈장 내 요소태질소의 수준이 <10, 11~18와 ≥19 mg/dl인 시험구에서 총 회수된 난자 수는 각각 8.2개, 13.8개 및 11.9개였으며, 이식가능 수정란 수는 4.3±1.3개, 5.8±1.8개, 4.7±2.1개를 나타냈다. 혈장 내 요소태질소 수준에 따른 이식가능 수정란 수에서 유의적인 차이를 보이지는 않았으나, 적정 범위 안의 혈장 내 요소태질소를 보이는 개체에서 이식가능 수정란 수가 많았다. 혈장 내 요소태질소 수준은 섭취한 단백질의 양과 분해성, 단백질과 에너지의 균형성 등을 반영해 준다(Ferguson 등, 1993). 그러므로 영양 관리의 적정성을 판정하는 지표로서 활용되어 왔으며, 혈장 내 요소태질소의 수준이 기준치보다 낮을 경우는 대부분 사료섭취량의 부족한 것으로 판정을 하고 높을 경우는 사료내 에너지의 부족에 기인한다고 해석을 하는 것이 일반적이다. 이식가능 수정란 수뿐만 아니라 BUN의 수준이 낮아질 경우 발정 발현율 등 번식효율과 수태율에도 영향을 준다고 보고되어지고 있다(Ferguson 등, 1993; Butler 등, 1996; Park 등, 1997).

Table 2. Effect of BUN concentration on embryo production

BUN concentration (mg/dl)	Cows (n)	Embryo yield	
		No. total ova	No. transferable embryos
< 10	7	8.2±1.9	4.3±1.3
11~18	39	13.8±2.8	5.8±1.8
≥ 19	9	11.9±2.2	4.7±2.1

Table 3. Effect of glucose concentration on embryo production

Glucose concentration (mg/dl)	Cows (n)	Embryo yield	
		No. total ova	No. transferable embryos
< 60	8	7.3±1.6	4.0±1.3
60~70	28	14.5±2.7	5.9±1.9
≥ 70	19	13.3±2.7	5.6±2.0

Table 4. Effect of cholesterol concentration on embryo production

Cholesterol concentration (mg/dl)	Cows (n)	Embryo yield	
		No. total ova	No. transferable embryos
< 150	23	11.5±2.4	5.1±1.7
150~200	26	12.2±2.0	5.4±1.3
≥ 200	6	10.9±2.2	5.2±1.9

Table 3은 glucose 수준이 이식가능 수정란 수에 미치는 영향에 대해 나타낸 표이다. 60 mg/dl 이하일 때 총 회수된 난자 수는 7.3개로써 60~70 mg/dl와 70 mg/dl 이상일 때보다 비해 적게 나타났다. 이식가능 수정란 수에서도 60~70 mg/dl와 70 mg/dl 이상일 때에 비해 60 mg/dl 이하일 때 4.0±1.3개로 5.9±1.9, 5.6±2.0개에 비해 낮게 나타났지만 유의적인 차이는 보이지 않았다. Glucose 역시 에너지 섭취 상황을 반영하며 에너지 부족시 낮은 값을 나타낸다. 농후사료 과다 및 스트레스 시에 높은 값을 나타내기도 한다. Cholesterol과 이식가능 수정란 수와의 관계를 Table 4에서 나타냈다. Cholesterol 수준에 따라 이식가능 수정란 수에서는 유의적인 차이를 보이지 않았다. Cholesterol 수준이 150 mg/dl 이하, 150~200 mg/dl 및 200 mg/dl 이상일 때 총 회수 난자수는 11.5개, 12.2 개 및 10.9개를 회수하였다. 또한, 이식가능 수정란 수는 각각 5.1±1.7개, 5.4±1.3개 및 5.2±1.9개를 나타냈다. Cholesterol은 종합적인 영양 상태와 간 기능을 나타내며, 간 기능이 저하되거나 영양소의 섭취부족시 낮아지고 지방 질 섭취량 과다 시 높아진다.

혈장내 요소태 질소 수준에 비해 다른 생화학 수준에 따른 이식가능 수정란 수에 대한 연구는 아직 미흡한 실정이지만, 공란우의 과배란 처리 전·후의 영양 상태는 총 회수난자 수 및 이식가능 수정란 수에 영향을 미칠 것이며, 기전과 요인에 대해서 명확하지 않지만 이러한 생화학 수준에 의해 난자 회수율 및 이식가능 수정란 수의 저하가 초래할 것으로 생각된다. 과배란 처리 방법의 다양적인 연구와 적절한 영양 관리에 의해 공란우의 적절한 영양 관리를 유지한다면 난소 주기 이상 등의 발생을 예방하여 공란우의 활용 가치를 높일 수 있을 뿐 아니라, 우수한 개체의 수정란을 효과적으로 생산하여 수정란 이식 기술의 향상 및 우수한 유전능력을 가진 개체의 개량에 널리 활용될 것으로 생각된다.

결 론

본 연구는 한우 공란우의 이식가능한 수정란 수와 소의 영양 상태에 영향을 미치는 혈장내 요소태질소(BUN), glucose 및 cholesterol 수준과의 관계에 대해서 조사하였다. 한우 55두에 대하여 발정 주기에 관계없이 CIDR를 질내에 삽입 후 4일째부터 성선자극호르몬(안토린) 28AU를 4일간 12시간 간격으로 근육주사하였다. 투여 3일째 CIDR를 제거하였으며, 동시에 PGF₂α 25 mg을 근육 주사하여 과배란을 유기하였다. 공란우의 인공수정은 PGF₂α 투여 후 발정을 확인하고 12시간 간격으로 2회 인공수정하였으며, 1회 인공수정 전 GnRH 100 μg을 근육 주사하였다. 수정란 회수는 1차 인공수정 후 7~8일째에 비외과적 방법으로 채란하였다. BUN 수준이 <10, 11~18 및 ≥19 mg/dl 일 때 이식가능 수정란 수는 각각 4.3±1.3, 5.8±1.8 및 4.7±2.1을 나타냈다. 공란우 55두 중 황체수가 10 이하와 10이상인 공란우의 과배란 처리하여 수정란을 회수한 결과, 10 이하와 10이상인 공란우의 총 회수된 난자 수는 각각 8.9개와 14.3개였으며, 이식가능 수정란수는 황체수가 10이하인 경우 4.8개, 10 이상인 경우 5.6개로 나타났다.

인용문헌

- Almeida AP (1987): Superovulatory response in dairy cows repeatedly treated with PMSG. *Theriogenology* 27:205.
- Armstrong DT (1993): Recent advances in superovulation of cattle. *Theriogenology* 28:531-540.
- Austin EJ, Mihm M, Ryan MP, Williams DH, Roche JF (1999): Effect of duration of dominance of the ovulatory follicle on onset of estrus and fertility in heifers. *J Anim Sci* 77:2219-2226.
- Bastidas P, Randel RD (1987): Seasonal effects on embryo transfer results in Brahman cows. *Theriogenology* 28:531-540.
- Butler WR, Calaman JJ, Beam AW (1996): Plasma and milk urea nitrogen in relation to pregnancy rate in lactating dairy cattle. *J Anim Sci* 74: 858-865.
- Canfield RW, Sniffen CJ, Butler WR (1990): Effects of excess degradable protein on postpartum reproduction and energy balance in dairy cattle. *J Dairy Sci* 73:2342-2349.
- Carroll DJ, Barten GW, Anderson GW, Smith RD (1988): Influence of protein intake and feeding strategy on reproductive performance of dairy cows. *J Dairy Sci* 71:3470- 3478.
- Christensen LG (1991): Use of embryo transfer in future cattle breeding schemes. *Theriogenology* 35: 141-149.
- Donaldson LE, Perry B (1983): Embryo production by repeated superovulation of commercial donor cows. *Theriogenology* 20:163-168.
- Donaldson LE (1984): Effect of age of donor cows on embryo production. *Theriogenology* 21:963-967.
- Elsden RP, Nelson LD, Seidel GE (1978): Superovulating cows with follicle stimulating hormone and pregnant mare's serum gonadotrophin. *Theriogenology* 9:17-26.
- Ferguson JD, Galligan DT, Blanchard T, Reeves N (1993): Serum urea nitrogen and conception rate : The usefulness of test information. *J Dairy Sci* 76: 3742-3746.
- Goulding D, Williams DH, Roche JF, Boland MP (1991): Superovulation in heifers using pregnant mare's serum gonadotropin or follicle stimulating hormone during the mid luteal stage of the estrus cycle. *Theriogenology* 36:949-958.
- Greve T, Callesen H, Hyttel P (1983): Endocrine profiles and egg quality in the superovulated cow. *Nord Vet Med* 35:408-421.
- Hasler JF, Brooke GP, McCauley AD (1981): The relationship between age and response to superovulation in Holstein cows and heifers. *Theriogenology* 15:109.
- Isogai T, Shimohira I, Kimura K (1993): Factors affecting embryo production following repeated superovulation treatment in Holstein donors. *J Reprod Dev* 39:79-84.
- Lucy MC (2001): Reproductive loss in high producing dairy cattle: Where will it end? *J Dairy Sci* 84:1277-1293.
- Pankowski JW, Galton DM, Erb HN, Guard CL, Grohn YT (1995): Use of prostaglandin PGF₂α as a postpartum reproductive management tool for lactating dairy cows. *J Dairy Sci* 78:1477-1478.
- Park SB, Kim HS, Kim CK, Chung YC, Lee JW, Kim CH (1997): Relation of conception rate and plasma urea nitrogen in dairy cattle. *Korean J Anim Reprod* 21:185-189.
- Pawlyshyn V, Lindsell CE, Braithwaite M, Mapleton RJ (1986): Superovulation of beef cows with FSH-P : A dose-response trial. *Theriogenology* 25:179.
- Pelssier CL (1976): Dairy cattle breeding problems and their consequence. *Theriogenology* 6:575-583.
- Roche JF, Mackey D, Diskin MD (2000): Reproductive management of postpartum cows. *Anim Reprod Sci* 60:703-712.
- Seidel GE (1981): Superovulation and embryo transfer in cattle. *Science* 211:351-358.
- Shea BF, Janzen RE, McDermand DP (1984): Seasonal variation in response to stimulation and related embryo transfer procedures in Alberta over a nine year period. *Theriogenology* 21:186-195.
- Smith C (1984): Genetic improvement of livestock, using nucleus breeding units. *World Animal Review* 65:2-10.
- Smith C (1988): Application of embryo transfer in animal breeding. *Theriogenology* 29:203-212.

27. Staigmiller RB, Bellows RA, Anderson GB, Seidel GE, Foot WD, Menino AR, Wright RW (1992): Superovulation of cattle with equine pituitary extract and porcine FSH. Theriogenology 37:1091-1099.
28. Stringfellow DA, Seidel SM (1998): Manual of the International Embryo Transfer Society. 3rd ed International Embryo Transfer Society Inc, Illinois, pp. 165-17.
29. Takedomi T, Aogagi Y, Konishi M, Kishi H, Taya K, Watanabe G, Sasamoto S (1992): Superovulation in Holstein heifers by a single injection of porcine FSH dissolved in polyvinylpyrrolidone. Theriogenology 39: 327.
30. Warfield SJ, Seidel GE Jr, Eldsen RP (1986): A comparison of two FSH regimens for superovulating cows and heifers. Theriogenology 25:213.
31. Yamamoto M, Ooe M, Kawaguchi M, Suzuki T (1994): Superovulation in the cow with a single intramuscular injection of FSH dissolved in polyvinylpyrrolidone. Theriogenology 41:747-755.
32. 김홍률, 김덕임, 원유석, 김창근, 정영채, 이규승, 서길웅 (1997): 한우에서 FSH-P와 SUPER-OV에 의한 체내 수정란 생산에 관한 연구. I. 다배란 처리 조건에 따른 체내수정란 생산에 영향을 미치는 요인. 한국수정란이식학회지 12:37-48.
33. 손동수, 김일화, 이호준, 서국현, 이동원, 류일선, 이광원, 전기준, 손준규, 최상용 (1997): 한우수정란의 동결보존 및 쌍자 생산에 관한 연구. I. 동결수정란의 이식과 자우생산. 한국수정란이식학회지 12:75-90.
34. 손동수, 김일화, 류일선, 연성희, 서국현, 이동원, 최선호, 박수봉, 이충섭, 최유림, 안병석, 김준식 (2000): 젖소 MOET Scheme의 추진을 위한 수정란 생산과 이식. 한국수정란이식학회지 15:57-65.
35. 손동수, 한만희, 최창용, 최선호, 조상래, 김현종, 류일선, 최성복, 이승수, 김영근, 김삼기, 김상희, 신권희, 김일화 (2006): 우수 한우의 수정란 생산 및 이식. 한국수정란이식학회지 21:147-156.
36. 손준규, 최창용, 조상래, 연성희, 최선호, 김남태, 정진우, 김성재, 정연섭, 복난희, 유용희, 손동수 (2010): 한우 공란우 과배란 처리와 혈액 내 요소태 질소 수준과의 관계. 한국동물번식학회지 34(3):201-205.
37. 양보석 (1994): 체내 및 체외 소 수정란의 임신율에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 서울대학교 박사학위 논문.
38. 임석기, 우제석, 전기준, 장선식, 강수원, 윤상기, 손동수 (1998): 한우에 있어서 PEG에 용해시킨 Folltropin-V의 1회 페하주사에 의한 다배란 유기. 한국수정란이식학회지 13:207-212.

(접수일자: 2011. 9. 5 / 채택일자: 2011. 9. 15)