

진드기 피해 예방 수칙

중증열성혈소판감소증후군이란?

(SFTS, Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)

- 원인병원체 : SFTS virus
- 주로 SFTS 바이러스에 감염된 작은소참진드기에 물려서 감염
- 주요증상 : 심한 고열 및 소화기 증상이며 중증화되어 사망을 초래할 수 있음

[진드기 피해방지 축산농가 예방수칙]

- 진료시 피부노출 최소화, 긴 옷을 착용하고 소매와 바지 끝을 단단히 여미고 토시와 장화 착용
- 축사 내외부에서 진드기 발견 시 동물용의약품으로 구제
- 축사 내외에서 옷을 벗어 놓거나, 눕거나 하는 행동 자제
- 진료 후에는 입었던 옷을 털고 세탁 및 목욕
- 진료 시 기피제 사용이 일부 도움될 수 있음
- 진드기에 물린 후, 심한 발열 등 증상이 있는 경우 병원에 내원하여 진단을 받을 것

[진드기 구제 방법]

- 동물에 대한 진드기의 구제는 동물용의약품인 진드기 구제제를 사용하여 가축의 약욕 · 주사 또는 분무살포하거나 사료혼합 급여 등을 통해 실시
 - 진드기 구제제(주성분)는 약욕제, 분무 · 살포제로서 아미트라즈(Amitraz), 사이퍼메트린(Cypermethrin) 제제가 있으며, 주사제 · 경구투여제로서 이버멕틴(Ivermectin) 제제가 있음

※ 진드기 구제 동물용의약품 현황

주성분	제형	용법
Ivermectin	산제 주사제	경구투여(사료혼합 급여) 피하주사
Cypermethrin	액제	분무
Amitraz	액제	분무, 약욕