

東醫寶鑑 중 大黃 처방의 原著 비교 분석 연구

김안나¹ · 이가위² · 오용택¹ · 장현철¹ · 김홍준^{1, 2*}

A comparative analysis for the original references of prescriptions including Rhei Rhizoma in Dongeuibogam

Kim An-na¹ · Lee Chia-wei² · Oh Yong-taek¹ · Jang Hyun-chul¹ · Kim Hong-jin^{1, 2*}

¹Informatics Development & Management Group, Korea Institute of Oriental Medicine

¹Dept. of Korean Medical Prescription, Woosuk University

Objectives : This report describes the original references of 154 formulas related to the use of Rhei Rhizoma main blended from Dongeuibogam.

Methods : This study analyzes the original references of 154 formulas including Rhei Rhizoma as a key component in Dongeuibogam.

Results : There were five types as follows: 1. There is no exact match between 154 formulas in Dongeuibogam and the original formulas in references. 2. Case that could not found the original formula in reference: 22%. 3. Case that the citation is the similar to the original reference: 4%. 4. Case that the citation is not same to expression but contents basically: 73%. 5. Case of addition of content: 1%

Conclusions : Most formulas related to the use of Rhei Rhizoma main blended from Dongeuibogam are similar to the contents in the original references. But we can find that Heo Jun, who writes Dongeuibogam, modifies the contents for his intention of editing, idea and situation in Korea.

Key Words : Rhei Rhizoma, monarch drug, Dongeuibogam, prescribing information, information interchange.

I. 서 론

사회가 발전하고 많은 지식들이 축적됨에 따라 다양한 분야에서 정보의 교환이 활발히 이루어지고 있으며 교환되는 정보의 양이 증가함에 따라 자연스럽게 정확한 정보를 교환하는 것이 중요해졌다. 의료분야도 예외는 아니며 특히나 생명을 다루는 분야인 만큼 정확한 정보를 교환하는 것은 그 무엇보다 중요하고 할 수 있다.

한의학은 오랜 시간 발전하며 많은 지식을 축적해왔으며, 많은 서적들이 집필되었고 많은 처방들이 만들어지고 보완 발전해 왔다. 한의학의 오랜 역사를 증명하듯 한의학 서적 중에는 기존의 많은 지식들을 효율적으로 활용하기 위해 기존 서적들을 종합, 정리한 서적들이 많이 있는데, 『東醫寶鑑』이 대표적이라고 할 수 있다. 그런데 『東醫寶鑑』을 포함한 많은 한의학 서적들이 상호 인용, 참고를 거듭하며 발전하다 보니 여러 서적에 동일한 처방이 등장하기도 하고, 동명의 다른 처방들이 등장하기도 하며 인용의 과정에서 原出典의 내용을 그대로 인용하는 경우도 있으나 일부 내용을 바꾸어 인용하는 경우도 있었다. 보통 처방 정보는 주로 그 이름을 식별자로 하기

* 교신저자 : 김홍준, 전주시 완산구 중화산동 2가 196-3번지 우석대학교 한의학과 나동 204호
E-mail : kimboncho@woosuk.ac.kr Tel : 063-290-9028
투고일 : 2014년07월04일 수정일 : 2014년08월05일
게재일 : 2014년08월05일

때문에 추가 정보가 존재하지 않으면 처방 이름만으로 그 내용을 판단하게 되는데, 동명의 다른 처방이 존재하거나(同名異方), 동일한 처방이 다른 이름으로 존재하거나(異名同方), 인용과정에서 별도의 표기 없이 일부 내용이 바뀌게 되면 처방 이름만으로는 그 차이를 인지하기 어려우므로 정확한 처방 정보 교환에 장애요소가 된다. 따라서 정보교환의 정확성을 위한 처방정보 비교분석의 일환으로 서적에서 인용된 처방과 원출전의 처방을 실제 정리, 비교해 보고 인용의 과정에서 달라진 부분을 명확히 하는 것이 필요하다.

한편, 大黃은 『神農本草經』에서는 “大黃은 性味가 苦寒하고, 주로 瘀血, 血閉寒熱, 癥瘕積聚, 留飲食積을 치료하고 腸胃를 蕩滌하고 推陳致新, 通利水穀, 調中化食, 安和五臟한다.”고 기재되어 있고,^{1,2)} 明代의 李時珍의 『本草綱目』에서 大黃은 “下痢赤白, 裏急腹痛, 小便淋瀝, 實熱燥結, 燥熱譫語, 黃疸 및 諸火瘡를 치료한다.”고 하였으며,^{1,3)} 『東醫寶鑑』에서는 “性大寒, 味苦, 無毒[一云有毒]. 主下瘀血血閉, 破癥瘕積聚, 通利大小腸, 除溫瘴熱疾, 療癰疽, 瘡癩, 毒腫, 號爲將軍.”이라 하는 등⁴⁾ 오랫동안 한의학에서 사용되는 중요 약물이다.

따라서 본 논문에서는 임상 및 연구 현장에의 정확한 원전근거 제공과, 상호 정보교환의 정확성을 제공할 수 있도록 임상에서 대표적으로 사용되는 『東醫寶鑑』 서적에 수록된 처방들 중 大黃이 主藥으로 配伍된 154개 方劑에 대하여 『東醫寶鑑』에서 출전으로 삼고 있는 原著와 직접 對照하는 방식으로 원출전과 동의보감 처방간의 내용을 비교 조사하였다.

II. 本 論

1. 연구 대상 및 방법

『東醫寶鑑』중 大黃이 主藥으로 配伍된 處方들은 먼저 處方名은 同一하나 構成內容이 다른 경우는 處方에 (2), (3)을 表記하여 區分하였다. 外용제의 경우에는 처방명 뒤에 *로 표시하였다. 大黃이 主藥으로 配伍된 處方이라 함은 첫 번째

로 處方構成에서 大黃의 役割이나 使用量이 君臣藥으로 作用한 처방, 두 번째로 여러 가지 藥物과 等分으로 構成되어 있는 경우에는 大黃의 效能을 主 作用으로 하는 處方으로 한정하였다 (Table 1)⁵⁾.

君臣藥에 대해서는 『素問·至眞要大論』에서 “主病之謂君, 佐君之謂臣...”, 『脾胃論』에서는 “君藥分量最多, 臣藥次之, 使藥又次之, 不可令臣過于君”, “力大者爲君”, 『活人心統』에서는 “凡用藥殊分, 主病爲君, 以十分爲率, 臣用七八分, 輔佐五六分, 使以三四分”이라 한 내용을 참조하였다.⁶⁻⁸⁾

이러한 방법으로 大黃이 主藥으로 配伍된 154개의 方劑를 선정한 다음(Table 1), 선정된 方劑 중에서 인용된 역대 의방들을 조사하고, 原出典⁹⁻²⁹⁾과 對照하는 방식으로 처방정보를 비교분석하였다.

2. 연구내용 및 결과

大黃이 主藥으로 配伍된 方劑 중에서 인용된 原著인 역대의방과 그 역대의방을 어느 정도 인용했는지를 조사하여 비교 분석하였다.

먼저 原出典의 인용서를 표로 작성하여 비교해 보고, 그 종수에 있어서 차이의 정도를 알아보았다. 선정된 154개의 方劑 중 原出典을 조사해보면 本草, 仲景, 千金, 活人, 新書, 直指, 三因, 聖惠, 局方, 良方, 宣明, 東垣, 海藏, 丹心, 寶鑑, 得效, 瑞竹, 拔粹, 精義, 鉤玄, 正傳, 綱目, 入門, 醫鑑, 回春, 類聚, 雲岐, 保命, 王隱君, 易老, 俗方 31곳 이다. 이는 역대의서의 약자 또는 간칭으로 다음 표에서 간략히 설명하였다 (Table 2).

다음은 『東醫寶鑑』에서 제시한 大黃이 주로 사용된 方劑와 原出典의 主治 構成등을 비교하였다. 일부 引用文중 許浚이 제시한 醫書에서 확인할 수 없는 것은 不詳이라 표시하였고, 제시된 文獻을 찾지 못한 것은 原文과 對照比較하지 못하였다고 표시하였다.

2-1. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 本草의 비교

『東醫寶鑑』의 인용 출처명 중 “本草”는 역대의 방 중 神農氏의 『神農本草經』을 말한다. “본초”에서 인용된 처방으로는 大黃湯(2)이 있다. 그러나 『神農本草經』의 원문을 조사하였으나 大黃湯(2)을 찾지를 못하였다(Table 3). 여기서의 본초는 神農氏의 本草, 唐代 陳藏器의 本草拾遺, 唐 甄立言著의 本草音義, 宋 龐安常의 本草補遺, 宋 唐慎微의 備用本草經史證類, 明 王綸著의 本草集要 등이 있는데……”³⁰⁾라고 하는 것으로 보아 기타 어떤 의서를 인용하였는지에 대해 더욱 자세한 조사가 필요할 것으로 보인다.

2-2. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 仲景의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “仲景”은 역대의 방 중 後漢 張機의 『傷寒論』과 『金匱要略』 두 권을 말한다. 여기서 “仲景”에서 인용된 方劑는 7首로서 三黃瀉心湯(1) 茵陳蒿湯 大陷胸湯 三黃瀉心湯(2) 附子瀉心湯 梔子大黃湯 備急丸이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 4). 내용을 살펴보면 茵陳蒿湯, 大陷胸湯, 三黃瀉心湯(2), 附子瀉心湯, 梔子大黃湯의 내용은 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化가 되어 있다. 또한 三黃瀉心湯(2), 三黃瀉心湯(1)의 原處方名은 瀉心湯으로 되어있으며, 三黃瀉心湯(1)은 生地黃二兩이 增加되었고, 備急丸은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-3. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 千金의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “千金”은 역대의 방 중 唐 孫思邈의 『千金方』을 말한다. 여기서 “千金”에서 인용된 方劑는 3首로서 桃仁煎, 大黃牡丹湯, 龍膽湯이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 5). 내용을 살펴보면 桃仁煎, 大黃牡丹湯, 龍膽湯의 내용은 대부분 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 主治가 비교적 簡略化가 되어 있다.

2-4. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 活人の 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “活人”은 역대의 방 중 宋 朱肱의 『活人書』을 말한다. 여기서 “活人”에서 인용된 方劑는 2首로서 茵陳大黃湯 調中湯이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 6). 내용을 살펴보면 調中湯의 내용은 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化가 되어 있다. 茵陳大黃湯은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-5. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 新書의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “新書”은 역대의 방 중 宋 陳文中之 『活幼新書』을 말한다. 여기서 “新書”에서 인용된 方劑는 1首로서 十灰散이 있는데, 이것을 原文과 對照比較하지를 못하였다(Table 7).

2-6. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 直指의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “直指”은 역대의 방 중 宋 楊士瀛의 『直指方』을 말한다. 여기서 “直指”에서 인용된 方劑는 3首로서 大黃飲子, 逐瘀湯, 返魂追命再造散이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 8). 내용을 살펴보면 返魂追命再造散의 내용은 대체로 서로 비슷하다하나, 大黃飲子, 逐瘀湯은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-7. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 三因의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “三因”은 역대의 방 중 宋 陳無擇의 『三因方』을 말한다. 여기서 “三因”에서 인용된 方劑는 2首로서 大黃左經湯, 雞鳴散이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 9). 내용을 살펴보면 大黃左經湯의 내용은 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 主治가 簡略化되어 있고 構成에 있어 防己가 생략되었다. 雞鳴散은 原出典에서 찾지를 못하였고 主治가 비슷한 處方을 찾았다.

2-8. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 聖惠의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “聖惠”은 역대의방 중 宋太宗의 승으로 太醫들이 편찬한 醫書인 『太平聖惠方』을 말한다. 여기서 “聖惠”에서 인용된 方劑는 1首로서 導滯散이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 10). 내용을 살펴보면 導滯散의 方名은 原出典에서 찾지를 못하였으나, 구성이 비슷한 처방을 찾을 수 있었다.

2-9. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 局方的 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “局方”은 역대의방 중 宋太醫局에서 編纂한 『太平惠民和劑局方』을 말한다. 여기서 “局方”에서 인용된 方劑는 2首로서 八正散, 脾約丸이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 11). 내용을 살펴보면 八正散, 脾約丸의 내용은 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서의 八正散, 脾約丸의 主治가 簡略化되어 있다. 八正散의 構成에 있어 原出典에서는 炙甘草가 사용되었고 『東醫寶鑑』에서는 甘草로 사용되었다. 또한 脾約丸은 原出典에서는 脾約麻仁丸으로 命名되어 處方名이 바뀌었음을 알 수 있다.

2-10. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 良方的 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “良方”은 역대의방 중 宋陳自明의 『婦人大全良方』을 말한다. 여기서 “良方”에서 인용된 方劑는 1首로서 千金桃仁煎이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 12). 내용을 살펴보면 千金桃仁煎의 내용은 대체로 서로 비슷하나 原出典에서는 桃仁煎으로 命名되어 處方名이 바뀌었음을 알 수 있다.

2-11. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 宣明的 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “宣明”은 역대의방 중 金劉完素의 『宣明論』을 말한다. 여기서 “宣明”에서 인용된 方劑는 4首로서 三花神祐丸, 四生丸, 解毒丸, 大黃甘草飲子가 있는데, 이것을

원문과 비교하였다(Table 13). 내용을 살펴보면 三花神祐丸, 四生丸, 解毒丸, 大黃甘草飲子の 내용은 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서의 主治가 비교적 簡略化되어 있다. 四生丸의 경우 原出典에서는 軟金丸으로 命名되어 處方名이 바뀌었음을 알 수 있다.

2-12. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 東垣의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “東垣”은 역대의방 중 元李杲의 『東垣十書』을 말한다. 여기서 “東垣”에서 인용된 方劑는 7首로서 七宣丸, 三一承氣湯(1), 立效散, 羌活導滯湯, 秦艽當歸湯, 三黃枳朮丸, 枳實導滯丸이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 14). 내용을 살펴보면 秦艽當歸湯, 三黃枳朮丸, 枳實導滯丸의 主治는 대체로 서로 비슷하나 東醫寶鑑에서는 비교적 簡略化되어 있다. 秦艽當歸湯의 경우 原出典에는 處方名이 없이 主治 構成만을 제시하였고, 또한 東醫寶鑑에서의 處方에는 皂角仁 白朮 紅花 桃仁이 생략되어 있다. 七宣丸, 三一承氣湯(1), 立效散은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-13. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 海藏의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “海藏”은 王好古의 號로서 역대의방 중 元王好古의 『陰證略例 此事難知 痰論萃英 醫墨元戎 湯液本草』을 말한다. 여기서 “海藏”에서 인용된 方劑는 1首로서 洗肝散이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 15). 내용을 살펴보면 洗肝散은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-14. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 丹心の 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “丹心”은 역대의방 중 元朱震亨의 『丹溪心法』을 말한다. 여기서 “丹心”에서 인용된 方劑는 19首로서 導經丸, 當歸潤燥湯, 通神散, 大黃散, 荊黃湯, 大陷胸丸, 桃仁承氣湯, 木香枳殼丸, 沈香交泰丸, 順氣散, 黃

連散, 濟生茵陳湯, 既濟解毒湯, 內疎黃連湯, 五香連翹湯, 黃甘散, 黃黑散, 四黃散*, 牛黃奪命散이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 16). 내용을 살펴보면 當歸潤燥湯, 大黃散, 桃仁承氣湯, 濟生茵陳湯, 內疎黃連湯, 牛黃奪命散의 主治는 대체로 서로 비슷하나 牛黃奪命散의 主治는 『東醫寶鑑』에서는 더욱 상세히 제시하였으며, 나머지 처방의 主治는 모두 簡略化되어 있다. 當歸潤燥湯의 경우 原出典에서는 導滯通幽湯으로 命名되어있으며 『東醫寶鑑』에는 麻仁이 추가되었다. 大黃散의 경우 主治 構成은 같으나 原出典에서는 處方名이 제시되지 않았고, 濟生茵陳湯은 茵陳湯으로 牛黃奪命散은 神聖牛黃奪命散으로 命名되어 있다. 木香枳殼丸은 原出典에서 찾지를 못하였으나 木香檳榔丸으로 主治 構成이 비슷한 處方을 찾아볼 수 있었다. 또한 黃連散의 경우 處方名은 같으나 主治 構成이 다르게 나타났다. 既濟解毒湯의 경우 原出典에서 찾지를 못하였으나 主治 構成이 비슷한 處方을 찾아볼 수 있었다. 導經丸, 荊黃湯(1), 大陷胸丸, 沈香交泰丸, 順氣散, 既濟解毒湯, 五香連翹湯, 黃甘散, 黃黑散, 四黃散*은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-15. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 寶鑑의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “寶鑑”은 역대의방 중 元 羅謙甫의 『衛生寶鑑』을 말한다. 여기서 “寶鑑”에서 인용된 方劑는 3首로서 枳實大黃湯(1) 平氣散 復元活血湯이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 17). 내용을 살펴보면 平氣散, 復元活血湯의 主治는 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化되어 있다. 또한 平氣散의 경우 原出典에 비하여 鷄心一味가 생략되어 있고, 枳實大黃湯(1)은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-16. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 得效의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “得效”은 역대의방 중 元 危亦林的 『世醫得效方』을 말한다. 여기서

“得效”에서 인용된 方劑는 9首로서 疏風順氣元, 推氣丸, 瀉肝散, 二黃散, 三將軍元, 寬腸丸, 三一承氣湯(2), 雙解散, 百合丹이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 18). 내용을 살펴보면 疏風順氣元, 推氣丸, 瀉肝散, 二黃散, 三將軍元, 三一承氣湯(2), 雙解散, 百合丹의 主治는 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化되어 있다. 다만 疏風順氣元은 原出典에는 順氣元으로 命名되었고 三一承氣湯(2)은 三乙承氣湯으로 命名되었다. 또한 推氣丸과 三一承氣湯(2)의 處方構成은 原出典에는 모두 枳殼으로 되어있으나 『東醫寶鑑』에는 모두 枳實로 되어있다. 寬腸丸, 雙解散의 경우 主治는 비슷하나 處方構成이 같지가 않다. 百合丹의 경우 原出典에 비하여 『東醫寶鑑』에는 枳殼이 추가되어 있다.

2-17. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 瑞竹의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “瑞竹”은 역대의방 중 元 沙图穆秀克的 『瑞竹堂方』을 말한다. 여기서 “瑞竹”에서 인용된 方劑는 2首로서 木香檳榔丸, 木香三棱散이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 19). 내용을 살펴보면 木香檳榔丸, 木香三棱散의 主治와 構成은 原出典과 『東醫寶鑑』에서 대체로 서로 비슷하다.

2-18. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 拔粹의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “拔粹”은 역대의방 중 元 杜思敬의 『濟生拔粹』을 말한다. 여기서 “拔粹”에서 인용된 方劑는 1首로서 木香順氣丸이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 20). 내용을 살펴보면 木香順氣丸은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-19. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 精義의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “精義”은 역대의방 중 元 齊德之의 『外科精義』을 말한다. 여기서 “精義”에서 인용된 方劑는 3首로서 五利大黃湯,

內消升麻湯, 萬應膏*이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 21). 내용을 살펴보면 五利大黃湯, 內消升麻湯, 萬應膏*의 主治와 構成은 原出典과 『東醫寶鑑』에서 대체로 서로 비슷하다.

2-20. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 王隱君의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “王隱君”은 역대의방 중 元 王隱君의 『泰定養生主論』을 말한다. 여기서 “王隱君”에서 인용된 方劑는 1首로서 滾痰丸이 있는데, 이것을 原文과 對照比較하지를 못하였다(Table 22).

2-21. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 鈎玄의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “鈎玄”은 역대의방 중 明 王履의 『百病鈎玄』을 말한다. 여기서 “鈎玄”에서 인용된 方劑는 1首로서 全眞丸이 있는데, 이것을 原文과 對照比較하지를 못하였다(Table 23).

2-22. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 正傳의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “正傳”은 역대의방 중 明 虞搏의 『醫學正傳』을 말한다. 여기서 “正傳”에서 인용된 方劑는 4首로서 雞矢醴散, 牡蠣大黃湯, 玉燭散, 綠雲膏*이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 24). 내용을 살펴보면 雞矢醴散, 牡蠣大黃湯, 玉燭散, 綠雲膏*의 主治 構成은 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化되었다. 雞矢醴散의 경우 原出典에는 宣明雞矢醴散으로 命名되어있다.

2-23. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 綱目の 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “綱目”은 역대의방 중 明 樓英의 『醫學綱目』을 말한다. 여기서 “綱目”에서 인용된 方劑는 10首로서 瀉青丸, 痔藥膏子, 舟車丸, 舟車神祐丸, 大聖瀋川散, 宣毒丸, 活命金丹, 茵陳梔子湯, 消毒丸, 如神散*이 있는

데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 25). 내용을 살펴보면 瀉青丸, 痔藥膏子, 舟車丸, 舟車神祐丸, 大聖瀋川散, 活命金丹, 茵陳梔子湯, 消毒丸, 如神散*의 主治는 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化되어 있다. 또한 舟車丸, 舟車神祐丸의 경우 主治는 모두 舟車丸으로 되어있으나, 처방은 舟車神祐丸로 되어있다. 茵陳梔子湯의 경우 主治는 같으나 原出典의 處方構成은 『東醫寶鑑』과 같지가 않다. 全眞丸은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-24. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 入門의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “入門”은 역대의방 중 明 李梴의 『醫學入門』을 말한다. 여기서 “入門”에서 인용된 方劑는 30首로서 竹瀝達痰丸, 通經丸, 萬應丸, 瀉腎湯, 參仁丸, 消毒飲, 瀉胃湯, 荊黃湯, 大芎黃湯, 小承氣湯, 大承氣湯, 調胃承氣湯, 六一順氣湯, 陶氏黃龍湯, 黑奴丸, 四順清涼飲, 消塊丸, 琥珀膏*, 外敷神膏*, 陶氏茵陳湯, 人中黃丸, 仙方活命飲, 打膿散, 瀉心湯, 漏蘆飲子, 通天再造散, 化毒散, 含化丹, 三黃散*, 陣王丹*이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 26). 내용을 살펴보면 竹瀝達痰丸, 通經丸, 萬應丸, 瀉腎湯, 參仁丸, 消毒飲, 瀉胃湯, 荊黃湯, 大芎黃湯, 小承氣湯, 大承氣湯, 調胃承氣湯, 六一順氣湯, 陶氏黃龍湯, 黑奴丸, 四順清涼飲, 消塊丸, 琥珀膏*, 外敷神膏*, 陶氏茵陳湯, 人中黃丸, 仙方活命飲, 打膿散, 瀉心湯, 漏蘆飲子, 通天再造散, 化毒散, 含化丹, 三黃散*, 陣王丹*의 主治는 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化되었다. 또한 竹瀝達痰丸의 경우 『東醫寶鑑』에서는 原出典보다 半夏 陳皮 白朮 白茯苓 甘草가 추가 되어있으며, 消毒飲은 『東醫寶鑑』과 原出典의 處方構成이 같지가 않다. 陶氏黃龍湯의 경우 『東醫寶鑑』에는 原出典에 비해 甘草가 추가되어 있고 生薑, 大棗, 桔梗이 생략되었다. 琥珀膏의 경우 處方構成이 原出典과 一致하지가 않다. 陶氏二陳湯은 原出典에 비하여 生薑, 燈心이 생략되어있다.

2-25. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 醫鑑의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “醫鑑”은 역대의 방증 明 龔信의 『古今醫鑑』을 말한다. 여기서 “醫鑑”에서 인용된 方劑는 12首로서 丑寶丸, 淸火豁痰丸, 血極膏, 無極丸, 海金沙散, 木香導氣湯, 顛倒散, 利氣丸, 淸火湯, 三棱煎元, 牛黃散子, 千金內消散, 通導散이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 27). 내용을 살펴보면 丑寶丸, 淸火豁痰丸, 無極丸, 木香導氣湯, 顛倒散, 利氣丸, 淸火湯, 三棱煎元, 牛黃散子, 千金內消散, 通導散의 主治는 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化되어 있다. 다만 淸火豁痰丸의 경우 處方構成을 보면 『東醫寶鑑』에는 人蔘이 추가되었으나 原出典에 비하여 連翹, 天南星, 枳實, 貝母, 天花粉, 陳皮, 神麩, 青黛, 玄明粉, 白芥子が 생략되어 있다. 無極丸은 原出典에 비하여 『東醫寶鑑』에는 當歸, 熟地黃이 추가되어 있다. 木香導氣湯의 경우에는 『東醫寶鑑』 處方에는 木香이 생략되어 있다. 淸火湯의 경우 原出典에는 玄明粉을 사용하되 없으면 芒硝로 대신하라 하였지만, 『東醫寶鑑』에는 오로지 芒硝를 사용하였다. 通導散의 原出典에는 桃仁이 없으나 『東醫寶鑑』에는 桃仁이 추가되어 있다. 血極膏, 海金沙散은 原出典에서 찾지를 못하였다.

2-26. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 回春의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “回春”은 역대의 방증 明 龔信의 『萬病回春』을 말한다. 여기서 “回春”에서 인용된 方劑는 11首로서 淸心滾痰丸, 追蟲丸, 五仙丸, 交泰丸, 枳實大黃湯(2), 化痞丹, 五仙膏*, 二聖救苦丸, 加味僵黃丸, 神奇散, 冰黃散*이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 28). 내용을 살펴보면 淸心滾痰丸, 追蟲丸, 五仙丸, 交泰丸, 枳實大黃湯(2), 化痞丹, 五仙膏*, 二聖救苦丸, 加味僵黃丸, 神奇散, 冰黃散*의 主治는 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化되어 있다. 다만 枳實大黃湯(2)의 경우 原出典에는 腹痛甚加木香으로 되어있으나 『東醫寶

鑑』에는 木香이 추가되었다.

2-27. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 類聚의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “類聚”은 역대의 방증 朝鮮 世宗의 『醫方類聚』을 말한다. 여기서 “類聚”에서 인용된 方劑는 5首로서 倒換散, 當歸承氣湯(2), 延年護命丹, 桃溪氣寶丸, 追風散이 있는데, 이것을 원문과 비교하였다(Table 29). 내용을 살펴보면 倒換散, 當歸承氣湯(2), 延年護命丹, 桃溪氣寶丸, 追風散의 主治는 대체로 서로 비슷하나 『東醫寶鑑』에서는 비교적 簡略化되어 있다.

2-28. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 雲岐의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “雲岐”은 역대의 방증 元 張璧撰의 『雲岐子保命集論類要』을 말한다. 여기서 “雲岐”에서 인용된 方劑는 1首로서 通膈丸이 있는데, 이것을 原文과 對照比較하지 못하였다(Table 30).

2-29. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 保命原著와의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “保命”은 역대의 방증 元 張璧撰의 『雲岐子保命集論類要』을 말한다. 여기서 “保命”에서 인용된 方劑는 2首로서 當歸承氣湯(1), 大黃牽牛散이 있는데, 이것을 原文과 對照比較하지 못하였다(Table 31).

2-30. 『東醫寶鑑』 편의 方劑 인용문과 易老, 俗方 原著와의 비교

『東醫寶鑑』 인용 출처명 중 “易老”, “俗方”은 정확한 인용서명을 찾을 수 없었다. 위 두 가지 原著 중 “易老”에서 인용된 方劑는 3首로서 大黃湯(1), 三化湯, 僵黃丸이 있으며, “俗方”에서 인용된 方劑는 1首로서 大黃膏*가 있다. 그러나 이들의 原出典을 찾지 못하여 對照比較를 못하였다.

Ⅲ. 고찰

方劑는 침 시술과 함께 중요한 한의학적 치료의 하나로, 方劑명칭은 처방지식의 활용 및 교류를 위한 최소 정보 중 하나이다. 그런데 方劑명칭이 같더라도 同名異方인 경우가 있고, 또한 출전에 따라 다소 처방구성이나 내용이 상이할 수 있으므로, 한의학 方劑에 있어서 출전정보를 명기하는 것은 정확한 方劑정보 획득 및 임상 지식 정보 교류 시 중요하다고 할 수 있다. 본 연구에서는 『東醫寶鑑』 내 大黃을 主藥으로 하는 처방에 대하여 원출전의 정보를 직접 비교 대조방법을 통해 살펴보았다.

『東醫寶鑑』에 수록된 大黃을 主藥으로 하는 方劑의 引用文 內容과 原文의 比較를 통하여 아래의 5종으로 분류를 하였는데, 각 처방별 내용은 Table 1-32, Figure 1에 분석하였다.

- ① 引用文과 原文이 완전히 一致하는 경우: 없음
- ② 原文을 찾을 수 없는 경우: 35처방
- ③ 引用文과 原文이 基本的으로 同一하거나 상하의 說明을 위해 약간의 변동이 있는 경우: 6처방
- ④ 引用文과 原文의 기본내용이 같지만 表現상 다른 경우. 다섯 가지 유형으로 다음과 같이 세부 분류를 할 수 있다.

- 1) 각각의 단어 변화: 2처방
- 2) 方名의 변화: 1처방
- 3) 『東醫寶鑑』에서 내용이 더욱 간결화: 98처방
- 4) 用藥, 主治, 制劑, 劑量, 煎服用法 內容의 변화: 15처방
- 5) 여러 단락의 原文을 수집 정리하여 다시 쓴 경우: 없음
- ⑤ 내용이 補充된 경우: 1처방

비교 결과들을 살펴보면 大黃 중심의 처방들의 경우 『東醫寶鑑』가 引用한 方劑文獻의 특징에 있어 완벽히 일치하는 경우는 없었으나, 方劑理論에 대해서는 약간의 변화가 있기는 하지만 實質的인 原文의 내용과는 크게 바뀌지는 않았음을 알 수가 있다. 方劑에 대해서는 原著에 충실했으나, 몇 가지 변화가 있었다. 引用文과 原文

의 비교에서 나온 결과에서 볼 수 있듯이, 원문 내용의 변동이나, 정련한 부분들이 있었다. 거기에다 原著의 중요한 부분을 추려서 새롭게 표현하였고, 내용의 보충도 보인다. 이러한 결과들은 『東醫寶鑑』의 作者가 中國醫著를 완전히 引用한 것이 아니라, 자신의 편집의도와 사상에 따라, 원전문헌에 따라 필요한 加工을 하였으며, 자신의 것으로 만들었다는 것을 보여준다. 이는 大黃을 主藥으로 하는 方劑에 대해서 한정하여 조사한 결과이므로, 동의보감에 수록되어 있는 다른 처방들에 대해서도 原著와의 비교가 필요한 부분이라는 한계점이 있고, 原著의 경우들도 처방이 처음 사용된 것이 아니라 인용된 부분일 가능성도 많기 때문에 이후 연구를 통해 처방의 최초의 출전과 비교하여 보는 것도 필요할 것으로 보인다. 그러나 본 논문에서 수행한 바와 같이 현대에도 임상현장에서 활발히 사용되고 있는 임상서적인 『東醫寶鑑』과, 역시 한의임상에서 중요한 약재 중 하나인 大黃을 主藥으로 하는 수록 方劑들의 원전내용을 비교하는 연구는 『東醫寶鑑』 관련 연구 및 정확한 처방정보 근거를 위한 기초데이터로서 유용하며, 나아가 각 서적의 데이터베이스 구축 시 상호 정보의 통합 비교를 위한 기본데이터로서 활용될 수 있다고 판단된다.

Ⅳ. 결론

『東醫寶鑑』에서 大黃이 主藥으로 配伍된 方劑와 引用된 原著의 조사를 통해 許浚은 原文을 비슷하게 사용하였거나, 약간의 변화가 있기는 하지만 實質的인 原文의 내용과는 크게 바뀌지는 않았다. 方劑에 대해서는 原著에 충실했으나, 方劑에 따른 변화 用藥, 主治, 製劑, 용량, 전탕법과 복용법의 변화가 있었다. 이는 許浚이 자신의 편집의도와 사상에 따라, 원전문헌에 필요에 따라 정련을 하였으며, 자신의 것으로 만들었다는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 이러한 정확한 처방 인용 정보 연구는 임상 및 연구 현장에의 정확한 원전근거 제공과, 상호 정보교환을 위한 기초 데이터로서 기여할 수 있다고 사료된다.

감사의 글

본 연구는 한국한의학연구원의 “ICT 기반 한의 PHR 플랫폼 및 지식 포털 구축 (과제번호:K14090)” 및 정보통신산업진흥원의 “한의 개인건강정보 표준 개발 (과제번호:D14050)” 과제의 지원을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

1. Kweon DL, Shin DW. Rhei Rhizoma. Seoul:Sinilbooks Ltd. 2007:13-15, 144, 147.
2. 黃劍 等. 掌葉大黃藥資源的開發與利用. 中國資源綜合利用. 2004:15.
3. Shin MK. Clinical herbal medicine. Seoul:Younglim Ltd. 2002:785.
4. Lee SW, Kim HJ, Kim JS. Study on the processing methods of Rhei Rhizoma in Donguibogam and Chejungsinyeon. Korea Institute of Oriental Medicine. 2003;9(1):91-102.
5. Lee CW. A Study on the prescriptions including Rhei Rhizoma as a main component in Donguibogam(東醫寶鑑). Jeonju:Woosuk graduate school. 2013.
6. Choi J, Yun HJ, Yun YG. A Study on the Applications of Herba Menthae Mainly Blended Prescription in Donguibogam. The Korean journal of oriental medical prescription. 2011;19(1):91-102.
7. Lee TH, Lee SJ, Huh J, Shin DG, Lee JC, Shin YS, et al. Study on the Applications of prescriptions including Platycodi Radix as a main component in Donguibogam. The Korean journal of oriental medical prescription. 2010;18(1):23-42.
8. Lim DH, Jeon YK, Lee JH. A Study on Applications of Prescriptions including Semen Arecae as a Main Component in Donguibogam. The Korean journal of oriental medical prescription. 2009;17(1):61-74.
9. 陳德興等註. 神農本草經. 福建科技出版社. 2012.
10. 張新勇. 仲景全書(之)傷寒論. 金匱要略方論. 中國古籍出版社. 2010.
11. (唐)孫思邈著, 國學典藏書系『叢書編委會主編. 國學典藏書系:千金方. 吉林出版集團有限責任公司.
12. (宋)朱肱著. 中醫經典文庫:活人書. 中國中醫藥出版社. 2009.
13. 楊士瀛著. 經典醫學名著:仁齋直指方. 第二軍醫大學出版社. 2006.
14. (宋)陳無擇著, 候如艷 校註. 三因極一病證方論. (中國醫藥科技出版社. 2011.
15. 宋·太平惠民和劑局編, 劉景源整理. 中醫臨床必讀叢書:太平惠民和劑局方. 人民衛生出版社. 2007.
16. (宋)陳自明著. 劉洋校註. 婦人大全良方. 中國醫藥科技出版社. 2011.
17. (金)劉完素 著. 中醫經典文庫:黃帝素問宣明論方. 中國中醫藥出版社. 2007.
18. 劉河間, 張子和, 李東垣, 朱丹溪. 金元四大家醫學全書. 山西科學技術出版社. 2012.
19. (元)羅天益著. 中國經典文庫:衛生寶鑑. 中國中醫藥出版社. 2009.
20. 王好古醫學全書. (元)王好古著. 胡國臣總主編. 中國中醫藥出版社. 2004.
21. 經典醫學名著 世醫得效方. (元)危亦林. 第二軍醫大學出版社. 2006.
22. 中醫經典名著:瑞竹堂經驗方. (元)沙圖穆秀克. 中國醫藥科技出版社. 2012.
23. 濟生拔粹方. (元)杜思敬編. 國家圖書館出版社. 2006.
24. 外科精義. (元)齊德之. 人民衛生出版社. 2006.
25. (明)虞搏, 郭瑞華 點校. 中醫古籍名著文庫:醫學正傳. 中醫古籍出版社. 2002.
26. (明)樓英編撰. 明清中醫名著叢刊:醫學綱目.

- 中國中醫藥出版社. 1996.
27. 明 李梴. 醫學入門(新對譯編註). 2009.
28. (明)龔信 纂輯. 達美君 校註. 明清中醫臨證
小叢書:古今醫鑒. 中國中醫藥出版社. 1997.
29. 明 龔延賢 撰. 萬病回春(對譯). 2007.
30. Kim JK. Literature research of
Doneuibogam. Bibliography Research 11.
1995; 207-243.

Table 1. Treatment area of the formulas including Rhei Rhizoma as a main component

門	處方
癰疽	內疎黃連湯 五香連翹湯 五利大黃湯 仙方活命飲 千金內消散 黃甘散 打膿散 瀉心湯 大黃牧丹湯 黃黑散 牡蠣大黃湯 玉燭散 神奇散 雙解散 漏蘆飲子 內消升麻湯
大便	大黃湯(1) 木香導氣湯 大黃牽牛散 七宣丸 當歸潤燥湯 參仁丸 通神散 疏風順氣元 脾約丸 大黃飲子 推氣丸 三一承氣湯(1) 顛倒散 倒換散
寒	茵陳蒿湯 小承氣湯 大承氣湯 調胃承氣湯 三一承氣湯(2) 六一順氣湯 陶氏黃龍湯 黑奴丸 大陷胸湯 大陷胸丸 三黃瀉心湯(2) 附子瀉心湯 桃仁承氣湯
下	全真丸 舟車丸 舟車神祐丸 三花神祐丸 大聖瀉川散 四生丸 解毒丸 木香順氣丸 通膈丸 宣毒丸 追風散 通天再造散 返魂追命再造散 化毒散 綠雲膏* 含化丹 三黃散* 如神散* 四黃散* 大黃膏*
諸瘡	消塊丸 化痞丹 木香枳殼丸 桃仁煎 三棱煎元 延年護命丹 桃溪氣寶丸 琥珀膏* 五仙膏*
積聚	黃連散 陶氏茵陳湯 梔子大黃湯 茵陳梔子湯 牛黃散子 濟生茵陳湯 茵陳大黃湯
黃疸	調中湯 人中黃丸 既濟解毒湯 消毒丸 殭黃丸 二聖救苦丸 加味殭黃丸
癩疫	血極膏 導經丸 通經丸 無極丸 千金桃仁煎
胞	雞鳴散 導滯散 復元活血湯 通導散 陣王丹*
諸傷	萬應丸 木香三棱散 追蟲丸 五仙丸
蟲	大黃左經湯 羌活導滯湯 枳實大黃湯(1) 三將軍元
足	逐瘀湯 秦艽當歸湯 寬腸丸 痔藥膏子*
後陰	三黃枳朮丸 枳實導滯丸 交泰丸 枳實大黃湯(2)
內傷	龍膽湯 牛黃奪命散 百合丹 冰黃散*
小兒	清心滾痰丸 丑寶丸 當歸承氣湯(1)
神	清火豁痰丸 竹瀝達痰丸 滾痰丸
痰飲	八正散 瀉腎湯 海金砂散
小便	瀉肝散 二黃散 消毒飲
眼	三化湯 活命金丹 大芎黃湯
風	雞矢醴散 沈香交泰丸 外敷神膏*
脹滿	三黃瀉心湯(1) 十灰散
血	瀉青丸 洗肝散
肝臟	大黃散 荊黃湯(1)
頭	四順清涼飲 清火湯
火	順氣散 大黃甘草飲子
消渴	木香檳榔丸
氣	瀉胃湯
口舌	荊黃湯(2)
咽喉	立效散
乳	利氣丸
腹	當歸承氣湯(2)
燥	大黃湯(2)
嘔吐	平氣散
咳嗽	備急丸
救急	萬應膏*
雜方	
합계	154

Table 2. References of the formulas including Rhei Rhizoma as a main component

	인용처	횟수	인용서명	연대 저자
1	本草	1	神農本草經	神農氏
2	仲景	7	傷寒論 金櫃玉函經	後漢 張機
3	千金	3	千金方	唐 孫思邈
4	活人	2	活人書	宋 朱肱
5	新書	1	活幼新書	宋 陳文中
6	直指	3	直指方	宋 楊士瀛
7	三因	2	三因方	宋 陳無擇
8	聖惠	1	太平聖惠方	宋 太宗
9	局方	2	太平惠民和劑局方	宋 太醫局編
10	良方	1	婦人大全良方	宋 陳自明
11	宣明	4	宣明論	金 劉完素
12	東垣	7	東垣十書	元 李杲
13	海藏	1	陰證略例 此事難知 痲論萃英 醫壘元戎 湯液本草	元 王好古
14	丹心	19	丹溪心法	元 朱震亨
15	寶鑑	3	衛生寶鑑	元 羅謙甫
16	得效	9	世醫得效方	元 危亦林
17	瑞竹	2	瑞竹堂方	元 沙图穆秀克
18	拔粹	1	濟生拔粹方	元 杜思敬
19	精義	3	外科精義	元 齊德
20	王隱君	1	泰定養生主論	元 王隱君
21	鉤玄	2	百病鉤玄	明 王履
22	正傳	4	醫學正傳	明 虞搏
23	綱目	10	醫學綱目	明 樓英
24	入門	30	醫學入門	明 李梴
25	醫鑑	12	古今醫鑑	明 龔信
26	回春	11	萬病回春	明 龔信
27	類聚	5	醫方類聚	朝鮮 世宗
28	雲岐	1	雲岐子保命集論類要(元張璧撰)	雲岐子
29	保命	2	雲岐子保命集論類要(元張璧撰)	保命
30	易老	3		
31	俗方	1		

Table 3. Comparison with Shinnongboncho(神農本草經)

方名	東醫寶鑑	神農氏의 神農本草經
大黃湯(2)	병증: 嘔吐噎膈反胃	
	주치: 冷涎反胃	①未詳
	구성: 大黃一兩 生薑自然汁半盞 灸大黃令燥 淬入薑汁中 如此	
	淬汁盡 切焙爲末 每二錢 陳米一撮 葱白二莖	

Table 4. Comparison with Sanghan, Gungwe(傷寒論, 金櫃要略)

方名	東醫寶鑑	後漢 張機의 傷寒論 金櫃要略
三黃瀉心湯(1)	<p>병증: 嘔血 吐血 주치: 吐血大作 병인 병리: 熱甚 구성: 大黃三錢 黃連 黃芩各一錢 加生地黄二錢</p>	<p>①心氣不足, 吐血, 衄血, 瀉心湯主之 ②大黃二兩 黃連 黃芩各一兩</p>
茵陳蒿湯	<p>병증: 太陰病黃疸 주치: 太陰證發黃 구성: 茵陳蒿一兩 大黃五錢 梔子二錢</p>	<p>①陽明病, 發熱, 汗出者, 此為熱越, 不能發黃也. 但頭汗出, 身無汗, 劑頸而還, 小便不利, 渴引水漿者, 此為瘀熱在裏, 身必發黃 ②傷寒七八日, 身黃如橘子色, 小便不利, 腹微滿者 ③茵陳蒿 (六兩) 梔子 (擘, 十四枚) 大黃 (去皮, 二兩)</p>
大陷胸湯	<p>병증: 傷寒結胸 주치: 大結胸 구성: 大黃三錢 芒硝二錢 甘遂末五分</p>	<p>①太陽病, 脈浮而動數, 浮則為風, 數則為熱, 動則為痛, 數則為虛; 頭痛, 發熱, 微盜汗出, 而反惡寒者, 表未解也. 醫反下之, 動數變遲, 膈內拒痛, (一雲頭痛即眩) 胃中空虛, 客氣動膈, 短氣躁煩, 心中懊, 陽氣內陷, 心下因硬, 則為結胸. ②若不結胸, 但頭汗出, 余處無汗, 劑頸而還, 小便不利, 身必發黃. ③傷寒六七日, 結胸熱實, 脈沈而緊, 心下痛, 按之石硬者 ④大黃去皮六兩 芒硝一升 甘遂一錢</p>
三黃瀉心湯(2)	<p>병증: 傷寒痞氣 주치: 未詳 구성: 大黃 黃連各二錢 黃芩一錢</p>	<p>①心氣不足, 吐血, 衄血, 瀉心湯主之. ②大黃二兩 黃連 黃芩各一兩</p>
附子瀉心湯	<p>병증: 傷寒痞氣 주치: 未詳 구성: 大黃 黃連 黃芩各二錢剉 附子炮二錢 別煮作汁</p>	<p>①心下痞, 而復惡寒, 汗出者, 附子瀉心湯主之. ②大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩 附子炮去皮破, 別煮取汁, 一枚</p>
梔子大黃湯	<p>병증: 酒疸 주치: 酒疸 구성: 梔子 大黃各二錢 枳實一錢 豉一合</p>	<p>①酒黃疸, 心中懊, 或熱痛, 梔子大黃湯主之. ②梔子十四枚 大黃一兩 枳實五枚 豉一升</p>
備急丸	<p>병증: 卒死 주치: 諸卒死暴疾百病 及中惡 客忤 鬼擊 鬼打 面青口噤 奄忽氣絕 구성: 大黃 乾薑 巴豆霜各一兩</p>	<p>①未詳</p>

Table 5. Comparison with Chunkeumbang(千金方)

方名	東醫寶鑑	唐 孫思邈의 千金方
桃仁煎	병증: 腸覃石瘕血蠱 주치: 婦人血蠱 血瘕 血積 經候不通 구성: 桃仁 大黃各一兩 虻虫炒五錢 朴硝一兩	①治月經不通,臍下堅結,大如杯升,發熱往來,下痢羸瘦,此為氣瘕. (一作血瘕) 若生肉瘕不可為也,療之方. ②桃仁 虻蟲各壹升 樸消伍兩 大黃陸兩
大黃牡丹湯	병증: 腸癰腹癰 주치: 腸癰 脉遲緊 膿未成 可下之 구성: 大黃 芒硝各一錢半 牡丹皮 桃仁 瓜蒌仁各二錢半	①腸癰之為病,小腹重而強抑之則痛,小便數似淋,時時汗出復惡寒,其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀,其剝數者小有膿也,巢源雲已有洪數者膿也其剝遲緊者未有膿也,甚者腹脹大,轉側聞水聲,或繞臍生瘡,或膿從臍中出或大便出膿分. ②腸癰之病少腹痞堅或堅者未成膿可下之當 ③大黃四兩 牡丹三兩 桃人五十枚 瓜子一升 芒硝二兩.
龍膽湯	병증: 小兒繼病疝病 주치: 未詳 구성: 大黃煨二錢 龍膽草 柴胡 黃芩 桔梗 釣藤皮 赤芍藥 赤茯苓 甘草各一錢 蜣螂二箇	①嬰兒出腹,血脈盛實,寒熱溫壯,四肢驚掣,發熱,大吐(口見)者.若已能進哺,中食實不消,壯熱及變蒸不解,中客人鬼氣,並諸驚癇 ②龍膽 釣藤皮 柴胡 黃芩 桔梗 芍藥 茯苓 (一方作茯神) 甘草各六銖 蜣螂二枚 大黃一兩

Table 6. Comparison with Whalinseo(活人書)

方名	東醫寶鑑	宋 朱肱의 活人書
茵陳大黃湯	병증: 黃疸 주치: 傷寒大熱 發黃疸 구성: 茵陳 梔子 柴胡 黃柏 黃芩 升麻 大黃各一錢 草龍膽五分	①未詳
調中湯	병증: 瘟疫 주치: 夏發燥疫 口乾咽塞 구성: 大黃一錢半 黃芩 芍藥 葛根 桔梗 赤茯苓 藁本 白朮 甘草各一錢	①治夏月秋初,忽有暴寒折於盛熱,熱結於四肢,則壯熱頭痛,寒傷於胃則下利,或血,或水,或赤,壯熱迷悶,脈數,宜下之 ②大黃去皮三分 葛根 黃芩 芍藥 桔梗去蘆 槁本(真者無,則以芎代之) 茯苓去皮 白朮 甘草炙 以上各半兩

Table 7. Comparison with Whalyoosinseo(活幼新書)

方名	東醫寶鑑	宋 陳文中의 活幼新書
十灰散	병증: 嘔血 吐血 주치: 嘔吐咯嗽血 大吐血 구성: 大蓴 小蓴 柏葉 荷葉 茅根 茜根 大黃 梔子 棕櫚皮 牡丹皮各等分	①原文과 對照比較하지를 못하였음.

Table 8. Comparison with Jikjibang(直指方)

方名	東醫寶鑑	宋 楊士瀛의 直指方
大黃飲子	병증: 大便不通 주치: 熱燥 大便不通 구성: 生地黃二錢 大黃煨 杏仁 梔子 升麻	①未詳
逐瘀湯	枳殼各一錢 人參 黃芩 甘草各五分 병증: 瘕痔 주치: 諸痔 通利大小便 取下惡物 구성: 大黃 桃仁各一錢 川芎 白芷 生乾地	①未詳
返魂追命再造散	黃 赤芍藥 枳殼 蓬朮 五靈脂 阿膠珠 赤茯苓 茯神 木通 生甘草各七分 병증: 大風瘡 주치: 大風癩 구성: 皂角刺一兩半 大黃一兩	①治大風厲風. ②川大黃 錦紋皺者 一兩 獨生皂角刺 一兩半

Table 9. Comparison with Saminbang(三因方)

方名	東醫寶鑑	宋 陳無擇의 三因方
大黃左經湯	병증: 脚氣 주치: 四氣流注足陽明經 腰脚赤腫 痛不可行 大小便秘澀 구성: 大黃一錢 羌活 茯苓 細辛 前胡 枳殼 厚朴 黃芩 杏仁 甘草各七分	①治風寒暑濕流注足陽明經,使腰脚痺痛,行步艱難,涎潮昏塞,大小便秘 澀,腹痛嘔吐,或復下利,惡聞食氣,喘滿肩息,或自汗譫妄. ②大黃蒸 細辛去苗 茯苓 防己 羌活 黃芩 前胡 枳殼麩炒,去瓢 濃樸去皮,銼,姜制,炒 甘草炙 杏仁麩炒去皮尖別研 各等分
雞鳴散	병증: 諸傷 救急方 주치: 金刃傷 打撲傷 血瘀凝積 煩悶欲絕 구성: 大黃酒蒸五錢 當歸尾三錢 桃仁二七粒研	①治從高墜下,及木石所壓.凡是傷損,血瘀凝積,氣絕欲死;並久積瘀血,煩躁疼痛,叫呼不得,並以此藥利去瘀血即愈.此藥推陳致新,治折傷神效. ②大黃酒蒸 一兩 杏仁去皮尖 三七粒

Table 10. Comparison with Taepyounghaebang(太平聖惠方)

方名	東醫寶鑑	宋 太宗의 太平聖惠方
導滯散	병증: 諸傷 救急方 주치: 傷損內有瘀血 大便不通 壅鬱欲死 구성: 大黃一兩 當歸二錢半 麝香少許	①처방명이 없음 ②治從高墜下. 大便下血不止方. ③當歸 (三分銼微炒) 川大黃 (三分銼碎微炒) 上件藥,搗細羅為散,不計時候,以溫酒調下二錢.

Table 11. Comparison with Kukbang(和劑局方)

方名	東醫寶鑑	宋 太醫局編의 太平惠民和劑局方
八正散	병증: 小便不通 주치: 小便癃閉不通 병인 병리: 膀胱熱積 구성: 大黃 木通 瞿麥 篇蓄 滑石 梔子 車前子 甘草各一錢	①治大人,小兒心經邪熱,一切蘊毒,咽幹口燥,大渴引飲,心忪面熱,煩躁不安,睛疼,唇焦鼻衄,口舌生瘡,咽喉腫痛.又治小便赤澀,或癃閉不通,及熱淋,血淋 ②車前子 瞿麥 篇蓄(亦名地扁竹) 滑石 山梔子仁 甘草炙 木通 大黃(面裹,煨,去面,切,焙) 各一斤
脾約丸	병증: 脾約證 주치: 小便數 大便難 名爲脾約證 구성: 大黃蒸四兩 枳實 厚朴 赤芍藥各二兩 麻子仁一兩半 杏仁一兩二錢半	①脾約麻仁丸 ②治腸胃燥澀,津液耗少,大便堅硬,或秘不通,臍腹脹滿,腰背拘急,及燥.又治小便利數,大便因硬而不渴者,謂之脾約,此藥主之. ③厚樸(去粗皮,姜汁炒) 芍藥 枳實(麩炒,各半斤) 大黃(蒸,焙,一斤) 杏仁(去皮尖,炒研) 麻仁(別研) 各五兩

Table 12. Comparison with Lyangbang(良方)

方名	東醫寶鑑	宋 陳自明의 婦人大全良方
千金桃仁煎	병증: 血結成瘕 주치: 血瘕 血積 經候不通 구성: 桃仁 大黃 朴硝各二兩 虵蟲五錢	①桃仁煎 ②治婦人血瘕血積,經候不通.(出《本事方》) ③桃仁 大黃各一兩 虵蟲 半兩,炒黑 川樸硝二兩

Table 13. Comparison with Sunmyoung(宣明論)

方名	東醫寶鑑	金 劉完素의 宣明論
三花神祐丸	병증: 水濕 주치: 一切水濕腫滿 구성: 黑丑頭末二兩 大黃一兩 芫花 甘遂 大戟各五錢 輕粉一錢	①治中滿腹脹,喘嗽淋,一切水濕腫滿,濕熱腸垢沈積,變生疾病,久病不已,黃瘦困倦,氣血壅滯,不得宣通.或風熱燥郁,肢體麻痺,走註疼痛,風痰涎嗽,頭目旋運,瘧疾不已,瘕積聚,堅滿痞悶,酒積食積,一切痰飲嘔逆.及婦人經病不快,帶下淋瀝,無問赤白.並男子婦人傷寒濕熱,腹滿實痛,久新瘦弱,俗不能別.辨或尋常,只為轉動之藥.兼瀉久新腰痛,並一切下痢,及小兒驚疳積熱乳癖滿,並宜服之. ②甘遂 大戟 芫花(醋拌濕,炒) 各半兩 牽牛二兩 大黃(為細末) 一兩 輕粉一錢
四生丸	병증: 火熱 주치: 一切積熱 及痰熱 구성: 黑丑頭末 大黃 皂角各二兩 朴硝五錢	①軟金丸 ②治一切熱疾.常服潤肌膚,遲老.諸熱證皆可服. ③大黃 牽牛 皂角各二兩 樸硝半兩
解毒丸	병증: 火熱 주치: 一切熱毒 癰腫 瘡瘍 咬牙驚悸 구성: 大黃 黃芩 黃連 梔子 滑石 黑丑頭末各五錢	①治一切熱證,常服保養.除痰飲,消酒食,清頭目,利咽膈,能令遍身結滯宣通,氣利而愈.神強體健,耐傷省病.並婦人經病,及產後血滯,腰腳重痛,小兒積熱,驚風潮搐.臟用丸,亦日顯仁丸.加黃連,薄荷,川芎各半兩,名曰神芎丸. ②大黃 黃芩(各二兩) 牽牛 滑石(各四兩)
大黃甘草飲子	병증: 消渴 주치: 一切消渴 구성: 大黃一兩半 甘草大者四兩 剉 黑豆五升	①治男子婦人一切消渴不能止者 ②大豆(先煮三沸,出淘苦水,再煮) 五升 大黃一兩半 甘草(大粗者,長四指,打碎) 四兩

Table 14. Comparison with Dongwon(東垣)

方名	東醫寶鑑	元 李杲의 東垣十書
七宣丸	병증: 大便秘結 주치: 熱留腸胃 大便秘結 구성: 大黃一兩 木香 檳榔 訶子皮各五錢 桃仁十二箇	①未詳
三一承氣湯(1)	병증: 大小便不通 주치: 傷寒及雜病熱盛 大小便不通 胸腹滿痛 구성: 未詳	①未詳
立效散	병증: 吹乳 妬乳 주치: 吹爛 立效 구성: 生薑去皮一兩 大黃 甘草各五錢 黃瓜萹一箇 入乳香 沒藥末各一錢	①未詳
羌活導滯湯	병증: 脚氣 주치: 脚氣初發 一身盡痛 或肢節腫痛 便尿阻隔 구성: 大黃酒煨二錢四分 羌活 獨活 各一錢二分 防己 當歸尾各七分 枳實五分	①治香港脚初發, 一身盡痛, 或肢節腫痛, 便溺阻隔。 ②羌活 獨活 (各一錢二分) 防己 當歸尾 (各七分) 大黃 (二錢四分) 枳實 (五分)
秦朮當歸湯	병증: 肛門痒痛 주치: 痔漏 大便結燥疼痛 구성: 大黃煨四錢 秦朮 枳實各一錢 澤瀉 當歸梢	①처방명이 없음 ②治痔漏大便結燥疼痛 ③大黃(煨)四錢 秦朮 枳實各一錢 澤瀉 當歸梢 皂角仁 白朮各五分 紅花少許 桃仁二十箇
三黃枳朮丸	병증: 食傷 주치: 傷肉食濕麪厚味之物 悶亂不快 구성: 黃芩二兩 黃連酒炒 大黃煨 神麪炒 白朮 陳皮各一兩 枳實麪炒五錢	①治傷肉食濕面辛辣濃味之物, 填塞悶亂不快。 ②黃芩二兩 黃連(酒洗) 大黃(濕紙裹煨) 神曲(炒) 橘皮 白朮 以上各一兩 枳實(麪炒)五錢
枳實導滯丸	병증: 食傷 주치: 傷濕熱之物 不消作痞滿 구성: 大黃一兩 枳實 神麪各五錢 茯苓 黃芩 黃連 白朮各三錢 澤瀉二錢	①治傷濕熱之物, 不得施化, 而作痞滿, 悶亂不安。 ②大黃一兩 枳實(麪炒, 去穢) 神曲(炒,) 以上各五錢 茯苓(去皮) 黃芩(去腐) 黃連(揀淨) 白朮 以上各三錢 澤瀉二錢

Table 15. Comparison with Haejang(海藏)

方名	東醫寶鑑	元 王好古의 陰證略例 此事難知 痰論萃英 醫壘元戎 湯液本草
洗肝散	병증: 肝實 주치: 肝實 구성: 羌活 當歸 薄荷 防風 大黃 川芎 梔子炒 甘草灸各一錢	①未詳

Table 16. Comparison with Dansim(丹溪心法)

方名	東醫寶鑑	元 朱震亨의 丹溪心法
導經丸	병증: 月閉不通 주치: 經閉不通 腰腹疼痛 구성: 大黃二兩 當歸 川芎 白芍藥 官桂 桃仁 甘草各一兩 血竭二錢半 紅花一錢 斑貓糯米 同炒二十箇	①未詳
當歸潤燥湯	병증: 大便秘結 주치: 血燥 大便秘澁 구성: 當歸 大黃 熟地黃 桃仁 麻仁 生甘草各一錢 生地黃 升麻各七分 紅花二分	①導滯通幽湯 ②治大便秘,幽門不通,上沖,吸門不開,噎塞不便,燥秘,氣不得下.治在幽門,以辛潤之. ③歸身 升麻 桃仁泥各一錢 生地黃 熟地黃 各半錢 甘草炙 紅花 各三分 ④上作一服,水煎.食前調檳榔末半錢,或加麻仁泥一錢,加大黃,名當歸潤燥湯.
通神散	병증: 大便秘結 주치: 婦人大便不通 구성: 大黃 芒硝 桃仁 郁李仁各一兩 木香五錢	①未詳
大黃散	병증: 熱暈 주치: 眩暈不可當 此火炎上也 구성: 大黃酒浸炒三次 爲細末 茶清調下一錢至二錢	①처방명이 없음 ②頭眩,痰,挾氣虛並火.治痰為主,挾補藥及降火藥.無痰則不作眩,痰因火動.又有濕痰者,有火痰者.濕痰者,多宜二陳湯.火者,加酒芩.挾氣虛者,相火也,治痰爲先,挾氣藥降火,如東垣半夏白術天麻湯之類不可當者,以大黃酒炒爲末,茶湯調下 ③以大黃酒炒爲末,茶湯調下
荊黃湯(1)	병증: 熱暈 주치: 風熱眩暈 구성: 大黃酒炒 荊芥穗 防風各二錢	①未詳
大陷胸丸	병증: 傷寒結胸 주치: 熱實結胸 구성: 大黃五錢 葶藶子炒 杏仁炒各三錢 芒硝二錢半 甘遂二字	①未詳
桃仁承氣湯	병증: 傷寒血證 주치: 血結膀胱 小腹結急 便黑 譫語 漱水 宜此攻之 구성: 大黃三錢 桂心 芒硝各二錢 甘草一錢 桃仁留尖十枚	①凡血證上行,或唾或嘔或吐,皆逆也;若變而下行爲惡痢者,順也.上行爲逆,其治難;下行爲順,其治易.故仲景雲:蓄血證,下血者,當自愈也.與此意同.若無病患忽然下痢,其病進也.今病血證上行,而復下行惡痢者,其邪欲去,是知吉也.諸見血,身熱脈忽然浮大即傾危. ②芒硝(三錢) 甘草(二錢半) 大黃(一兩) 桂(三錢) 桃仁(半兩,去皮尖) 上 咀.每兩入姜同煎.
木香枳殼丸	병증: 積聚 주치: 飲食積聚 心腹脹痛 嘔逆吞酸 구성: 黑丑頭末微炒 大黃各二兩 枳殼 茯苓 白朮 厚朴 半夏 人參 木香 青皮 陳皮 三稜 蓬朮 檳榔 神麴 麥芽各一	①木香檳榔丸 ②鼓脹又名單鼓,如因有食積而腹脹者,有熱,用木香檳榔丸 ③木香 檳榔 當歸 黃連 枳殼 青皮 黃柏 各一兩 黃芩 陳皮 三稜 香附 牽牛末 各二兩 莖術 大黃 各四兩

兩 乾生薑 枳實各五錢

沈香交泰丸	병증: 脹滿 주치: 濁氣在上 生臃脹 구성: 吳茱萸 大黃酒浸各一兩 厚朴五錢 沈香 白朮 陳皮各三錢 白茯苓 澤瀉 當歸 木香 青皮各二錢	①未詳
順氣散	병증: 消渴 주치: 消中 能飲食 小便黃赤 以此微利 至不飲食而愈 구성: 厚朴二錢半 大黃二錢 枳實一錢	①未詳
黃連散	병증: 黃疸 주치: 黃疸 壅熱 二便秘澁 구성: 大黃醋炒一兩 黃芩 黃連 甘草各一兩	①元有痔漏,又於肛門邊生一塊,皮濃腫痛作膿,就在痔孔出,作食積註下治. ②黃連 阿魏 神曲 山楂 桃仁 連翹 槐角 犀角(等分)
濟生茵陳湯	병증: 疫癘發黃 주치: 時行熱鬱 通身發黃 구성: 茵陳四錢 大黃二錢 梔子一錢	①茵陳湯 ②黃疸,通身面目悉黃 ③黃汗者,因脾胃有熱,汗出入水澡浴所致,故汗出黃染衣而不渴 ④茵陳二兩 大黃一兩 梔子仁三錢
既濟解毒湯	병증: 大頭瘟 주치: 天行大頭瘟 頭面赤腫而痛 구성: 大黃酒煨 黃芩 黃連並酒炒 桔梗 甘草各一錢 升麻 柴胡 連翹 當歸身各五分	①처방명이 없음 ②大頭天行病 ③瘟疫,眾人一般病者是,又謂之天行時疫.治有三法,宜補,宜散,宜降,熱甚者加童 便三酒中. ④大黃 黃連 黃芩 人參 桔梗 防風 蒼術 滑石 香附 人中黃
內疎黃連湯	병증: 癰疽 주치: 癰疽 脉洪[一作沈]實 發熱煩燥 藏府秘澁 當先通利 宜用此 구성: 大黃二錢 連翹 赤芍藥各一錢半 黃連 黃芩 當歸 梔子 檳榔各一錢 木香 薄荷 桔梗 甘草各五分	①癰疽 ②治瘡皮色腫硬,發熱而嘔,大便閉,脈洪實者. ③黃連 芍藥 當歸 檳榔 木香 黃芩 梔子 薄荷 桔梗 甘草 各一兩 連翹二兩 大黃二兩半
五香連翹湯	병증: 癰疽 주치: 癰疽 瘡癰 癰癰 結核 一切毒腫 구성: 大黃一錢 連翹 射干 獨活 升麻 桑寄生 沈香 藿香 木香 丁香 甘草各七分 麝香三分	①未詳
黃甘散	병증: 癰疽五發證 주치: 外因四氣 生癰疽 구성: 大黃半生半熟 甘	①未詳

	草節各等分	
黃黑散	병증: 腸癰腹癰 주치: 腹內癰腫 구성: 大黃一兩取末四錢半 破故紙一兩取末二錢 牛蒡子一兩取末一錢 黑牽牛子一兩取末二錢	①未詳
四黃散*	병증: 湯火瘡 주치: 湯火瘡 구성: 大黃 黃芩 黃連 黃栢 白芨各等分	①未詳
牛黃奪命散	병증: 痰涎喘嗽 주치: 小兒肺脹 胸滿喘躡氣急 兩脇扇動 兩鼻竅張 痰涎潮塞 悶亂喘喝 死在朝夕 구성: 白丑半生半熟 黑丑半生半熟 取頭末各五錢 大黃一兩 檳榔二錢半 木香一錢半	①神聖牛黃奪命散 ②小兒驚風,驚而有熱者 ③檳榔半兩 木香三錢 大黃(面裹煨熟,為末)二兩 白牽牛(一半炒一半生用)一兩 黑牽牛(粗末,一半生用一半炒)

Table 17. Comparison with Bogam(寶鑑)

方名	東醫寶鑑	元 羅謙甫의 衛生寶鑑
枳實大黃湯(1)	병증: 脚氣 주치: 濕熱脚氣腫痛 구성: 大黃酒煨三錢 羌活一錢半 當歸一錢 枳實五分	①未詳
平氣散	병증: 水喘 주치: 濕熱喘急 구성: 白牽牛頭末二兩半生半炒 大黃七錢 陳皮去白五錢 青皮 檳榔各三錢	①己未歲初秋越三日.奉召至六盤山.至八月中.霖雨不止.時承上命治不鄰吉歹元帥夫人.年逾五旬.身體肥盛.因飲酒吃乳過度.遂病腹脹喘滿.聲聞舍外.不得安臥.大小便澀滯.氣口脈 大兩倍於人迎.關脈沈緩而有力.予思霖雨之濕.飲食之熱.濕熱大盛.上攻於肺.神氣躁亂.故為喘滿.邪氣盛則實.實者宜下之.故制平氣散以下之. ②青皮(去白) 雞心 檳榔各三錢 大黃七錢 陳皮(去白)五錢 白牽牛(半生半炒.取頭末一半)二兩
復元活血湯	병증: 諸傷 救急方 주치: 治同上(諸傷) 구성: 大黃二錢半 當歸一錢七分 柴胡一錢半 穿山甲炒研 瓜蒞根 甘草各一錢 桃仁十箇為泥 紅花五分	①治從高墜下.惡血留於脅下.疼痛不可忍. ②大黃(酒浸)一兩 柴胡五錢 栝蒞根 穿山甲(炮) 當歸 各三錢 紅花 甘草 各二錢 桃仁(湯泡去皮尖.研如泥)五十個

Table 18. Comparison with Deukhyo(得效)

方名	東醫寶鑑	元 危亦林的 世醫得效方
疏風順氣元	<p>병증: 老人秘結 주치: 腸胃積熱 二便燥澁 諸風秘 氣秘 皆治之 구성: 大黃酒蒸晒七次五兩 車前子炒二兩半 郁李仁 檳榔 麻子仁微炒 兔絲子酒製 牛膝酒洗 山藥 山茱萸各二兩 枳殼 防風 獨活各一兩</p>	<p>①順氣丸 ②治三十六種風,七十二般氣.上熱下冷,腰腳疼痛,四肢無力,惡瘡下疔,疏風順氣.專治大腸秘澀,真良方也. ③大黃(五兩,半生用,半濕紙裹煨) 山藥(刮去皮,二兩) 山茱萸肉 麻子仁(微炒 退殼 一兩另研) 郁李仁(炮去皮研) 兔絲子(酒浸 炒) 川牛膝(酒浸一宿各二兩) 防風 枳殼(炒) 川獨活(各一兩) 檳榔(二兩) 車前子(二兩半)</p>
推氣丸	<p>병증: 大小便不通 주치: 氣不升降 大便秘澁 小便赤黃 구성: 黑牽牛頭末 大黃 檳榔 枳實 陳皮 黃芩各等分</p>	<p>①治三焦痞塞,氣不升降,胸膈脹滿,大便秘澀,小便赤少,並宜服之 ②大黃 陳皮 檳榔 枳殼(小者,去穢) 黃芩 黑牽牛(生用,各等分)</p>
瀉肝散	<p>병증: 肝虛目暗 주치: 烏風昏暗 구성: 大黃 甘草各五錢 郁李仁 荊芥穗各二錢半</p>	<p>①烏風 ②此眼雖癢痛,而頭不旋,但漸漸昏暗,如物遮定,全無翳障,或時生花.此肝有實熱. ③郁李仁 荊芥(各一分) 甘草(炙) 大黃(各半兩)</p>
二黃散	<p>병증: 偷鍼 주치: 努肉攀睛 구성: 大黃 黃芩 防風 薄荷各一錢二分半</p>	<p>①努肉攀睛 ②此證或先赤爛多年,肝經為風熱所沖而成,或用力作勞,有傷肝氣而得.或癢或痛,自兩眦頭努出.心氣不寧,憂慮不已.遂乃攀睛.或起筋膜.宜服二黃散. ③黃芩 大黃 防風 薄荷(各半兩)</p>
三將軍元	<p>병증: 腳氣危證 주치: 腳氣衝心 大便不通 구성: 吳茱萸 木瓜 大黃各等分</p>	<p>①脚气 ②治腳氣入腹沖心,大便不通. ③吳茱萸(去枝梗,湯泡) 宣木瓜(去穢) 川大黃(各等分.大黃或隨其病加減.)</p>
寬腸丸	<p>병증: 肛門痒痛 주치: 用藥枯痔後 大便堅硬難下 구성: 大黃煨 枳殼 當歸酒洗各等分</p>	<p>①諸痔 ②五灰膏塗痔瘡之後,或臟腑秘結不通者,用此藥寬腸. ③黃連 枳殼(各等分)</p>
三一承氣湯(2)	<p>병증: 傷寒裏證 주치: 傷寒雜病入裏之深 大小便不通者 구성: 甘草三錢 大黃 厚朴 枳實 芒硝各一錢半</p>	<p>①三乙承氣湯 ②治嘔吐水漿不入,或食已即吐,大便秘.或利而不鬆快,時覺腹滿者,或下利赤白.而嘔吐食不下者.或大腸小腸膀胱結而不通,上為嘔吐隔食. ③大黃 厚朴(薑炒) 枳殼 芒硝(各半兩) 甘草(一兩)</p>
雙解散	<p>병증: 便癰 주치: 便毒 구성: 大黃 黑丑炒頭末各一錢半 官桂 白芍藥 澤瀉 桃仁各一錢 甘草七分</p>	<p>①治風寒暑濕,饑飽勞役,內外諸邪所傷,無問自汗,汗後雜病,但覺不快,便可通解得愈.小兒生瘡疹,使其出快,亦能氣通而愈. ②益元散(方見中暑類,三兩半) 防風通聖散(方見風科熱證類,三兩半)</p>
百合丹	<p>병증: 龜背龜胸 주치: 龜胸 구성: 大黃七錢半 天門冬 杏仁 百合木通 桑白皮 枳殼 蛄葶藶 石膏各五錢</p>	<p>①小方科 龜胸 ②胸高脹滿,其狀如龜,此肺經受熱所致也.乳母酒麪無度,或夏月熱煩,熱乳與兒得之.或乳母多食五辛,而亦成此疾. ③川大黃(三分,焙) 天門冬(去心,焙) 杏仁(去皮,炒) 百合 木通 桑白皮(炒) 蛄葶藶(紙上炒) 爛石膏(各半兩)</p>

Table 19. Comparison with Seojuk(瑞竹)

方名	東醫寶鑑	元 沙图穆秀克의 瑞竹堂方
木香檳榔丸	병증: 氣痛 주치: 濕熱氣滯痞痛 구성: 大黃四兩 黑丑頭末 黃芩各二兩 木香 檳榔 黃連 當歸 枳殼 青皮 陳皮 香附子 蓬朮 黃柏各一兩	①積滯門 ②木香 檳榔 黃連(去須) 當歸 枳殼(去穰, 火煨) 青皮(去穰) 陳皮(去白) 各一兩 大黃三兩(酒浸濕) 黃芩一兩(去黑心) 黃柏三兩(去粗皮) 牽牛四兩 香附子四兩(炒, 去毛) 廣茂一兩(火煨, 去瓢)
木香三棱散	병증: 蟲 주치: 腹中有蟲 面色萎黃 구성: 黑牽牛子半生半炒取頭末五錢 大黃三錢 大腹子 檳榔 雷丸 錫灰醋炒 三棱煨 蓬朮煨 木香各二錢	①治腹中有蟲, 面色萎黃, 一切積滯 ②黑三棱(半生半炒, 多用) 大腹子(多用) 檳榔 雷丸 錫灰(醋炒) 三棱(煨) 蓬朮(煨) 木香 大黃(已上各乙兩)

Table 20. Comparison with Balsoo(拔粹方)

方名	東醫寶鑑	元 杜思敬의 濟生拔粹方
木香順氣丸	병증: 濕熱 주치: 通利二便 구성: 大黃三兩 黑丑頭末生一兩熟一兩 青皮 檳榔各一兩 木香五錢	①未詳

Table 21. Comparison with Jungyo(外科精義)

方名	東醫寶鑑	元 齊德之의 外科精義
五利大黃湯	병증: 癰疽 주치: 年少壯患癰疽 氣血盛多 二便秘澁 구성: 大黃煨二錢 黃芩 升麻 梔子 芒硝各一錢二分	①發疽 ②治人年四十以前, 氣血盛多, 若患瘡疽, 大小便秘. ③大黃(根) 黃芩(去腐) 升麻(以上各二兩) 芒硝 梔子(以上各一兩二錢)
內消升麻湯	병증: 附骨疽 주치: 附骨疽疎下後服此 구성: 大黃 升麻 當歸 黃芩 赤芍藥 枳實各一錢半 甘草一錢	①夫附骨疽者, 以其毒瓦斯深沈附著於骨也 ②認是附骨疽, 急宜服漏蘆湯, 或五香連翹散疏下之, 次用內消升麻湯及潰膏貼之類, 縱不能消, 亦得浮淺, 及有緩疽, 石疽, 與附骨疽亦相類矣. ③大黃 升麻 當歸 黃芩(去腐) 枳實(炒去穰) 芍藥(以上各二兩五錢) 甘草(炙, 一兩五錢)
萬應膏*	병증: 癰腫久瘡 주치: 一切癰腫久瘡 구성: 大黃 黃芩各二兩 白斂 黃蠟各一兩 黃柏 芍藥 白芷 黃芪 木鱉子仁 杏仁 當歸 白芨 生地黃 官桂 玄參 沒藥 乳香各五錢 黃丹一斤 香油二斤八兩	①治一切瘡瘍, 初生腫甚者, 無問大小, 以膏可腫痕貼之, 煎蔥白水熱淋兩時, 良久再淋, 腫消為度. 如瘡老不能瘥者, 亦收斂聚膿, 決然早瘥. ②黃柏 芍藥 白芷 黃芪 木鱉仁 杏仁 當歸 白芨 生地黃 官桂 玄參(去皮銼) 沒藥 乳香(以上各五錢, 研) 白蠟 黃蠟(以上各一兩) 黃芩 大黃(以上各二兩) 黃丹(一斤) 芝麻油(二斤八兩)

Table 22. Comparison with Wanheunkun(王隱君)

方名	東醫寶鑑	元 王隱君의 泰定養生主論
滾痰丸	병증: 痰飲 주치: 濕熱痰積 變生百病 구성: 大黃酒蒸 黃芩去朽各八兩 青礞石一兩同焙硝一兩入 罐內蓋定 鹽泥固濟晒乾 火煨紅 候冷取出 以礞石如金色爲 度 沈香五錢	①原文과 對照比較하지를 못 하였음.

Table 23. Comparison with Guhyun(鉤玄)

方名	東醫寶鑑	明 王履의 百病鉤玄
全眞丸	병증: 下藥 주치: 三焦壅滯 大小便不通 浮腫脹滿 구성: 黑牽牛子炒四兩 生四兩 同研取頭末四兩 大黃泔浸三日 逐日換泔 取出切焙爲末二兩 右 皂角二兩去皮弦子	①原文과 對照比較하지를 못하였음.

Table 24. Comparison with Jungjeon(正傳)

方名	東醫寶鑑	明 虞搏의 醫學正傳
雞矢醴散	병증: 穀脹 주치: 穀脹 朝食則不能暮食 又 治氣脹水脹及蠱脹 구성: 雞矢白乾者 大黃 桃仁各 等分	①宣明雞屎醴飲 ②治鼓脹,旦食則不能暮食,痞滿壅塞難當. ③大黃 桃仁(去皮) 幹雞屎上各等分
牡蠣大黃湯	병증: 便癰 주치: 治同上(便癰) 구성: 大黃 牡蠣煨各二錢半 甘 草一錢 黃瓜萹一箇	①治便毒 ②大黃(根據前制) 牡蠣(各二錢五分,火) 甘草 (一錢) 栝萹(一個,去皮)
玉燭散	병증: 便癰 주치: 便毒腫痛 구성: 大黃 芒硝各二錢 川芎 當 歸 赤芍藥 生地黃 甘草各一錢	①治便毒. ②川芎 當歸 生地黃 赤芍藥 樸硝 大黃(根據前 制) 甘草(炙,各八分)
綠雲膏*	병증: 外治 주치: 未詳 구성: 黃連 大黃 黃芩 玄參 黃柏 木鱉子育肉各一錢	①瘰癧之癥,內經謂之結核者是也.結核有大小如大 豆,銀杏,連串而生者.形大如馬刀者,謂之馬刀瘡.經別 爲火類,夫火亢之甚,必兼水化制之,其核故堅也.凡瘰 之起,始生於耳後足陽明,少陽二經,浸淫於太陽之經, 漸隨經流註於腋脅手足皆有也.治法,以火針刺入核 中,不可透底,納蟾酥膏於中,外用綠雲膏貼之,三日後 取去核中稠膿,膿盡取去核外薄膜.先破初起之核一 枚,以絕其源,服藥後出者皆愈. ②黃連 大黃 黃芩 玄參 黃柏 木鱉子(去殼,各一 錢)

Table 25. Comparison with Gangmok(綱目)

方名	東醫寶鑑	明 樓英의 醫學綱目
瀉青丸	병증: 肝實 주치: 肝實 구성: 當歸 草龍膽 川芎 梔子 大黃 煨 羌活 防風各等分	①肝熱者,按之肌肉之下,至骨之上,乃肝之熱,寅卯間尤甚者,其脈弦,其病四肢滿悶,便難轉筋,多怒多驚,四肢困熱,筋痿不能起於床,瀉青丸,柴胡飲之類治之.兩手脈弦者,或寅申發者,皆肝熱也,俱宜用之. ②眼之為病,在腑則為表,當除風散熱.在臟則為裏,當養血安神.暴發者,為表而易療.久病者,為裏而難治.除風散熱者,瀉青丸主之. ③凡目赤痛,或大腑秘,或脈實有力者,為有裏證,宜微利之,實熱條瀉青丸,洗肝散之類是也 治目暴發赤腫,除風散熱,瀉青丸. ④東垣先生治斑後風熱毒,翳膜氣暈遮睛,以瀉青丸子瀉之大效,初覺易治. (《保命集》雲:斑後翳膜,亦能治之,瀉青丸減大黃一半用之.) ⑤(頭風屑)肝經風盛,木自搖動.……使梳頭有屑皮,見肺之證也,謂肺主皮毛.大便實,瀉青丸主之;虛則消風散主之. ⑥肝主風,實則目直視,大叫呵欠,項急煩悶;虛則切牙多欠;氣熱則外生風;氣溫則內生風.……肝病,哭叫目直視,呵欠,煩悶,項急.……若手尋衣領及亂撚物者,肝熱也,宜瀉青丸. ⑦肝主風,自病則風搖拘急,肝苦急,急食甘以緩之,佐以酸苦,以辛散之.實則風搖力大,瀉青丸主之. ⑧肝有風,目連割不搖;有熱,則直視亦不搖;得心熱則搖.治肝,瀉青丸.治心,導赤散.凡病或新或久,皆引肝風,風動而上於頭目.目屬肝,風入於目,上下左右如風吹不定,兒不任,故目連割也.若熱入於目,牽其筋脈,兩毗緊,不能轉視,故目直視也.若得心熱則搖,其子母俱有實熱,風火相搏故也.治肝,瀉青丸.治心,導赤散 ⑨肝有風,甚則身反張,強直不搖,心不受熱,當補腎治肝.補腎,地黃丸.治肝,瀉青丸. 傷食發搐,謂不因他癥忽然而搐.此因飲食過度,致傷脾胃,故兒多睡多吐,不思飲食;脾胃既虛,引動肝風則發搐.當先定其搐,加羌活,防風,煎下瀉青丸,後用白餅子下其食,漸漸用調中丸,異功散養其氣. ⑩急驚者陽癇也,俱腑受病,熱痰客於心肺,是少陽相火旺,經雲:熱則生風,因聞大聲而作.蓋謂東方震卦,得火氣而發搐.火本不動,焰得風而動,當用利驚丸,導赤散,瀉青丸,地黃丸.搐止,宜服安神丸. ⑪面上證:左腮為肝,右腮為肺,額上為心,鼻為脾,頰為腎,赤者熱也,隨證治之.目內赤者心熱,導赤散主之;淡紅者心虛熱,生犀散主之.青者肝熱,瀉青丸主之;淺淡者補之.黃者脾熱,瀉黃散主之.無精光者,腎虛,地黃丸主之 ⑫治痘瘡風熱毒翳,膜暈遮睛,以瀉青丸治之,大效.初覺易治. [雲]用竹葉湯和砂糖水,化下瀉青丸二丸,漸至微利,神效. ⑬當歸(去蘆,焙稱) 草龍膽(焙稱) 川芎 梔子 川大黃(煨) 羌活 防風(去蘆) 上各等分 ①治外痔翻花脫出,黃水不止,腫痛.並用銀闔寬蘸藥塗敷,日一次,重者五七次,立愈.先用藥水洗拭幹,卻敷此膏. ②用真桑灰不拘多少,淋濃汁兩碗,熬至一碗,卻入草烏片,大黃片各二錢,再慢火熬至半碗,入甘草一錢,數沸,下淨細錐石半匙頭,不可多,略沸三五次,用絹一重,花紙二重,如絞漆狀,濾過,再熬成膏,候冷.用真膽礬五分,研極細末,放入膏中,用瓦器盛貯封之,臨用入龍腦末和勻敷之.
痔藥膏子	병증: 諸痔 주치: 外痔及反花痔 脫肛腫痛 膿水不止 구성: 草烏片 大黃片各二錢 甘草一錢 石灰末半匙 膽礬五分 龍腦末少	

舟車丸
 병증: 濕熱鬱滯
 주치: 濕熱盛 疎導二便
 구성: 黑丑頭末四兩 大黃二兩
 甘遂 大戟 芫花 青皮 陳皮各一兩 木香五錢

舟車神祐丸
 병증: 水濕
 주치: 一切水濕盛病
 구성: 黑丑頭末四兩 大黃二兩
 甘遂 大戟 芫花並醋炒各一兩 青皮 陳皮 木香 檳榔各半兩 輕粉一錢

①主治는 舟車丸, 舟車神祐丸의 구별 없이 모두 舟車丸으로 쓰여 있으나, 처방은 舟車神祐丸으로 되어있음.
 ②河間根據仲景十棗湯例, 制出此方, 主療一切水濕爲病..
 ③痛風, 有痰帶熱, 先以舟車丸或導水丸, 神芎丸下之, 後以趁痛散調血.
 ④病寒疝, 臍下結聚如黃瓜, 每發繞臍急痛不能忍. 戴師先以舟車丸及豬腎散下四五行, 覺藥繞病三五次而下, 其瀉皆水也.
 ⑤蔡氏一女病黃, 遍身浮腫, 面目如金色, 困乏無力, 不思飲食, 惟喜食生物, 灰之屬. 先以苦劑蒸餅爲丸, 吐痰一碗; 又以舟車丸, 通經散, 下五七行如墨汁; 更以導飲丸磨食散氣, 不數日安好如初.
 ⑥澤州李繼之, 忽患牙痛, 皺眉不語. 樂景先曰: 曾記戴人雲, 陽明經熱有余也, 宜大下之. 乃服舟車丸七十粒, 服畢, 遇數知友留飲, 強飲熱酒數杯, 藥爲鹽酒所發, 盡吐之, 吐畢而痛止. 李大服曰: 戴人神仙也, 不三五日, 又痛, 再服前藥百余粒, 大下數行乃愈.
 ⑦李德卿妻, 因產後病泄一年余, 四肢瘦乏, 諸醫皆斷爲死癥. 求治戴人. 戴人曰: 兩手脈皆微小, 乃痢病之生脈. 況洞泄屬肝經, 肝木克土而成此疾, 亦是腸澀. 腸澀者, 腸中有積水也. 先以舟車丸四五十粒, 又以無憂散三四錢, 下四五行.
 ⑧甘遂(一兩, 醋炒) 大黃(二兩) 芫花(醋炒, 一兩) 黑牽牛(頭末, 四兩) 輕粉(一錢) 大戟(一兩, 醋炒) 青皮 陳皮 木香 檳榔(各半兩)

大聖瀉川散
 병증: 水濕
 주치: 一切水濕 又下諸積之聖藥
 구성: 黑丑頭末 大黃煨 郁李仁 各一兩 芒硝三錢半 木香三錢 甘遂半錢

①此下諸積之聖藥也.
 ②戴人女僮, 足有凍瘡, 戴人令服舟車丸, 浚川散, 大下之, 遂愈. 人或疑之. 戴人雲: 心火降則寒消, 何疑之有?
 ③李七老病湧水癥, 面黃而喘, 二足皆腫, 按之陷而復起, 行則濯濯有聲, 常欲飲水, 不能睡臥. 戴人令上湧去痰而汗之; 次以舟車丸, 浚川散下; 以益腎散復下之; 又以分陰陽, 利水道之劑復下之, 所苦皆瘥. 上脈浮而腹不和者, 吐之.
 ④安喜趙君玉病疽, 遍身發黃, 往問醫, 眾醫皆雲: 乃陽明癥. 公等與麻知幾皆受訓於張戴人, 是商議吃大黃者, 難與論病. 君玉不悅歸, 自揣無別病, 乃取三花神祐丸八十粒服之, 不動. 君玉乃自悟曰: 予之濕熱甚矣, 此藥尚不動. 以舟車丸, 浚川散服之, 大下結糞一鬥, 一夕而黃退. 君玉因此益信戴人之技. 上脈沈而腹不和者下之.
 ⑤尚家一男子, 年二十余歲, 病口中氣出, 臭如登廁, 雖親戚莫肯與對語. 戴人曰: 肺金本主腥, 金爲火所乘, 火主臭, 應便是也. 久則成腐, 腐者腎也, 此亢極則反兼水化也. 病在上宜湧之, 以茶調散湧而去其七分, 夜以舟車丸, 浚川散下五七行, 比旦而臭斷.
 ⑥息帥腰股沈痛, 行步坐馬皆不便. 或作香港腳寒濕治之, 或作虛損治之, 烏, 附, 乳, 沒, 活血壯筋骨之藥, 無不用之. 至六十余日, 目赤上熱, 大小便俱澀, 腰股之病如故. 戴人診其兩手脈皆沈遲, 沈者在裏也, 宜泄之. 以舟車丸, 浚川散各一服, 去積水二十余行. 至早晨, 服齋白粥一二頓, 與之上馬, 已能嬰鑠矣.
 ⑦大黃(一兩, 煨) 甘遂(半錢) 牽牛(一兩, 頭末) 木香(三錢) 郁李仁(一兩) 芒硝(三錢半)

宣毒丸
 병증: 濕熱

①未詳

活命金丹	<p>주치: 下濕熱通利二便 구성: 黑丑頭末四兩 大黃煨二兩 青皮 陳皮 蒼朮 當歸各一兩 병증: 精神蒙昧 주치: 風中藏 神不清 구성: 大黃一兩半 桂心 芒硝各一兩 眞珠 牛黃 青黛 犀角 薄荷各五錢 辰砂四錢內二錢爲衣 麝香 龍腦各二錢 板藍根 貫衆 乾葛 甘草各七錢</p>	<p>①治中風不語,半身不遂,肢節痺疼,痰涎潮上,咽啞不利,胸膈痞滿,上實下虛,氣閉面赤,汗後余熱不退,勞病諸藥不治,無問男女老幼,皆可服。如療風毒,茶清化下,解毒藥,新汲水化下。汗後余熱勞病,及小兒驚風熱病,用薄荷湯化下。 ②板藍根 貫衆 甘草 乾葛根 (各一錢) 桂心 芒硝 (一兩) 大黃 (一兩半) 珠子粉 牛黃 (研) 青黛 生犀屑 薄荷 (各五錢) 辰砂 (四錢,研一錢,爲衣) 麝香 (研) 龍腦 (二錢)</p>
茵陳梔子湯	<p>병증: 黃疸 주치: 穀疸 구성: 茵陳三錢 大黃二錢 梔子 枳實各一錢</p>	<p>①完顏正卿,因官事勞役,飲食不節,心火乘脾,脾氣虛弱,更以志怒氣逆傷肝,心下痞滿,四肢困倦,身體麻木,次傳身目俱黃,微見青色,顏黑,心神煩亂,怔忡不安,兀兀欲吐,口生惡沫,飲食不化,時下完谷,小便澀閉而赤黑,辰巳之間發熱,日暮則止,至四月尤甚,予診其脈浮而緩,《金匱》云:寸口脈浮爲風,緩爲痹,痹非中風,四肢苦煩,脾色必黃,瘧熱已行,跗陽脈緊,食谷即眩爲傷脾,風寒相搏,谷氣不消,胃中苦濁,濁氣不流,小便不通,陰被其寒,熱流膀胱,身體盡黃,名曰谷疸,宜服茵陳梔子湯 ②茵陳 (一錢) 茯苓 (五分) 山梔仁 蒼術 (炒) 白朮 (各三錢) 黃芩 (生,六分) 黃連 枳實 (炒) 豬苓 (去皮) 澤瀉 陳皮 防己 (各二分) 青皮 (一分)</p>
消毒丸	<p>병증: 大頭瘡 주치: 時毒疔瘡惡證 구성: 大黃 牡蠣煨 白僵蠶炒各一兩</p>	<p>①治時毒疔瘡惡癥. ②大黃 牡蠣 (燒) 白僵蠶 (炒,各一兩)</p>
如神散*	<p>병증: 凍瘡 주치: 凍瘡皮爛不可忍 구성: 大黃細末 新水調塗瘡上</p>	<p>①治凍瘡皮爛不可忍. ②用川大黃不拘多少爲細末,新水調搗凍破瘡上,痛止立效.</p>

Table 26. Comparison with Ibmoon(入門)

方名	東醫寶鑑	明 李梴의 醫學入門
竹瀝達痰丸	<p>병증: 痰塊 주치: 能運痰從大便出 不損元氣妙 구성: 半夏薑製 陳皮去白 白朮微炒 白茯苓 大黃酒浸蒸晒乾 黃芩酒炒各二兩 人參 甘草灸各一兩半 青礞石碎二兩 焰硝一兩同火煨如金色 沉香五錢</p>	<p>①能運痰天大腸從大便出,不損元氣妙 ②大黃,黃芩各八兩,瀉陽明濕熱;沈香五錢,引諸氣上至天,下至泉;礞石,焰硝各一兩墜痰,二味同入砂罐內蓋之,鐵線縛定,鹽泥固濟,曬幹火紅,候冷取出,同前藥爲末,水丸梧子大,或加朱砂一兩爲衣</p>
通經丸	<p>병증: 室女月經不行 주치: 室女月候不通 或成血瘕 구성: 桂心 青皮 大黃 乾薑 川椒 蓬朮 乾漆炒 當歸 桃仁 紅花各五錢</p>	<p>①治經候不通,臍腹疼痛,或成血瘕 ②川椒,菝葜,乾漆,當歸,青皮,幹薑,大黃,桃仁,紅花,桂心各等分爲末</p>
萬應丸	<p>병증: 蟲 주치: 善下諸蟲 구성: 大黃八兩 檳榔五兩 黑牽牛頭末四兩 皂角十錠 苦練根皮一斤</p>	<p>①善下諸蟲 ②檳榔五錢,大黃八兩,黑丑四兩,爲末,用皂角十錠,苦練根皮一斤</p>
瀉腎湯	<p>병증: 諸淋 주치: 諸淋小腹脹急 甚者宜用此 구성: 大黃二錢剉密器水浸一宿 礞石碎一錢六分 石菖蒲 生地黃各一錢 玄參 細辛各八分 芒硝 赤茯苓 黃芩各六分 甘草四分</p>	<p>①治腎實熱,小腹脹滿,腰背急強離解,便黃舌燥,四肢青黑,耳聾夢泄等證,急宜服此救之 ②大黃一合 (用密器水浸一宿),礞石八錢,玄參,細辛各四錢,芒硝,茯苓,黃芩各三錢,生地汁,石菖蒲各五錢,甘草二錢</p>

參仁丸	<p>병증: 大便秘結 주치: 氣壅大便秘 구성: 麻子仁 大黃各三兩 當歸身一兩 人參七錢半</p>	<p>①治氣壅風盛便秘,後重疼痛煩悶 ②麻仁,大黃各三兩,人參七錢半,當歸一兩,為末,蜜丸梧子大,每三十九,熱水下</p>
消毒飲	<p>병증: 偷鍼 주치: 臉生風粟 구성: 大黃根 荊芥穗各二錢 惡實 甘草各一錢</p>	<p>①治痘欲出未出,已出壯熱未徹,咽痛胸緊便秘,及愈後一切瘡毒赤腫等症 ②鼠粘子八分,荊芥四分,甘草二分,水煎溫服</p>
瀉胃湯	<p>병증: 脣腫脣瘡 주치: 胃實熱 脣口乾裂 煩渴便秘 구성: 大黃二錢半 葛根一錢 桔梗 枳殼 前胡 杏仁各五分</p>	<p>①治胃氣實熱,脣口幹裂,便秘煩渴,睡流口涎 ②大黃二錢半,葛根一錢,桔梗,枳殼,前胡,杏仁各五分,姜煎服</p>
荊黃湯(2)	<p>병증: 咽喉痛 주치: 風熱結滯 咽喉腫痛 大便秘澁 구성: 荊芥四錢 大黃一錢</p>	<p>①治頭眩 ②治咽喉腫痛,大便閉結及風熱結滯生疔瘡 ③荊芥四錢,大黃一錢,空心水煎服,</p>
大芎黃湯	<p>병증: 破傷風 주치: 破傷風 入裏 二便秘 小便赤自汗不止 구성: 川芎一錢 大黃 羌活 黃芩各二錢</p>	<p>①治破傷風二便秘赤,自汗不止 ②川芎一錢,大黃,羌活,黃芩各二錢,水煎服</p>
小承氣湯	<p>병증: 傷寒裏證 주치: 傷寒裏證 小熱 小實 小滿 宜緩下者 用此 구성: 大黃四錢 厚朴 枳實各一錢半</p>	<p>①治裏證已見三四,臍腹脹滿而不甚堅硬,或胸滿潮熱不惡寒,狂言而喘 小滿者,宜 ②大黃五錢,濃朴,枳實各二錢,煎服同前,得利即止</p>
大承氣湯	<p>병증: 傷寒裏證 주치: 傷寒裏證 大熱 大實 大滿 宜急下者用此 구성: 大黃四錢 厚朴 枳實 芒硝各二錢</p>	<p>①治陽明病,脈實身重,汗出不惡寒,譫語煩躁,五六日不大便,臍腹脹滿硬痛,煩渴而喘,手足心並腋下 汗出,少陰口燥咽幹 ②大黃 濃朴 芒硝 枳實 (各二錢半)</p>
調胃承氣湯	<p>병증: 傷寒裏證 주치: 傷寒裏證 大便秘 小便赤 譫語 潮熱 구성: 大黃四錢 芒硝二錢 甘草一錢</p>	<p>①治傷寒二三日不解,蒸蒸熱而不滿,腹如仰瓦,腹中轉矢氣,必有燥屎 ②宜大黃四錢,芒硝三錢,甘草一錢,煎服同前</p>
六一順氣湯	<p>병증: 傷寒裏證 주치: 傷寒熱邪傳裏 大便結實 口燥咽乾 譫語發狂 潮熱自汗 胸腹滿痛等證 구성: 大黃二錢 枳實 厚朴 芒硝 柴胡 黃芩 芍藥 甘草各一錢</p>	<p>①治傷寒熱邪傳裏,大便結實,口燥咽乾,怕熱譫語,揭衣狂妄,揚手擲足,斑黃陽厥,潮熱自汗,胸腹滿硬,繞臍疼痛等證 ②大黃,枳實,濃樸,芒硝,柴胡,黃芩,芍藥,甘草,煎法如前,臨熟入鐵滓水三匙,調服立效</p>
陶氏黃龍湯	<p>병증: 傷寒裏證 주치: 熱邪傳裏 胃中燥糞結實 心下硬痛 純下清水 구성: 大黃二錢 芒硝一錢半 枳實 厚朴各一錢 人參 當歸 甘草各五分</p>	<p>①治熱邪傳裏,胃中燥糞結實,心下硬痛,純下清水 ②大黃二錢,芒硝一錢半,枳實,濃樸各一錢,甘草,人參,當歸各五分,年老氣血虛者去芒硝,姜三片,棗二枚,桔梗三分,水煎一沸,熱服</p>
黑奴丸	<p>병증: 傷寒陽毒 주치: 陽毒 發斑 煩躁 大渴 脉洪數 구성: 麻黃 大黃各二兩 黃芩 釜底煤 芒硝 竈埃墨 梁上塵 小麥奴各一兩</p>	<p>①治陽毒發斑,煩躁大渴倍常,脈洪大數實 ②黃芩,釜底煤,芒硝,竈突墨,梁上塵,小麥奴,麻黃,大黃各等分為末,蜜丸彈子大</p>
四順清涼飲	<p>병증: 血熱 주치: 血熱 구성: 大黃蒸 當歸 赤芍藥 甘草灸</p>	<p>①治血熱蘊結,壅滯不通,或一身盡熱,或日晡肌熱,或夜發熱,皆血熱也 ②當歸,芍藥,大黃,甘草各等分,水煎溫服</p>

消塊丸	<p>各一錢二分半</p> <p>병증: 痞塊證</p> <p>주치: 痞塊癥瘕</p> <p>구성: 大黃四兩 硝石三兩 人參 甘草各一兩半</p>	<p>①治 瘕痞塊,當先下此藥,不令人困,須量體虛實,又治帶下,絕產</p> <p>②硝石三兩,大黃上兩,人參,甘草各一兩,為末,用陳醋三升置瓷器內,先納大黃,不住手攪,使微沸盡一升;下余藥熬至可丸,則丸梧子大</p>
琥珀膏*	<p>병증: 積聚痞塊</p> <p>주치: 積聚痞塊</p> <p>구성: 大黃 朴硝各一兩</p>	<p>①治五發惡瘡,疔腫癰,遠年冷疔痔漏,一切無名腫毒及虎犬蛇傷,並皆治之</p> <p>②歸尾,川芎,黃 梢,蜂房,皂角,升麻,甘草梢,蓖麻子,木鱉子,芍藥,白斂,獨活,槁本,防風梢,枸杞子,栝蒌仁,蘇木,白芷,杏仁,黃連,槐枝各一兩</p>
外敷神膏*	<p>병증: 積聚脹滿血蟲</p> <p>주치: 未詳</p> <p>구성: 大黃 朴硝各四兩 麝香一錢</p>	<p>①治男婦積聚脹滿,血蟲等證</p> <p>②川大黃,樸硝各四兩,麝香一錢,為末,每二兩,和大蒜搗成膏敷患處</p>
陶氏茵陳湯	<p>병증: 黃疸</p> <p>주치: 黃疸 熱盛 大便不利</p> <p>구성: 茵陳二錢 大黃 梔子仁 厚朴 枳實 黃芩 甘草各一錢</p>	<p>①黃證俱口渴而頭汗,蓄熱發者,則溺澀而大腹脹膨,蓄血發者,則溺清而小腹急結</p> <p>②濕熱相交,民病瘴,瘴,即黃膽,陽而無陰也.傷寒發黃雖不一,皆因內熱而誤用溫藥,或被火攻太甚,或失汗下與滲,以致陽明經中血熱,而見真色於肌膚,謂之瘧熱發黃.頭汗作渴,小便不利,色黃而明,茵陳湯,茵陳三物湯,陶氏茵陳湯</p> <p>③大黃,茵陳,山梔,濃樸,枳實,黃芩,甘草,姜一片,燈芯 一握,水煎熱服.</p>
人中黃丸	<p>병증: 瘟疫</p> <p>주치: 四時疫癘</p> <p>구성: 大黃 黃連 黃芩 人參 桔梗 蒼朮 防風 滑石 香附子 人中黃各等分</p>	<p>①如無人中黃,用糞缸岸代之,或朱砂,雄黃為衣亦好</p> <p>②大黃,黃連,黃芩,人參,桔梗,蒼朮,防風,滑石,香附,人中黃各等分為末,神曲糊丸梧子大,每七十丸</p>
仙方活命飲	<p>병증: 癰疽</p> <p>주치: 一切癰疽毒腫 未成者內消 已成者即潰 排膿 止痛 消毒之聖藥也</p> <p>구성: 大黃五錢 金銀花三錢 當歸尾 皂角刺 陳皮各一錢半 乳香 貝母 天花粉 白芷 赤芍藥 甘草節各一錢 防風七分 沒藥五分 穿山甲三片燒另研</p>	<p>①此藥不動臟腑,不傷氣血,凡一切癰毒瘡瘍,未成者內消,已成者即潰,排膿止痛消毒之聖藥</p> <p>②甘草節,赤芍,白芷,天花粉,貝母,乳香各一錢,防風七分,歸尾,皂角刺,陳皮各一錢半,金銀花三錢,沒藥五分,大黃五錢,穿山甲三片,用好酒瓦罐煎,密封罐口,勿令泄氣,煎熟隨瘡上下飲之.服後再飲酒二三杯,側臥而睡,忌酸物,鐵器</p>
打膿散	<p>병증: 癰疽作血出膿法</p> <p>주치: 癰疽不放膿出</p> <p>구성: 大黃五錢 芒硝一錢半 金銀花 黃芩 黃連 黃柏 當歸尾各五分 甘草節 穿山甲焦各三分半 木鱉子 虛者三箇 實者五箇</p>	<p>①治諸癰腫不放膿出</p> <p>②木鱉子虛者七個,實者九個,金銀花,黃芩,黃連,黃柏,歸尾各一錢,大黃一兩,甘草節,穿山甲各七分,芒硝三錢,水煎五更服,大便見膿,小便見血為效</p>
瀉心湯	<p>병증: 心癰</p> <p>주치: 心癰 及癰疽毒盛躁渴</p> <p>구성: 大黃一錢半 黃連 黃芩 山梔子 漏蘆 澤蘭 連翹 蘇木各七分</p>	<p>①治癰疽瘡毒,腫盛發躁煩渴,脈洪實而數</p> <p>②大黃一錢,黃連,黃芩,山梔,漏蘆,澤蘭,連翹,蘇木各五分,量虛實水煎服</p>
漏蘆飲子	<p>병증: 附骨疽</p> <p>주치: 附骨疽初起 宜服</p> <p>구성: 大黃一錢半 漏蘆 白斂 黃芩 麻黃 枳實 升麻 赤芍藥 朴硝 甘草各一錢</p>	<p>①治一切惡瘡毒腫,丹瘤瘰,疔腫魚眼,五發癰疽,目翳吹奶,初起如傷寒表裏證具者宜服</p> <p>②漏蘆,白斂,黃芩,麻黃,枳實,升麻,芍藥,甘草,樸硝各五分,大黃一錢,水煎熱服</p>
通天再造散	<p>병증: 大風瘡</p> <p>주치: 大風瘡</p> <p>구성: 皂角刺黑大者一兩半 大黃煨一兩 白牽牛頭末三錢炒三錢生 鬱</p>	<p>①治癩風惡疾</p> <p>②大黃,皂刺各一兩,白牽牛六錢,郁金五錢一方無此二味,為末.每五錢或二錢,五更酒調,面東服之,當日利下惡物,或膿或蟲</p>

化毒散	<p>金五錢</p> <p>병증: 天疱瘡 주치: 楊梅瘡重者 구성: 生大黃一兩[解熱毒] 穿山甲五錢[解毒] 白僵蠶三錢[去風] 蜈蚣一條[去蟲] 當歸尾五錢[破血]</p>	<p>①楊梅重多化毒散 ②生大黃一兩解熱毒,穿山甲五錢(虛者三錢)解毒,僵蠶三錢去風,蜈蚣一條去蟲,歸尾五錢破血,為末,每二錢酒調,日二服</p>
含化丹	<p>병증: 結核 주치: 耳項結核 구성: 酒蒸大黃 白僵蠶 青黛 牛膽南星各等分</p>	<p>①治腦項耳後結核 ②僵蠶,大黃,青黛,膽星各等分為末,蜜丸含化</p>
三黃散*	<p>병증: 疥癬 주치: 膿瘻疥瘡 治熱為主 구성: 黃芩 黃連 大黃各三錢 蛇床子 寒水石各二錢 白礬一錢 黃丹五分 輕分 無名異 白芷 木香各三分</p>	<p>①治膿瘻瘡,退熱消腫止痛,幹膿結疔 ②黃連,黃芩,大黃各三錢,蛇床子,寒水石各三兩,黃丹五分,白礬一錢,輕粉,白芷,無名異,木香各少許,為末</p>
陣王丹*	<p>병증: 癱撲墮落壓倒傷 주치: 諸折傷 止血定痛 구성: 大黃一兩 石灰六兩</p>	<p>①不問刀箭出血,木石損傷,敷之如神,且免破 傷風癩. ②大黃一兩,鍛石六兩,同炒灰紫色為度,去火毒,篩過,敷傷處立效</p>

Table 27. Comparison with Eugam(醫鑑)

方名	東醫寶鑑	明 龔信的 古今醫鑑
丑寶丸	<p>병증: 癩癧 주치: 一切癩癧, 怔忡搖擗, 難狀之疾 구성: 大黃酒拌九蒸九曬 黃芩炒各二兩 膽星 石菖蒲各一兩 白僵蠶薑汁炒七錢 辰砂六錢為衣 青礞石煨 天麻薑汁炒 蟬殼各五錢 沈香 犀角各一錢半 琥珀 雄黃各一錢 牛黃五分 豬心血二箇</p>	<p>①一切怔忡癩,難狀之疾,並皆調治 ②牛黃五錢 琥珀一錢 辰砂一錢,為衣 雄黃一錢 膽星一兩 礞石五錢,火 沈香一錢五分 犀角一錢五分 黃芩二兩,炒 大黃二兩,酒蒸 天麻五錢,姜炒 石菖蒲一兩 僵蠶七錢,姜炒 蟬蛻五錢,去足 豬心二具,用血</p>
清火豁痰丸	<p>병증: 鬱痰 주치: 痰涎壅盛 胸膈不利 咽喉煩燥 噎塞如有所硬 吐不出 嚥不下 구성: 半夏薑製 陳皮去白 白朮微炒 白茯苓 大黃酒浸蒸晒乾 黃芩酒炒各二兩 人參 甘草 灸各一兩半 青礞石碎二兩 焰硝一兩同火煨如金色 沈香五錢</p>	<p>①治上焦郁火,痰涎壅盛,胸膈不利,咽喉煩躁噎塞,吐不出,咽不下,如鯁狀 ②大黃酒蒸,三兩 礞石五錢 沈香二錢 黃芩酒炒,二兩 黃連酒炒,二兩 梔子炒,二兩 連翹一兩 天南星制,二兩 半夏制,二兩 白朮炒,二兩 枳實炒,二兩 貝母去心,一兩五錢 天花粉一兩 陳皮一兩 白茯苓一兩 神曲炒,一兩 青黛五錢 玄明粉七錢 甘草五錢 白芥子炒,二兩</p>
血極膏	<p>병증: 月閉不通 주치: 月閉不通 구성: 大黃為末 醋熬成膏 丸如鷄頭大 大黃酒蒸九次晒四兩 血竭 沒藥各五錢</p>	<p>①未詳</p>
無極丸	<p>병증: 血結成癥 주치: 經閉 有血塊 苦痛 구성: 錦紋大黃四兩 一兩酒煮 一兩醋煮 一兩童便煮 一兩鹽水煮 各七次 右合一處 又七蒸 七晒 為末 用當歸 熟地黃各一兩半</p>	<p>①治婦人血塊氣疼,有爬床席,十指出血 ②錦紋大黃四兩,每兩用酒,醋,童便,鹽水各煮七次,俱曬乾</p>
海金沙散	<p>병증: 五淋 주치: 五淋 구성: 當歸酒洗 大黃酒浸 牛膝酒洗 木香 雄黃 海金沙各五錢</p>	<p>①未詳</p>
木香導氣湯	<p>병증: 痢疾 주치: 痢初起腹痛 裏急後重 赤白相雜 發熱</p>	<p>①治痢疾初起,腹痛,紅白相雜,裏急後重,發熱噤口,不拘老幼,先與一服甚效</p>

<p>嘔口 顛倒散</p>	<p>구성: 大黃一錢半 白芍藥 朴硝 黃連各一錢二分 厚朴 檳榔各一錢 當歸尾 赤茯苓各八分 병증: 大小便不通 주치: 大小便不通 或小便不通 或大便不通 皆治之 구성: 大黃 滑石 皂角各三錢 如小便不通 滑石加三錢 如大便不通 大黃加三錢 如大小便俱不通 大黃 滑石各加三錢</p>	<p>②大黃一錢五分 檳榔一錢二分 濃樸一錢二分 白芍藥一錢二分 黃連一錢二分 歸尾八分 茯苓八分 樸硝一錢二分 木香五分 小便赤加滑石一錢五分 木通一錢 ①治臟腑實熱,或小便不通,或大便不通,或大小便俱不通 ②大黃三錢 滑石三錢 皂角三錢</p>
<p>利氣丸</p>	<p>병증: 食積腹痛 주치: 食積 酒毒 并一切氣滯 大小便秘澀 구성: 大黃生 黑牽牛頭末各二兩 香附子炒 一兩三錢 黃栢一兩 木香 檳榔 枳殼 青皮 陳皮 蓬朮 黃連各三錢</p>	<p>①治心胃氣滯,食積,郁熱作痛 ②大黃生用,六兩 黑丑頭末,六兩 木香一兩 檳榔一兩 枳殼麩炒,一兩 香附炒,四兩 青皮炒,一兩 廣皮一兩 莪朮煨,一兩 黃連一兩 黃栢三兩</p>
<p>清火湯</p>	<p>병증: 三焦火 주치: 三焦熱 구성: 大黃酒蒸一錢半 桔梗 玄參各一錢二分 連翹 梔子炒 芒硝 片芩酒炒 黃連酒炒 貝母 天花粉 獨活 前胡 柴胡 赤茯苓 枳殼 各一錢 薄荷 羌活 川芎各八分 防風六分 甘草四分</p>	<p>①治五臟六腑及上,中,下三焦火熱 ②連翹一錢 梔子一錢,炒 玄明粉一錢,如無,以硝代之 黃芩一錢,酒炒 黃連一錢,酒炒 桔梗一錢二分 玄參一錢二分 薄荷八分 羌活酒洗,八分 防風六分 貝母一錢 獨活酒洗,八分 前胡八分 柴胡八分 天花粉一錢 茯苓一錢 川芎八分 枳殼一錢 甘草三分 大黃酒蒸,二錢 酒毒加白粉葛一錢</p>
<p>三棱煎元</p>	<p>병증: 腸覃石瘕血蟲 주치: 婦人血積 血塊 血蟲 구성: 大黃八兩爲末 三棱蓬朮各一兩並煨爲末</p>	<p>①治飲食過傷,痞悶疼痛,食不消化,久而成癖.又治婦人血積,血塊,幹血氣經閉不通 ②大黃八兩,爲末 三棱 莪朮各一兩,二味濕紙包裹,煨,爲末</p>
<p>牛黃散子</p>	<p>병증: 穀疸 주치: 穀疸 酒疸 及水氣 蠱脹 구성: 黑丑取頭末 春八分 夏九分 秋七分 冬一錢 大黃 春八分 夏九分 秋七分 冬一錢 檳榔 春八分 夏九分 秋七分 冬四分 甘草 春八分 夏九分 秋七分 冬四分</p>	<p>①治酒疸,食黃,及水氣蠱證 ②黑牽牛春八分,夏九分,秋七分,冬一錢 大黃春八分,夏九分,秋七分,冬一錢 檳榔春八分,夏九分,秋七分,冬四分 甘草春八分,夏九分,秋七分,冬四分</p>
<p>千金內消散</p>	<p>병증: 癰疽內托法 주치: 癰疽 及腸癰 肚癰 便毒 初起即消 已腫即潰 血從大便中出 구성: 大黃三錢 金銀花二錢 當歸尾酒洗一錢半 赤芍藥 白芷 木鱉子去殼 沒藥 乳香 皂角刺 白僵蠶 瓜蒌仁 天花粉各一錢 甘草節五分 穿山甲三大片蛤粉炒</p>	<p>①治腸癰便毒,初起即消,已腫即潰,膿血從大便中出 ②大黃三錢 赤芍藥 白芷 木鱉子去殼 乳香 沒藥 皂角刺 白僵蠶 栝朮仁 天花粉各一錢 歸尾酒洗,一錢半 穿山甲三大片,蛤粉炒黃色,杵碎 金銀花三錢 甘草五分</p>
<p>通導散</p>	<p>병증: 癱撲墮落壓倒傷 주치: 傷損極重 大小便不通 心腹脹悶 宜用此 下瘀血 구성: 大黃 芒硝各二錢 當歸 蘇木 紅花 桃仁各一錢 厚朴 陳皮 木通 枳殼 甘草各五分</p>	<p>①治跌撲傷損極重,大小便不通,乃瘀血不散,肚腹膨脹,上攻心腹悶亂至死者,先服此藥,打下瘀血,然後方可服補損藥 ②大黃 芒硝 枳殼各四兩 濃樸 當歸 陳皮 木通 紅花 蘇木 甘草各二兩</p>

Table 28. Comparison with Hoichun(回春)

方名	東醫寶鑑	明 龔信의 萬病回春
清心滾痰丸	병증: 癲癩 주치: 癲癩驚狂, 一切怪證, 專治痰火 구성: 大黃酒蒸 黃芩各四兩 青礞石同焙 硝煨如金色 犀角 皂角 朱砂水飛各五錢 沈香二錢半 麝香五分	①治癲癩驚狂, 一切怪癥, 神效 ②大黃酒蒸四兩 黃芩四兩 青礞石硝五錢 沈香二錢 半 犀角五錢 皂角五錢 麝香五分 朱砂五錢
追蟲丸	병증: 蟲 주치: 下蟲積 구성: 黑牽牛子頭末一兩 大黃三錢 使君子 肉二錢 木香 檳榔 蕪荑 錫灰各一錢二 分	①追取蟲積, 即愈 ②木香 檳榔 蕪荑 錫灰各一錢 使君子肉二錢 大黃 二錢 牽牛末一兩
五仙丸	병증: 蟲 주치: 諸蟲如神 구성: 大黃四兩 皂角 雷丸 苦楝根各一 兩 木香二錢	①治諸蟲如神 ②大黃四兩 皂角 雷丸 苦楝根各一兩 木香 上為末 酒糊丸
交泰丸	병증: 嘈雜 주치: 胸中痞悶嘈雜 大便稀則胸中頗快 大便堅則胸中痞悶難當 구성: 大黃 以當歸 紅花 吳茱萸 乾漆各 一兩煎水浸大黃一日夜切曬 又以酒拌曬 之 九蒸九曬用四兩 黃連薑汁浸黃土炒 白朮土炒 吳茱萸湯泡炒各二兩 枳實一 兩 當歸尾酒洗一兩三錢	①胸中痞悶嘈雜, 大便堅則胸中頗快, 大便堅則胸中痞 悶難當, 不思飲食 ②黃連一兩, 姜汁浸, 黃土炒 枳實一兩, 麩炒 白朮去 蘆, 土炒, 一兩 吳茱萸湯泡微炒, 二兩 歸尾酒洗, 一兩三錢 大黃用當歸, 紅花, 吳茱萸, 乾漆各 一兩煎水, 洗大黃一晝夜, 切碎曬乾, 仍以 酒拌曬之, 九 蒸九曬, 用四兩.
枳實大黃湯(2)	병증: 內傷飲食宜下 주치: 食傷熱物 大便不通 구성: 大黃二錢 厚朴 枳實 檳榔 甘草各 一錢 木香五分	①治胸腹有食積, 大便不通者 ②枳實 濃樸去皮 大黃 檳榔 甘草 腹痛甚加木香
化痞丹	병증: 痞塊證 주치: 消積塊專攻之劑 구성: 大黃四兩 醋浸七日 日晒夜露又七 日 穿山甲土炒二兩 木鱉子去油 香附子 便浸炒 桃仁各一兩 紅花二錢 青黛五分	①消積塊專攻之劑 ②大黃四兩, 米醋浸一七, 日曬夜露一七, 木鱉子去油, 一兩 穿山甲土炒, 三兩 香附米童便浸, 炒, 一兩 桃仁 去皮, 研, 一兩 紅花三錢, 生 青黛五分
五仙膏*	병증: 積聚痞塊 주치: 一切痞塊 積聚 癖疾 구성: 大黃 皂角 生薑 生蔥 大蒜各半斤	①治一切痞塊積氣, 癖疾肚大青筋, 氣喘上壅, 或發熱 咳嗽, 吐血衄血 ②大黃 肥皂角 生姜半斤 生蔥半斤 大蒜半斤
二聖救苦丸	병증: 大頭瘟 주치: 用牙皂以開關竅而發其表 用大黃 以瀉諸火而通其裏 구성: 大黃四兩酒蒸 豬牙皂角二兩	①治傷寒瘟疫, 不論傳經過經可服 ②錦紋大黃四兩, 酒拌, 蒸, 曬乾 牙皂二兩, 如豬牙者
加味僵黃丸	병증: 大頭瘟 주치: 大頭瘟 及蝦蟆 鷓鴣等瘟 구성: 大黃酒蒸四兩 白僵蠶二兩 蟬退六 錢半 薑黃二錢半	①治腫項大頭病, 蝦蟆瘟病 ②僵蠶二兩 姜黃二錢半 蟬蛻二錢半 大黃四兩
神奇散	병증: 便毒 주치: 便毒 魚口瘡[便毒潰破者即魚口瘡 也] 구성: 牡蠣 大黃各三錢 黃連 黃芩 黃栢 金銀花 連翹各一錢半 穿山甲三片土炒 木鱉子三箇去殼 黃蠟三兩	①便毒魚口 ②穿山甲三片, 土炒 木鱉子去殼三個 牡蠣 大黃各三 錢 黃連 黃芩 黃栢 金銀花 連翹各一錢半 黃蠟三錢.
水黃散*	병증: 丹毒 주치: 丹毒 구성: 焰硝 大黃末各五錢	①治赤遊丹毒 ②土硝大黃末各一錢. 上合一處, 新汲水調勻, 用雞翎 蘸藥, 頻頻塗搽

Table 29. Comparison with Ryoochwí(類聚)

方名	東醫寶鑑	朝鮮 世宗의 醫方類聚
倒換散	병증: 大小便不通 주치: 大小便不通 구성: 如大便不通 大黃一兩 杏仁三錢 如小便不通 大黃三錢 杏仁一兩	①大小便不通 ②大黃 杏仁 (大便不通, 大黃一兩, 杏仁三錢; 小便不通, 大黃三錢, 杏仁一兩) .
當歸承氣湯(2)	병증: 燥證 주치: 治燥之上藥也 병인 병리: 燥 구성: 當歸 大黃各二錢 芒硝七分 甘草五分	①此方治諸燥之上藥也. 夫燥乾者, 肺金之本, 燥金受熱化, 以成燥澁也, 兼火熱制金, 衰耗液而損血, 郁而成燥者, 由風能勝濕, 熱能耗液而成燥也. 仲景論傷寒, 論里熱大甚, 而胃中乾澀, 煩渴者, 急以此下之數也; 若表熱里和, 下之太早, 邪熱承氣而入, 不必成結胸, 但爲熱利不止, 滿硬或痛, 煩渴咽乾, 脈數而實; 諸腹滿實痛者, 或煩渴小便赤, 大便硬, 或熱泄, 脈滑實而緊甚, 俱宜此湯下之. 傷寒治法, 有諸不可下證, 固在審詳. 及或一切雜病, 燥澁枯涸而爲病者, 然不分燥于外則皮膚皴竭癢, 燥于中則精血枯涸, 燥于上則咽鼻焦乾, 燥于下則便溺結閉, 夫燥之爲病, 是陽明化也, 水液衰少, 故如是, 通宜此湯下之. ②當歸 大黃 各一兩 甘草 半兩 芒硝 九錢
延年護命丹	병증: 積聚癥瘕痞塊 주치: 三十六般積 二十四般氣 及血積 蟲積 구성: 大黃十兩半生半醋浸切作片焙乾 黑丑頭末一兩 蓬朮 三稜並炮 芫花 鱉甲醋炙 各五錢 陳皮二錢半 與芫花同醋浸一宿焙乾 沒藥 乳香 輕粉各一錢	①男子婦人脾胃不和, 飲食減少, 心腹絞痛, 反胃吐食, 痰涎喘嗽, 五般淋瀝, 傷寒結胸, 大小便不通, 瀉血, 腸風痔瘻; 或傷寒後熱甚發黃, 久患癘疾, 滑瀉痢米谷不消, 酒疸, 食勞黃, 十種水氣遍身黃腫, 一切蠱毒, 五臟積熱, 衄血不止; 及疔腮喉閉口瘡, 遍身疥癬, 九種心痛, 三十六般積, 24般氣, 諸藥不效, 不問年深日近; 並婦人所患產後惡血沖心, 令人欲死, 口燥舌幹, 四肢困倦, 血山崩漏不止, 面色萎黃, 赤白帶下, 血經瘀閉不通; 並小兒三十六種驚風. 十五歲以下, 五十以上, 一丸分作二服; 十歲以下, 六十以上, 一丸分作三服; 六歲以下, 七十以上, 一丸分作四服; 三歲以下, 八十以上, 一丸分作五服. 然臨時更宜約量虛失. 加減服之. ②沒藥 (另研) 乳香 (另研) 輕粉各二錢, 蓬朮術1兩 京三稜 (炮) 各一兩 芫花 鱉甲 (醋醃, 炙黃色, 去尖, 捶碎) 1兩半 黑牽牛四兩 (取頭末二兩), 陳皮半兩 (與芫花二味, 好醋同浸一宿, 瀝去, 日乾, 更焙), 川大黃 (一半生, 一半醋浸一宿, 軟切作塊子, 先作大塊, 更作小塊, 切作片子, 微日乾, 更焙, 勿令焦)
桃溪氣寶丸	병증: 積聚癥瘕痞塊 주치: 積聚癥瘕 腹脇如抱一瓮 瘦瘠露骨 一切氣積食積 大便秘澁 寒熱往來 구성: 黑丑頭末二兩 大黃一兩半 檳榔 青皮各一兩 羌活 川芎 陳皮 茴香炒 木香 當歸 各五錢	①腰脊俱病, 如抱一甕, 肌膚堅硬, 按之如鼓, 兩腳腫滿, 曲膝仰臥, 不能屈伸, 自頭至臍中, 瘠瘦露骨, 一切氣積、食積並腳氣走註, 大便秘結, 寒熱往來, 狀如傷寒. ②黑牽牛二兩 大黃一兩半 檳榔1兩 青皮 (去白) 一兩 木香半兩 羌活半兩 川芎半兩 陳皮半兩 茴香 (炒) 半兩 當歸半兩.
追風散	병증: 大風瘡 주치: 第二日服 瀉血追蟲 구성: 錦紋大黃六兩 鬱金蟬肚者一兩八錢炒 皂角刺一兩半	①治大風脩然子論 ②夫大風者, 所犯異證多端. 或因嗜欲無度, 勞傷血氣; 或蓄大怒, 憂愁驚恐, 抑鬱不伸; 或體虛膚空; 或醉酒當風; 或熱解脫, 汗出入水; 或浴後迎風; 或醉臥露地; 或手足破傷, 引入風毒; 或卒風暴雨, 寒水濕障, 侵入肌膚. 當時感受, 以至大風之患病, 因以流注經絡, 傳于臟腑, 發于四肢內外, 薰蒸而成泡癬……. ③瀉血藥, 第二日服. ④大黃 (六兩) 川蟬肚 (即鬱金一兩八錢仲, 用少者, 炒.) 皂角子 (一兩)

Table 30. Comparison with Woonki(雲岐)

方名	東醫寶鑑	元 張璧撰의 雲岐子保命集論類要
通膈丸	병증: 下藥 주치: 下濕熱通利二便 병인 병리: 濕熱 구성: 黑丑頭末 大黃 木通各等分	①原文과 對照比較하지를 못하였음.

Table 31. Comparison with Bomyoung(保命)

方名	東醫寶鑑	元 張璧撰의 雲岐子保命集論類要
當歸承氣湯(1)	병증: 癲狂 주치: 陽狂, 奔走罵詈 구성: 當歸 大黃各一兩 芒硝七錢 甘草五錢	①原文과 對照比較하지를 못하였음.
大黃牽牛散	병증: 大便秘結 주치: 相火遊走藏府 大便秘結 병인 병리: 相火遊走藏府 구성: 大黃一兩 黑牽牛子頭末五錢	

Table 32. Citation type of the original reference

유형 구분	출전	처방	원문
① 引用文과 原文이 완전히 一致하는 경우			
② 原文을 찾을 수 없는 경우	本草 仲景 活人 新書 直指 東垣 海藏 丹心 寶鑑 拔粹 王隱君 鉤玄 綱目 醫鑑 雲岐 保命 易老 俗方 直指 瑞竹 精義	大黃湯(2) 備急丸 茵陳大黃湯 十灰散 大黃飲子, 逐瘀湯 七宣丸, 三一承氣湯(1), 立效散 洗肝散 導經丸, 通神散, 荊黃湯(1), 大陷胸丸, 沈香交泰丸, 順氣散, 既濟解毒湯, 五香連翹湯, 黃甘散, 黃黑散, 四黃散* 枳實大黃湯(1) 木香順氣丸 滾痰丸 全真丸 宣毒丸 血極膏, 海金砂散 通膈丸 當歸承氣湯(1), 大黃牽牛散 大黃湯(1), 三化湯, 殭黃丸 大黃膏* 返魂追命再造散 木香檳榔丸, 木香三棱散 五利大黃湯, 內消升麻湯, 萬應膏*	神農本草經 傷寒論, 金櫃要略 活人書 活幼新書 直指方 東垣十書 元 王好古 丹溪心法 衛生寶鑑 濟生拔粹 泰定養生主論 百病鉤玄 醫學綱目 古今醫鑑 雲岐子保命集論類要 雲岐子保命集論類要 - - 直指方 瑞竹堂方 外科精義
③ 引用文과 原文이 基本的으로 同一하거나 상하의 說明을 위해 약간의 변동이 있는 경우			

④引用文과 原文의 기본 내용이 같지만 表現상 다른 경우	1) 각각의 단어변화	仲景	三黃瀉心湯(2), 三黃瀉心湯(1)	傷寒論, 金櫃要略
	2) 方名의 변화	聖惠	導滯散	太平聖惠方
⑤ 내용이 補充된 경우	3) 東醫寶鑑에서 내용이 더욱 간결화된 것	仲景	三黃瀉心湯(1), 茵陳蒿湯, 大陷胸湯, 三黃瀉心湯(2), 附子瀉心湯, 梔子大黃湯, 備急丸	傷寒論, 金櫃要略
		活人	調中湯	活人書
		東垣	秦芻當歸湯, 三黃枳朮丸, 枳實導滯丸, 羌活導滯湯	東垣十書
		丹心	當歸潤燥湯, 大黃散, 桃仁承氣湯, 濟生茵陳湯, 內疎黃連湯, 平氣散, 復元活血湯	丹溪心法
		寶鑑	疏風順氣元, 推氣丸, 瀉肝散, 二黃散, 三將軍元, 寬腸丸, 三一承氣湯(2), 雙解散, 百合丹	衛生寶鑑
		得效	雞矢醴散, 牡蠣大黃湯, 玉燭散, 綠雲膏*	世醫得效方
		正傳	瀉青丸, 痔藥膏子*, 舟車丸, 舟車神祐丸, 大聖瀉川散, 活命金丹, 茵陳梔子湯, 消毒丸, 如神散*	醫學正傳
		綱目	竹瀝達痰丸, 通經丸, 萬應丸, 瀉腎湯, 參仁丸, 消毒飲, 瀉胃湯, 荊黃湯(2), 大芎黃湯, 小承氣湯, 大承氣湯, 調胃承氣湯, 六一順氣湯, 陶氏黃龍湯, 黑奴丸, 四順清涼飲, 消塊丸, 琥珀膏*, 外敷神膏*, 陶氏茵陳湯, 人中黃丸, 仙方活命飲, 打膿散, 瀉心湯, 漏蘆飲子, 通天再造散, 化毒散, 含化丹, 三黃散*, 陣王丹*	醫學綱目
		入門	丑寶丸, 清火豁痰丸, 無極丸, 木香導氣湯, 顛倒散, 利氣丸, 清火湯, 三棱煎元, 牛黃散子, 千金內消散, 通導散	醫學入門
		醫鑑	清心滾痰丸, 追蟲丸, 五仙丸, 交泰丸, 枳實大黃湯(2), 化痞丹, 五仙膏*, 二聖救苦丸, 加味僵黃丸, 神奇散, 冰黃散*	古今醫鑑
		回春	倒換散, 當歸承氣湯(2), 延年護命丹, 桃溪氣寶丸, 追風散	萬病回春
		類聚	桃仁煎, 大黃牧丹湯, 龍膽湯	醫方類聚
	4) 用藥, 主治, 制劑, 劑量, 煎服用法내용의 변화	千金	大黃左經湯, 雞鳴散	千金方
		三因	八正散, 脾約丸	三因方
		局方		太平惠民和劑局方
		良方	千金桃仁煎	婦人大全良方
		宣明	三花神祐丸, 四生丸, 解毒丸, 大黃甘草飲子	宣明論
		丹心	木香枳殼丸, 黃連散, 既濟解毒湯	丹溪心法
5) 여러 단락의 原文을 수집 정리하여 다시 쓴 경우	丹心	牛黃奪命散	丹溪心法	




Figure 1. Citation type of the original reference