

Corrigendum: 일회용 약물주입기로 가정에서 항암치료 중인 대장암 환자의 삶의 질

이충은¹⁾ · 김나영¹⁾ · 박미희²⁾ · 이윤정²⁾ · 김진라¹⁾ · 백민주¹⁾ · 김효진¹⁾ · 변은성¹⁾ · 길윤경³⁾ · 김희정⁴⁾

¹⁾세브란스병원 간호사, ²⁾세브란스병원 파트장, ³⁾세브란스병원 팀장, ⁴⁾연세대학교 간호대학 · 김모임간호학연구소 부교수

Corrigendum: Quality of Life in Colorectal Cancer Patients at Home 5-Fluorouracil Chemotherapy with Disposable Elastomeric Infusion Pumps

Lee, Chung Eun¹⁾ · Kim, Na Young¹⁾ · Park, Me Hee²⁾ · Lee, Yoon Jung²⁾ · Kim, Jin Ra¹⁾ · Baek, Min Ju¹⁾ · Kim, Hyo Jin¹⁾ · Byun, Eun Sung¹⁾ · Kil, Yun Kyung³⁾ · Kim, Heejung⁴⁾

¹⁾RN, Division of Nursing, Severance Hospital; ²⁾Unit manager, Division of Nursing, Severance Hospital; ³⁾Team Leader, Division of Nursing, Severance Hospital; ⁴⁾Associate Professor, College of Nursing · Mo-Im Kim Nursing Research Institute, Yonsei University

28권 1호(p. 76-87)의 “일회용 약물주입기로 가정에서 항암치료 중인 대장암 환자의 삶의 질” Table 1과 관련 본문 내용 오류(p. 80. ~ 81.)를 정정합니다.

1) p. 80.

Before correction

현재 치료중인 항암치료의 총 회차는 평균 11.68±12.74로 그 범위는 1차부터 99차까지로 분포되었다(Table 1).

After correction

현재 치료 중인 항암회차는 평균 11.68± 12.74로 3차 이상인 경우가 164명(91.6%)를 차지하였다. 암 진단 이후 현재까지 받은 총 누적 항암치료의 횟수는 평균 20.06±17.61이었다(Table 1).

2) p. 81.

Before correction

Table 1. Quality of Life according to General Characteristics, Self-efficacy and Psychological Distress (N=179)

Characteristics	Categories	n (%)	M±SD (range)	Quality of life	
				M±SD	t or F (p)
Time since diagnosis	≤ 6 months	59 (33.0)	21.07±23.04*	64.00±20.43	1.12 (.329)
	> 6~≤ 12 years	27 (15.1)		56.79±25.11	
	> 12 years	93 (52.0)		62.72±20.40	
Chemotherapy regimen	FOLFOX	36 (20.2)	11.68±12.74 (1~99)	58.80±19.71	0.51 (.801)
	FOLFOX+ bevacizumab	46 (25.7)		55.56±25.09	
	FOLFOX+ cetuximab	5 (2.8)		63.84±19.99	
	FOLFIRI	6 (3.4)		58.80±19.71	
	FOLFIRI+ bevacizumab	56 (31.3)		62.40±25.90	
	FOLFIRI+ cetuximab	23 (12.8)		60.00±23.12	
	FOLFIRI+ ziv-aflibercept	5 (2.8)		51.67±9.13	
Cycle of current chemotherapy	≤ 2	15 (8.4)	43.89±22.38	63.92±20.33	13.13 (< .001)
	≥ 3	164 (91.6)			
Cumulative cycles of chemotherapy	1~6	21 (11.8)	62.59±19.25	57.14±15.87	0.76 (.518)
	6~15	68 (38.0)		61.52±24.60	
	16~23	45 (25.1)		65.37±19.35	
	≥ 24	45 (25.1)		62.59±19.25	

*unit: month

DOI of original article <https://doi.org/10.22650/JKCNR.2022.28.1>.

Corresponding author: Kim, Heejung

College of Nursing, Yonsei University, 50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea.

Tel: 82-2-2228-3273, Fax: 82-2-2227-8303, E-mail: HKIM80@yuhs.ac

After correction

Table 1. Quality of Life according to General Characteristics, Self-efficacy and Psychological Distress (N=179)

Characteristics	Categories	n (%)	M±SD (range)	Quality of life	
				M±SD	t or F (p)
Time since diagnosis	1~6	59 (33.0)	21.07±23.04*	64.00±20.43	1.12 (.329)
	7~12	27 (15.0)		56.79±25.11	
	13~	93 (52.0)		62.72±20.40	
Chemotherapy regimen	FOLFOX	38 (21.2)	11.68±12.74 (1~99)	60.09±20.33	0.51 (.801)
	FOLFOX+ bevacizumab	46 (25.7)		62.86±25.20	
	FOLFOX+ cetuximab	5 (2.8)		60.00±23.12	
	FOLFIRI	6 (3.4)		55.56±25.09	
	FOLFIRI+ bevacizumab	56 (31.3)		63.84±19.99	
	FOLFIRI+ cetuximab	23 (12.8)		65.22±17.88	
	FOLFIRI+ ziv-aflibercept	5 (2.8)		51.67±9.13	
Cycle of current chemotherapy	≤ 2	15 (8.4)	11.68±12.74 (1~99)	43.89±22.38	13.13 (< .001)
	≥ 3	164 (91.6)		63.92±20.33	
Cumulative cycles of chemotherapy	2~5	21 (11.8)	20.06±17.61 (2~110)	57.14±15.87	0.76 (.518)
	6~15	68 (38.0)		61.52±24.60	
	16~23	45 (25.1)		65.37±19.35	
	≥ 24	45 (25.1)		62.59±19.25	

*unit: month

3) p.84

Before correction

항암치료 중인 암 환자의 디스트레스와 삶의 질에 관한 선행연구[15]에서 누적 항암 16회 이상이 22.7%였으나, 본 연구는 현재 항암치료가 16회 이상인 군이 50.3%로 99차 항암치료까지 받은 환자들로 구성되었다.

After correction

항암치료 중인 암 환자의 디스트레스와 삶의 질에 관한 선행연구[15]에서 **현재까지 누적 항암치료의 횟수가 16회 이상인 경우가 22.7%였으나, 본 연구에서는 50.2%이었다.**